Eingegangen
19. OKT. 1953
Beantwortet
am:
Gelesen: 1 2 3

# J. Timm & Co.

*Ehrenpreis in Gold, höchste Auszeichnung*
*für die Baumschulleistungsschau in Hamburg 1953*

Warenzeichen rechtlich geschützt

**HERBST 1953 / FRÜHJAHR 1954**

# J. TIMM & CO.

INHABER: GUSTAV FRAHM

**BAUMSCHULEN**

**ELMSHORN IN HOLSTEIN**

PAPENHOHE 29

Fernruf: Elmshorn 2948/2949

Drahtanschrift: Timm Baumschulen

Bankkonten:

Schleswig-Holsteinische Westbank, Elmshorn

Landeszentralbank von Schleswig-Holstein, Zweigstelle Elmshorn, Konto-Nr. 224/93

Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale Altona, Hamburg-Altona 1

Postscheckkonto: Hamburg 41910

---

*Das Umschlagbild zeigt eine „Akebia quinata"*

# An unsere werten Geschäftsfreunde!

Der vorjährige Hauptkatalog Herbst 1952/Frühjahr 1953 fand eine über Erwarten beifällige Aufnahme. Wir sind darüber sehr erfreut und sehen darin eine Anerkennung des großen geistigen und materiellen Aufwandes, den wir dieser Ausgabe zuteil werden ließen. Da der Fortschritt keinen Stillstand duldet, haben wir die vorliegende neue Ausgabe wiederum erweitert und verbessert, wobei wir uns zum Teil die aus unserem Kundenkreise zugegangenen Anregungen dankbar zunutze machten. Wir sind überzeugt, daß sich auch dieser Katalog in der Praxis bestens bewähren und an seinem Teil dazu beitragen wird, unserer Firma neue Freunde und Abnehmer zuzuführen.

Das Ereignis des Jahres „Die Internationale Gartenbauausstellung in Hamburg" führte einen großen Besucherstrom auch in unsere Baumschulen. Fachleuten, Wissenschaftlern und Pflanzenliebhabern bot sich dadurch die Gelegenheit, unsere vielseitigen und gepflegten Anzuchten in Augenschein zu nehmen. Ohne uns der Übertreibung schuldig zu machen, dürfen wir sagen, daß alle Besucher voll des Lobes über das Gesehene waren. Es liegen uns geradezu begeisterte Dankschreiben vor. Nur der Raummangel verbietet es, sie hier auch nur auszugsweise zur Kenntnis unseres großen Kundenkreises zu bringen. In der Tat: Wir können auch in diesem Jahre unseren zahlreichen Geschäftsfreunden die Lieferung einer in jeder Beziehung erstklassigen Qualität versprechen. In diesem Zusammenhange erwähnen wir, daß unserer Firma für ihre in Hamburg ausgestellten Baumschulpflanzen die höchste Auszeichnung zuerkannt wurde, nämlich der Goldene Ehrenpreis des Herrn Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wir erblicken hierin eine erfreuliche Anerkennung unseres zielbewußten Strebens, nur allerbestes Pflanzenmaterial heranzuziehen, das auch am neuen Standorte berechtigten Ansprüchen in vollem Umfange genügt.

Indem wir zum Schluß für das uns im verflossenen Jahre wiederum erwiesene Vertrauen unseren aufrichtigen Dank sagen, bitten wir um Zuweisung der vorliegenden Aufträge, deren sorgfältige Ausführung wir uns angelegen sein lassen.

J. Timm & Co.
Inh. Gustav Frahm

Elmshorn, Anfang Oktober 1953

# INHALTSVERZEICHNIS


Sie finden — auf Seite

Preise der Obstgehölze . . . . . 4—7

Vorrätige Baumformen:
a) Äpfel . . . . . 17
b) Birnen . . . . . 22
c) Pflaumen und Zwetschen etc. . . . . 25
d) Kirschen . . . . . 28

Beschreibung der Obstgehölze und Befruchtungsverhältnisse . . . . 8—35

Rosen: Preise und Sortenbeschreibung . . . . 36—47

Laubgehölze: Solitär- und Heckenpflanzen, Ziersträucher, Heister, Solitär-, Allee- und Zierbäume . . . . . 48—125

Kletterpflanzen . . . . . 126—131

Winterharte Freilandfarne und einige Stauden . 132—133

Koniferen (Nadelgehölze) . . . . . 134—149

Jungpflanzen zur Weiterkultur:
Beerenobst, Haselnüsse, Kletterpflanzen, Laubgehölze, Nadelgehölze . . . . . 150—170

Wildlinge (Veredlungsunterlagen) . . . . . 171—173

! Alphabetische Zusammenstellung der Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten unserer wichtigsten Gehölze und Koniferen . . . 174—180

Ausgerechnete Frachten für Stückgut und Waggonladungen . . . . . 181—183

Verkaufs- und Lieferbedingungen . . . . . 184—185

Alphabetisches Sachregister . . . . . 186



# Obstbäume und Fruchtsträucher

## 1. Kern- und Steinobst

| | St.-Umf. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Äpfel** siehe Sortenverzeichnis Seite 8 und Verzeichnis über vorrätige Baumformen und Unterlagen Seite 17 | | | | |
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt . . . | 7—8 | 2,60 | 24,— | 210,— |
| | 8—10 | 3,— | 27,— | 240,— |
| | 10—12 | 4,20 | 37,50 | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt . . . | 6—7 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| | 7—9 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| **Meterstämme:** Stammh. 80-100 cm, auf Stammbildner veredelt | 6—7 | 2,— | 19,— | 170,— |
| | 7—8 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| **Hochbüsche:** Stammhöhe 80 cm 2jährig . . . . . | | 2,— | 19,— | 170,— |
| **Buschbäume:** Stammhöhe ca. 60 cm 2jährig . . . . | | 2,— | 19,— | 170,— |
| 3—4jährig . . . . | | 2,65 | 23,50 | 210,— |
| **Spindelbüsche:** Stammhöhe 40—50 cm 2jährig . . . . | | 1,90 | 17,— | 150,— |
| 3—4jährig . . . . | | 2,25 | 20,— | 180,— |
| **Schrägspaliere:** 1 Etage . . . . . | | 3,— | 27,— | |
| 2 Etagen . . . . . | | 3,75 | 34,— | |
| **Senkrechte Schnurbäume:** Stammhöhe 40—50 cm 2jährig | | 1,90 | 17,— | 150,— |
| 3—4jährig | | 2,25 | 20,— | 180,— |
| **Waagerechte Schnurbäume:** 1armig 2jährig . . . . | | 2,65 | | |
| 3—4jährig . . . . | | 3,40 | | |
| 2armig 2jährig . . . . | | 3,40 | | |
| 3—4jährig . . . . | | 4,15 | | |
| **Birnen** siehe Sortenverzeichnis Seite 18 und Verzeichnis über vorrätige Baumformen und Unterlagen Seite 22 | | | | |
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt . . . | 7—8 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 8—10 | 4,15 | 37,50 | 340,— |
| | 10—12 | 5,25 | | |
| im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt . . . | 8—10 | 5,25 | | |
| | 10—12 | 6,40 | | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt . . . | 6—7 | 2,65 | 23,50 | 210,— |
| | 7—9 | 3,— | 27,— | 240,— |
| im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt . . . | 7—9 | 4,15 | | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| | St.-Umf. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Buschbäume:** Stammhöhe ca. 60 cm auf Sämling, 2jährig | | 2,25 | 20,— | 180,— |
| 3—4jährig | | 3,— | 27,— | 240,— |
| Stammhöhe ca. 60 cm, auf Quitte veredelt 2jährig | | 2,65 | 23,50 | 210,— |
| 3—4jährig | | 3,40 | 30,— | 270,— |
| **Spindelbüsche:** Stammhöhe 40—50 cm, auf Quitte veredelt 2jährig | | 2,25 | 20,— | |
| 3—4jährig | | 3,— | 27,— | |
| **Schrägspaliere:** 1 Etage | | 3,40 | | |
| 2 Etagen | | 4,15 | | |
| **Senkrechte Schnurbäume:** Stammhöhe 40—50 cm, auf Quitte veredelt 2jährig | | 2,25 | 20,— | |
| 3—4jährig | | 3,— | 27,— | |
| **Waagerechte Schnurbäume:** auf Quitte veredelt 1armig 2jährig | | 3,— | | |
| 3—4jährig | | 3,75 | | |
| 2armig 2jährig | | 3,75 | | |
| 3—4jährig | | 4,50 | | |

## Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

siehe Sortenverzeichnis Seite 22 und Verzeichnis über vorrätige Baumformen und Unterlagen Seite 24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt | 7—8 | 2,60 | 24,— | 210,— |
| | 8—10 | 3,— | 27,— | 240,— |
| | 10—12 | 4,20 | 37,50 | |
| im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt | 8—10 | 5,25 | 48,— | |
| | 10—12 | 6,— | 54,— | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt | 6—7 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| | 7—9 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt | 7—9 | 4,15 | 37,50 | |
| **Buschbäume:** Stammhöhe 50—60 cm 2jährig | | 2,25 | 20,— | 180,— |
| 3—4jährig | | 2,65 | 24,— | 210,— |

## Süßkirschen

siehe Sortenverzeichnis Seite 24 und Verzeichnis über vorrätige Baumformen und Unterlagen Seite 28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm | 7—8 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 8—10 | 4,15 | 37,50 | 340,— |
| | 10—12 | 4,80 | 45,— | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm | 6—7 | 2,65 | 24,— | 210,— |
| | 7—9 | 3,— | 27,— | 240,— |

## Sauerkirschen

siehe Sortenverzeichnis Seite 27 und Verzeichnis über vorrätige Baumformen und Unterlagen Seite 28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm | 7—8 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 8—10 | 4,15 | 37,50 | 340,— |
| | 10—12 | 4,80 | 45,— | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm | 6—7 | 2,65 | 24,— | 210,— |
| | 7—9 | 3,— | 27,— | 240,— |
| **Buschbäume:** auf Mahaleb veredelt 1jährig | | 1,90 | 17,— | 150,— |
| 2jährig Stammhöhe 50—60 cm | | 2,25 | 20,— | 180,— |
| **Fächer:** 1jährig | | 2,65 | 24,— | 210,— |
| 2jährig | | 3,40 | 30,— | 270,— |

## Aprikosen siehe Sortenverzeichnis Seite 29

**Die Pflanzung ist nur im Frühjahr zu empfehlen!**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt | | 6,— | | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt | | 4,50 | | |
| **Buschbäume** auf Sämling oder Pflaume, 1jährig | | 3,75 | 34,— | |
| **Fächer:** auf Pflaume veredelt, 1jährig | | 5,25 | | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

## Pfirsiche siehe Sortenverzeichnis Seite 29

**Die Pflanzung ist nur im Frühjahr zu empfehlen!**

| | St.-Umf. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme:** Stammhöhe ca. 180 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt | | 6,— | | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt | | 4,50 | | |
| **Buschbäume:** auf Pfirsichsämling veredelt, 1jährig | | 3,75 | 34,— | 300,— |
| auf Pflaumensämling oder Senker, 1jährig | | 3,75 | 34,— | 300,— |
| **Fächer:** auf Pflaume veredelt, 1jährig | | 4,85 | | |

## Quitten siehe Sortenverzeichnis Seite 30

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm | | 3,— | 27,— | 240,— |
| **Buschbäume:** Stammhöhe 40—60 cm, 2—3jährig | | 2,60 | 23,50 | 210,— |
| **Einjährige Veredlungen** | | 1,90 | 17,— | 150,— |

## Mispeln siehe Sortenverzeichnis Seite 30

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Buschbäume:** Stammhöhe 40—60 cm, 2—3jährig | | 2,60 | 23,50 | |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 120—140 cm, mit 1jähriger Krone | | 3,— | | |

## Kirschäpfel

**Malus prunifolia hybrida** (J. Timm & Co.), siehe Malus S. 93

## Eßbare Eberesche

**Sorbus aucuparia moravica,** siehe Sorbus Seite 116

# 2. Beerenobst

## Johannisbeeren siehe Sortenverzeichnis Seite 31

in roten, schwarzen und weißen Sorten (außer Heros und Silvergieters Schwarze):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sträucher 3—5 Triebe 1000 St. 240,— DM | 0,35 | 3,— | 27,— |
| Sträucher 5—8 Triebe 1000 St. 300,— DM | 0,40 | 3,75 | 34,— |
| Sträucher 8—12 Triebe 1000 St. 370,— DM | 0,55 | 4,80 | 42,— |
| **Heros und Silvergieters Schwarze:** | | | |
| Sträucher 3—5 Triebe | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| Sträucher 5—8 Triebe | 0,45 | 4,20 | 37,50 |
| **Hochstämme:** Stammhöhe 90—110 cm, 3—4 Kronentriebe | 1,10 | 10,— | 90,— |
| 4 und mehr Kronentriebe, Ia Qualität | 1,35 | 12,— | 105,— |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 60—90 cm, 3—4 Kronentriebe | 1,— | 9,50 | 83,— |
| 4 und mehr Kronentriebe, Ia Qualität | 1,10 | 10,— | 90,— |

## Stachelbeeren siehe Sortenverzeichnis Seite 31

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sträucher 3—5 Triebe | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| Sträucher 5—8 Triebe | 0,55 | 4,80 | 42,— |
| Sträucher 8—12 Triebe | 0,65 | 6,— | 54,— |
| **Hochstämme:** Stammhöhe 90—110 cm, 4—6 Kronentriebe | 1,10 | 10,— | 90,— |
| 6 und mehr Kronentriebe | 1,35 | 12,— | 105,— |
| **Halbstämme:** Stammhöhe 60—90 cm, 4—6 Kronentriebe | 1,— | 9,50 | 83,— |
| 6 und mehr Kronentriebe | 1,10 | 10,— | 90,— |

**Amerikanische Gebirgsstachelbeere,** besonders zum Grünpflücken geeignet, außerordentlich ertragreich, besonders widerstandsfähig gegen den amerikanischen Mehltau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sträucher 3—5 Triebe | 0,30 | 2,70 | 24,— |
| Sträucher 5—8 Triebe | 0,40 | 3,75 | 34,— |
| Sträucher 8—12 Triebe | 0,50 | 4,50 | 41,— |

## Schwarzer Holunder

**Sambucus nigra,** siehe Sambucus Seite 114

## Brombeeren siehe Sortenverzeichnis Seite 32

| | | St.-Umf. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Boysenbeere,** verpflanzte Ruten | | | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **laciniata,** verpflanzte Sträucher | 1000 St. 405,— DM | | 0,60 | 5,10 | 45,— |
| **Theodor Reimers** (Amerik. Sandbrombeere) verpflanzte Sträucher | 1000 St. 405,— DM | | 0,60 | 5,10 | 45.— |
| **Wilsons Frühe** (Vierländer Frühe) 1jährige Ruten | 1000 St. 270,— DM | | 0,40 | 3,50 | 30,— |
| verpflanzte Ruten | 1000 St. 405,— DM | | 0,60 | 5.10 | 45,— |

## Himbeeren siehe Sortenverzeichnis Seite 33

Um mit aufgepflanzten Himbeeren einen guten Erfolg zu haben, ist es notwendig, daß diese beim Pflanzen auf 15 cm zurückgeschnitten werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Deutschland,** 1jährige Ruten | | 0,20 | 1,70 | 15,— |
| **Nordmark,** 1jährige Ruten | | 0,20 | 1,70 | 15,— |
| verpflanzte Ruten | | 0,30 | 2,70 | 24,— |
| **Preußen** 1jährige Ruten | 1000 St. 135,— DM | 0,20 | 1,70 | 15,— |
| verpflanzte Ruten | 1000 St. 210,— DM | 0,30 | 2,70 | 24,— |

## Weinreben siehe Sortenverzeichnis Seite 33

**Freilandsorten:**
**Blauer Portugieser; Früher blauer Burgunder; Früher Malingre; Gelbe Seidentraube; Perle v. Czaba; Weißer Gutedel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1jährig verpfl., auf 60—80 cm pinciert, mit Topfballen | 1,90 | 17,— | 150,— |
| 2jährig verpfl., auf 100—140 cm pinciert, mit Topfballen | 2,60 | 23,50 | 210,— |

**Treibhaussorten:**
**Black Hamburgh; Blauer Alicante; Buckland Sweetwater; Gros Colman**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1jährig verpfl., auf 80—100 cm pinciert, mit Topfballen | 3,— | 27,— | |
| 2jährig verpfl., auf 100—140 cm pinciert, mit Topfballen | 3,75 | 34,— | |

## Erdbeeren siehe Sortenverzeichnis Seite 33

| | 10 St. DM | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|
| **a) großfrüchtige Sorten:** | | | |
| **Deutsch Evern, Hansa, Mme. Moutôt, Oberschlesien, Sieger** bewurzelte Ausläufer oder 1jährig pikierte Pflanzen | | 4,50 | 38,— |
| **Dithmarschen, Eva Macherauch, Mieze Schindler** bewurzelte Ausläufer oder 1jährig pikierte Pflanzen | | 4,50 | 41,— |
| **Georg Soltwedel** bewurzelte Ausläufer oder 1jährig pikierte Pflanzen | 0,75 | 6,75 | 64,— |
| **b) Monatserdbeeren:** | | | |
| **Baron Solemacher** und **Rügen,** pik. Sämlinge | | 4,50 | 38,— |

# 3. Schalenobst

## Haselnüsse siehe Sortenverzeichnis Seite 35

| | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|
| **Großfrüchtige Sorten,** Büsche von Ablegern | 1,50 | 13,50 | 120,— |

**Aus Samen gezogen** (Corylus avellana) siehe Seite 68

## Walnüsse

| | St.-Umf. cm | |
|---|---|---|
| **Hochstämme:** Stammhöhe 150—180 cm | 8—10 | 7,50 |
| | 10—12 | 9,— |
| | 12—14 | 10,50 |
| in fertigem Zustande zum 3. und 4. × verpflanzt | 12—14 | 12,— |
| | 14—16 | 15,— |
| | 16—18 | 19,— |
| | 18—20 | 25,— |
| | 20—25 | 33,— |

## Eßbare Kastanie

Castanea sativa, siehe Castanea Seite 64

# 4. Sonstiges

## Rhabarber siehe Sortenverzeichnis Seite 35

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Holsteiner Blut** | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| **Queen Viktoria** | 0,30 | 2,70 | 24,— |
| **The Sutton** | 0,45 | 4,— | 36,— |

## Spargel

| | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|
| **Ruhm von Braunschweig,** 1jährige Sämlinge | 3,— | 27,— |
| 2jährige Sämlinge | 3,75 | 34,— |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

# Sortenbeschreibungen

## I. Kern- und Steinobst

### Zeichenerklärung:

**Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben diejenigen Baumformen an, die für die jeweilige Sorte am geeignetsten sind.** Sind Buchstaben kräftig gedruckt, so bedeutet dies, daß auf diese Baumform besonders zurückgegriffen werden sollte, wobei auch auf hiesige Verhältnisse weitgehendst eingegangen worden ist. Es bedeuten: H = Hochstamm, h = Halbstamm, Nst = Niederstamm, B = Busch und Pyramide, sC = senkrechter Schnurbaum (senkrechter Cordon), F = Fächer und Sp = Spaliere. **Alle unterstrichenen Namen kennzeichnen diejenigen Hauptsorten, welche nach den neuesten Erkenntnissen für das gesamte Bundesgebiet empfohlen werden können.**

## A. Äpfel

**Adamsapfel**
**mittelspätreifend** (November-Ende Februar) B, sC. Eine bisher wenig bekannte Sorte. Die Früchte sind hochgebaut, groß und glänzend dunkelblutrot. Das Fleisch ist unter der Schale etwas gerötet, sehr saftig und süßweinig gewürzt. Der Baum bildet eine kugelige Krone, wächst schwach und verlangt deshalb einen kräftigen, feuchten Boden; im Alter reichtragend.

**Altenländer Pfannkuchenapfel**
**spätreifend** (März-Juni) h, **Nst, B.** Frucht mittelgroß bis groß, gelblich mit **rötlich geflammter Sonnenseite,** sehr saftreich und wohlschmeckend. Er soll scharf im Schnitt gehalten werden, um wüchsig und gesund zu bleiben. Hat sich auch auf Typ XI in besseren Geestböden sehr gut bewährt. Eignet sich besonders gut für Kühl- und Scheunenlagerung. Zur Hauptsache Wirtschaftsapfel. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Ananas-Renette**
**mittelspätreifend** (November-März) B, sC. Eine sehr feine Tafelobstsorte allerersten Ranges. Frucht regelmäßig, klein bis mittelgroß, Schale goldgelb, mit typischen grünen Rostpunkten, sonnenseits nur dunkler, ohne Röte. Fleisch gelblich, mürbe, fein weinig gewürzt mit ausgesprochenem Ananasgeschmack. Frucht ist lange haltbar, gut transportfähig und welkt nicht. Findet trotz geringer Größe gute Preise. Kronenbau klein und breitkugelförmig. Um gleichmäßig große Früchte zu ernten, verlangt die Sorte besten Boden, fachgerechten Schnitt und bei zu reichem Behang eine Ausdünnung der Früchte. Mehr für warme mittel- und süddeutsche Lagen geeignet. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Baumanns Renette**
**mittelspätreifend** (Dezember-April) H, h, B. Dieser Tafelapfel stammt aus Belgien. Frucht mittelgroß bis groß, flach gebaut, glänzend, **lebhaft rot gefärbt.** Fleisch weiß, weinartig, wenig gewürzt, fest. Hält sich durch den ganzen Winter frisch und saftig, ohne zu welken. Gut versandfest. Baum ist starkwüchsig. Fruchtbarkeit setzt früh ein. Um gute Früchte hervorzubringen, verlangt diese Sorte einen guten Boden und muß genügend im Schnitt gehalten werden. Auf ungünstigen Böden tritt Fusikladium und Krebs auf. Für den schleswig-holsteinischen Anbau nicht geeignet. Kronenbildung verhältnismäßig klein, lädt aber ziemlich breit aus. Guter Pollenbildner! Blüte früh.

**Berner Rosenapfel**
**mittelspätreifend** (Dezember-März) H, h, B. Eine wohlschmeckende, sehr schön gefärbte Schweizer Tafelobstsorte. Frucht abgestumpft, eiförmig, teils mehr rundlich. Schale glänzend, geschmeidig und zuweilen etwas fettig. Farbe bei Lagerreife **leuchtend rot,** stark blau bereift. Fleisch gelblichweiß, anfangs fest, dann mürbe, saftig. Gute Lager- und Versandfestigkeit. Wachstum anfangs stark, dann mittelstark, in mangelhaften Bodenverhältnissen jedoch infolge des reichen Fruchtansatzes bald kümmerlich. Verlangt, um gesund zu bleiben, einen guten Boden, zumal er auf nassen Böden leicht unter Schorf und Krebs leidet. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Biesterfelder Renette**
**mittelfrühreifend** (Oktober-November) H, h, **B.** Frucht groß, leuchtend gelb, an der Sonnenseite **rotgestreift,** ähnlich der Blenheimer Goldrenette, nur höher gebaut, saftig, edel im Geschmack. Kann in windgeschützten Lagen als guter Ersatz für Gravensteiner empfohlen werden. Kronenbau kräftig und breit ausladend, auf kaltgründigen Böden nicht krebsfest. Sehr schöne Tafelobstsorte. Einer der besten Herbstäpfel. Schlechter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Blenheimer Goldrenette**
(Goldrenette von Blenheim), **mittelspätreifend** (November-März) H, **h,** B. Ein sehr begehrter Tafelapfel aus England, Frucht groß, plattrund, mehr breit als hoch. Schale glatt, goldgelb, sonnenwärts **prächtig karmesinrot.** Fleisch gelblichweiß, saftig, fein gewürzt, mürbe. Nicht ganz windfest. Zum sicheren Ertrag verlangt sie beste Vorbedingungen. Wuchs kräftig, Kronenbildung breit mit stark abstehenden Ästen. Widerstandsfähig gegen Fusikladium. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Blutroter Boskoop** siehe Roter Boskoop

**Bohnapfel**
(Großer Rheinischer Bohnapfel), **spätreifend** (Januar-Juni) **H,** h. Wirtschaftsapfel. Frucht mittelgroß, **streifig gerötet.** Fleisch grünlichweiß mit leicht säuerlichem Aroma. Kaum eine andere Sorte läßt sich so lange unter primitivsten Verhältnissen lagern. Sehr reichtragend, diebstahlsicher und eine der bekanntesten bäuerlichen Straßenobstsorten Mittel- und Süddeutschlands. Frucht sehr wind- und versandfest. Bildet aufrechte, pyramidale Kronen, die sich später durch ihren hohen Behang überneigen. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Brettacher**
**mittelspätreifend** (November-März) **H,** h. Eine sehr zu empfehlende Württemberger Wirtschaftssorte, die auch in anderen warmen Gegenden angepflanzt werden sollte. Frucht groß bis sehr groß, auf grüngelbem Grund, **rot gestreift** und verwaschen, gleichmäßig in der Größe, saftig und weißfleischig, hat große Ähnlichkeit mit dem Ontario. Bringt sehr hohe Erträge, ist schorfresistent und ist durch seine wachsige, feste Schale lange haltbar. Baum wächst stark und bildet breit ausladende Kronen. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Coulons Renette**
**mittelspätreifend** (Dezember-März) H, h. Frucht groß, grünlichgelb, meist leicht berostet, sonnenseits **rötlich** gestreift, Fruchtfleisch süßsäuerlich, ähnlich wie beim Boskoop, nur weniger Fruchtsäure. Trägt an manchen Stellen gleichmäßiger als Boskoop, besonders, wenn er regelmäßig im Schnitt gehalten wird. Gedeiht gleich gut auf schweren wie auf leichten Böden. Seine Fehler bestehen in seiner nicht sehr lebhaften Farbe und in der Neigung zur Stippigkeit. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Cousinot** siehe Purpurroter Cousinot

**Cox' Orangenrenette**
**mittelspätreifend** (November-Februar) H, h, Nst, **B.** Einer der begehrtesten und edelsten Tafeläpfel, die wir besitzen. Frucht mittelgroß, ebenmäßig geformt, goldgelb, **braunrot** getuscht. Um gut ausgebildete, gleichmäßige und große Früchte zu erzielen, sollte er nur auf besten Böden angepflanzt werden. Ist auf dem Markt immer der bestbezahlte Apfel. Für **Holsteiner** Verhältnisse ist diese Sorte besonders als Buschbaum auf der Unterlage EM IV und EM XI zu empfehlen. Kann als Standbaum und sehr guter Füller Verwendung finden. Als Mutationen sind Crimsons Cox, Roter Cox und gestreifter Cox bekannt. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Danziger Kantapfel**
**mittelfrühreifend** (Oktober-Januar) H, h. Die Frucht ist groß, rund, gerippt, **dunkelrot,** die Haut in der Vollreife stark wachsig. Das Fleisch ist saftreich und von gutem Aroma. Er ist wegen seiner schönen Färbung gut zu verkaufen. Erträge hoch, etwas versand- und druckempfindlich. Eignet sich besonders für rauhe Gebirgslagen. Krone breit ausladend, wenig anspruchsvoll an den Boden. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Echter Weißer Glockenapfel** siehe Weißer Winterglockenapfel

**Ellisons Orange**
**mittelfrühreifend** (September-Oktober) B, sC. In Form und Farbe sehr ähnlich der alten Cox' Orangenrenette. Eine **Neueinführung** aus England. Besitzt einen stärkeren Geschmack als Cox' Orangen Renette und ist eine gute Ertragssorte. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Erbachhofer Mostapfel**
**mittelspätreifend** (Oktober-Februar) H. Ähnelt stark dem Roten Trierer Weinapfel, jedoch ist die Frucht größer und hochgebaut. Der Baum wächst kräftig, ist gesund und überaus fruchtbar. Eine Straßen- und Mostsorte, die wegen ihrer Gesundheit und Wüchsigkeit die alte Sorte Trierer Weinapfel verdrängt hat, vor allem für Mittel- und Süddeutschland. Sehr guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Filippa**
**mittelfrühreifend** (November-Januar) h, B. Frucht mittelgroß, gelb, **leicht gerötet.** Diese Sorte stammt aus Dänemark. Fruchtfleisch ist saftreich und sehr aromatisch. Ein sehr reichtragender Herbstapfel, der vor dem Horneburger gepflückt werden kann. Leider nicht ganz windfest und etwas zu wenig lebhaft gefärbt. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Finkenwerder Herbstprinz**
**mittelspätreifend** (Januar-März) h, **Nst, B,** sC. Frucht groß bis sehr groß, mehr hoch als breit. Zur Reifezeit färbt er sich auf goldgelbem Untergrund an der Sonnenseite **rot.** Diese Lokalsorte aus dem Alten Lande ist es wert, daß sie möglichst weit bekannt wird. Sie ist infolge ihrer regelmäßigen Erträge eine der angenehmsten Sorten im Anbau und wegen ihrer Farbe und Saftigkeit auf den Märkten immer mehr gefragt. Einer unserer geschmacklich wertvollsten Massenträger, fusikladium- und krebsfest, soll stark im Schnitt gehalten werden, um wüchsig zu bleiben. Sowohl als Standbaum, wie als Füller zu empfehlen. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Freiherr von Berlepsch**
(Goldrenette von Berlepsch), **mittelspätreifend** (Dezember-März) B, Sp. Tafelsorte I. Ranges! Frucht mittelgroß, etwas höher als breit, leicht gerippt, Schale zur Reife goldgelb, sonnenseits **rötlich überlaufen.** Fleisch fest, sehr saftreich und von besonderem Aroma. Lange haltbar, wenn nicht zu früh geerntet, windfest, Wuchs nur mittelstark, Krone breitpyramidal, trägt regelmäßig und reich. Für den Erwerbsobstbau ist eine warme und geschützte Lage notwendig, damit die Früchte ihre volle Güte erlangen. Im Erwerbsobstbau am besten als Füller. Ist auf nassen Böden krebsanfällig. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Geheimrat Breuhahn**
**spätreifend** (Dezember-April) B, Sp. Frucht mittelgroß bis groß, regelmäßig gebaut. Die vorherrschende Form ist oval. Bei Eintritt der Genußreife färbt sich die Schale hellgelb. Die Röte ist am Baum nur schwach, erst auf dem Lager tritt sie **lebhaft leuchtend** in Erscheinung. Fleisch gelblichweiß, ziemlich fest, saftig mit gutem Aroma. Zeichnet sich besonders durch seine gute Haltbarkeit aus. Er zeigt einen gesunden, aufrechten Wuchs. Ertrag gut und regelmäßig. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Geheimrat Oldenburg**
**mittelfrühreifend** (Oktober-Dezember) H, h, **Nst, B,** sC. Kreuzungsprodukt von Minister von Hammerstein und Baumanns Renette. Frucht mittelgroß, sehr regelmäßig, fast wie bei der Goldparmäne. Schale dünn und fettig, goldgelb und sonnenseits **lebhaft karminrot** gestreift und gebändert. Fleisch gelblichweiß von kräftig erfrischendem Geschmack. Erträge **früh,** regelmäßig und reich. Guter Tafel- und Marktapfel. Wegen seiner prächtigen Färbung sehr geschätzt. Frucht nicht ganz windfest. Diese Sorte ist als Füller besonders zu empfehlen. Guter Pollenbildner! Blüte früh.

**Gelber Edelapfel**
**mittelfrühreifend** (November-Januar) H, h, B. Ein guter Wirtschaftsapfel, auch als Tafelfrucht annehmbar. Frucht gleichmäßig, flachrund, groß bis sehr groß, von rein goldgelber Färbung. Das schneeweiße Fruchtfleisch ist fest und weinsäuerlich im Geschmack. Die Sorte stellt keine besonderen Ansprüche an Boden und Lage und bringt regelmäßige Erträge. Der Wuchs ist kräftig und bildet eine breitkugelige Krone. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Gelber Holsteiner Cox,** siehe Holsteiner Gelber Cox

**Gelber Richard**
**mittelfrühreifend** (Oktober-Januar) H, h. **Eine ausgesprochene Delikateß-Sorte,** die sich am ehesten mit dem Gravensteiner vergleichen läßt. Diese nur in besonders luftfeuchten und vor allem windgeschützen Lagen zu empfehlende Apfelsorte zeichnet sich mit ihrer zitronengelben, saftigen Frucht durch einen äußerst aromatischen Wohlgeschmack aus. Ihre Fehler liegen in unsicheren Ernten und Fusikladiumanfälligkeit.

**Gelbe Schleswiger Renette** (Gelbe Lottorfer)
**mittelfrühreifend** (Oktober-November) h, Nst, B. Diese sehr fruchtbare, mäßig bis schwachwachsende **Lokalsorte** weist mittelgroße, fast kugelförmige Früchte mit fettig grüngelber Schale und weißlich-gelbem, sehr saftigem Fleisch auf. **Eine für die Obstversorgung im bäuerlichen Kleingarten der sandigen Geestböden unentbehrliche Sorte, die absolut schorf- und krebsfest ist.**

**Goldparmäne**
(Wintergoldparmäne), **mittelfrühreifend** (Oktober-Februar) H, **h,** Nst, B. Ein sehr gut bezahlter Tafelapfel. Frucht mittelgroß, mehr hoch als breit, regelmäßig gebaut, zuweilen auch rundlich abgeplattet. Schale goldgelb, sonnenseits von karmesinfarbener Röte. Fleisch weißlichgelb, fest, saftig und fein gewürzt. Sehr gut lager- und transportfähig. Bildet pyramidale Kronen; Ertrag früh und reich. Für hiesige Verhältnisse empfiehlt es sich, ihn nicht als Hochstamm, sondern als Buschbaum auf Typ XI zu ziehen. Muß aus dem gleichen Grunde auch gut im Schnitt gehalten werden. Eine der wertvollsten Marktsorten überhaupt, besonders für Mittel- und Süddeutschland. Gut als Füller zu gebrauchen. Bester Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Goldrenette von Berlepsch** siehe Freiherr von Berlepsch

**Goldrenette von Blenheim** siehe Blenheimer Goldrenette

**Grahams Jubiläumsapfel**
**mittelfrühreifend** (November-Januar) H, h. Frucht groß, meist höher als breit, lebhaft gelb gefärbt, meist ohne Rötung. Die Sorte stammt aus England. Es entwickeln sich große Schaufrüchte mit wirkungsvoller gelber Grundfarbe. Bei großer Anspruchslosigkeit an Schnitt und Pflege zuverlässige Ertragssorte auch auf **ärmsten Geestböden.** Fleisch hart, weißfleischig, säuerlich. Vor allem **Wirtschaftsapfel.** Guter Pollenbildner! Blüte sehr spät.

**Gravensteiner**
**frühreifend** (September-Oktober) **H, h,** Nst, B. Ein vorzüglicher Tafelapfel. Frucht mittelgroß, hochgebaut. Schale hellgelb, glänzend, leicht fettig, zur Sonnenseite **rötlich** geflammt. Fleisch gelblich, fein, locker, sehr saftig, von süßweinigem, hochedlem Geschmack, verbunden mit seinem charakteristischen Geruch. Die Früchte sollen mit Eintritt der Baumreife sofort geerntet werden, da sie nicht fest hängen. Um ihn früher zum Tragen zu bringen, soll man sowohl schwachwachsende Stammbildner (Cousinot), wie auch nur mittelstarkwachsende Typenunterlagen (Typ IV) verwenden. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Großer Rheinischer Bohnapfel** siehe Bohnapfel

**Holsteiner Gelber Cox**
(Syn. Rutschapfel, Vahldieks Säml. Nr. 1), **mittelfrühreifend** (November-Januar) H, **h, Nst, B.** Form und Größe sehr regelmäßig, mittelgroß bis groß, leicht **orange getönt.** Fleisch im Aussehen und Geschmack der Cox' Orangen Renette sehr ähnlich. Diese **sehr zu empfehlende neue Sorte** zeichnet sich der Cox' Orangenrenette gegenüber durch besondere Wüchsigkeit und vor allem aber durch ihre praktisch absolute Widerstandsfähigkeit gegen Schorf und Krebs vorteilhaft aus. Reich und sicher tragend. Hochreife Früchte haben eine bestechend leuchtend gelbe Grundfarbe. Kann größere Bedeutung als Weihnachtsapfel erlangen. Schlechter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Horneburger Pfannkuchenapfel**

**spätreifend** (Januar-April) H, h. Wirtschaftsapfel im Alten Land und für die Geest. Ein großfrüchtiger Abkömmling vom Echten Boikenapfel, wie er von der Hausfrau gewünscht wird. Frucht gleichmäßig groß, sonnenseits **lebhaft rot überzogen.** Soll in den ersten Jahren gut im Schnitt gehalten werden, um wuchsfreudig zu bleiben. Eine Wirtschaftssorte, die im Ertrag kaum von einer anderen übertroffen werden kann. Hervorragend für die Kühllagerung geeignet. Sehr für Nachpflanzungen in alten Obsthöfen zu empfehlen. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Ingrid Marie**

**mittelfrühreifend** (Dezember-Januar) h, Nst, B. Ein dänischer Cox-Sämling mit sehr ansprechendem Äußeren und regelmäßiger, flachrunder Form. Mittelgroß, aber größer als Cox'. Form mehr breit und flach, Färbung viel intensiver rot, etwas berostet. Geschmack erfrischend, säuerlich-süß, mit gutem Aroma, stärker wachsend als die Muttersorte, außerdem viel gesunder. Pflückreife Mitte Oktober. Weihnachtsapfel. Guter Pollenspender! Blüte spät.

**Jakob Fischer**

Da der Baum sehr frostfest ist, wird er in der Hauptsache als Stamm- und Gerüstbildner verwendet. Die Verträglichkeit mit anderen Sorten ist gut. In Süddeutschland ist auch die Frucht geschätzt, die mittelgroß wird und sich bis in den Winter hinein hält.

**Jakob Lebel**

**mittelfrühreifend** (Oktober-Januar) H, h. Frucht groß bis sehr groß, Schale fein und glänzend, in der Hochreife schön gelb, zur Sonnenseite oft längere und kürzere **rote Streifen.** Bildet auf dem Lager einen starken Fettüberzug. Fleisch gelblichweiß, mürbe und saftig, von angenehmer Säure. Nicht ganz windfest, sehr guter Kochapfel. Besonders für Höhenlagen geeignet. Sehr fruchtbar und durch seine fette Schale lange haltbar. Einer der besten Wirtschaftsäpfel! Schlechter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**James Grieve**

**frühreifend** (September-Oktober) H, h, B. Ein sehr wohlschmeckender Tafelapfel. Diese englische Sorte ist mittelgroß, von ziemlich gleichmäßiger Form, Schale glatt, glänzend und geschmeidig, Farbe **rot gestreift** auf gelber Grundfarbe. Fleisch gelblichweiß, zart, saftig und erfrischend. Ähnelt in der Form sehr dem Geheimrat Oldenburg. Ertrag früh und regelmäßig. Verlangt beste Böden, da sonst leicht Krebs auftritt. Zeigt nur anfangs ein kräftiges Wachstum. Kronenbildung flachrund. Seine Schwäche ist, daß er zuweilen im Ertrag nicht befriedigt. Zum Anbau vor allem als Buschbaum (Füller) geeignet. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Jonathan**

**spätreifend** (Dezember-April) H, **h, Nst, B.** Diese ausgesprochene Marktsorte stellt einen lagerfesten, sehr gut gefärbten und überaus wohlschmeckenden Tafelapfel dar. Hat in Amerika die gleiche Bedeutung wie hier der Cox. Frucht regelmäßig, günstige mittlere Handelsgröße. Schale glatt und glänzend, gelb, **rot gestreift** und verwaschen. Fleisch ist mürbe, süßweinig, aromatisch. Frucht erreicht ab Weihnachten bis weit in den Frühling hinein die höchsten Preise. Bildet kleine kugelige Kronen. Früh- und reichtragend, widerstandsfähig gegen Schorf, gering mehltauanfällig. Frucht windfest. Der dünne Trieb verlangt einen starken Rückschnitt. Nur für beste Böden. Sehr gute Füllersorte. Der Jonathan ist neben dem Ontario eine Sorte, die sich von Bozen bis nach Schweden immer mehr im Aufstieg befindet. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Kaiser Wilhelm**

**mittelspätreifend** (Dezember-März) H, h. Sämling von Harberts Renette. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Frucht mittelgroß bis groß, flach und kegelförmig. Schale goldgelb, sonnenseits **lebhaft karminrot** gefärbt. Fleisch gelblichweiß, ziemlich fest, von angenehmer weiniger Säure, saftig, mäßig gewürzt. Wuchs kräftig, Krone breitkugelig. Ertrag setzt erst spät, dann jedoch regelmäßig und reich ein. Unter Krankheiten und Schädlingen hat die Sorte infolge des festen Blattes wenig zu leiden. Leidet auf nassen Böden unter Krebs. Ist in Holstein sehr für Geestböden zu empfehlen. Frucht ist windfest. Läßt sich als **schön rotgefärbter Winterapfel** gut verkaufen. Schlechter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Klarapfel**

(Weißer Klarapfel), **frühreifend** (Juli-August) H, h, **Nst, B.** Tafelapfel. Sorte entstammt dem Baltikum. Frucht mittelgroß bis groß, 7—9 cm breit und hoch. Schale grünlich-weiß bis weißlich-gelb, glatt. Fleisch weiß, locker und feinkörnig; Geschmack feinsäuerlich; **kräftig** duftend. Er darf nicht lange liegen, sonst verliert er an Geschmack und wird mehlig, auch druckempfindlich. Wuchs läßt beim Einsetzen des Ertrages nach. Trägt reich und regelmäßig. Wird als Buschbaum am besten auf EM XI angepflanzt. Bester Stammbildner ist Cousinot. Gute Füllersorte für Boskoop. Am besten in warmen, geschützten Lagen. Auf kalten, nassen Böden krebsanfällig. Guter Pollenbildner! Blüte früh.

**Krügers Dickstiel**

(Achimer Renette, Celler Dickstiel, Woltmanns Renette), **mittelspätreifend** (November-Januar) H, h, Nst. Sehr feiner Tafelapfel. Frucht regelmäßig geformt und mittelgroß, grünlich-gelb durchlaufen, an der Sonnenseite jedoch **rot geflammt.** Fleisch gelblichweiß, vollsaftig, fest und fein gewürzt. Er ist ziemlich starkwüchsig. Diese hannoversche Landessorte ist als wichtigste Sorte sowohl für die Geest, als auch für die Marsch geeignet. Die Erträge setzen erst spät, dann jedoch hoch und regelmäßig ein. Neigt in ungünstigen Lagen etwas zu Stippigkeit und Mehltau. Ist für Spindel wegen zu dichter Krone ungeeignet. Guter Pollenbildner! Blüte sehr spät.

**Landsberger Renette**
**mittelfrühreifend** (Dezember-Februar) H, h, **B.** Tafel- und Wirtschaftsapfel. Frucht groß bis sehr groß, plattrund bis breitkegelförmig. Schale glatt, Farbe am Baum hellgrün, an der Sonnenseite nicht selten **etwas rotbackig.** Fleisch gelblichweiß, sehr saftig, locker, von angenehmem, süßweinigen Geschmack. Trägt früh, regelmäßig und reich, windfest, aber druckempfindlich. Bildet in der Jugend kräftige und gerade Stämme. Leidet auf warmen und trockenen Standorten unter Mehltau, sowie auf schweren und nassen Böden unter Krebs. Eignet sich besonders für höhere und kühle Lagen. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Laxtons Superb**
**mittelspätreifend** (Dezember-März) Nst, B. Eine sehr wohlschmeckende englische Tafelobstsorte. Die Frucht ist groß bis sehr groß und ähnelt in Form und Farbe der Cox' Orangenrenette, von der sie abstammt; ist bedeutend größer, jedoch nicht ganz so schön gefärbt. Der Baum ist sehr wüchsig, früh- und sehr reichtragend. Nur die in luftfeuchten Gebieten geernteten Früchte bleiben auf dem Obstlager vollsaftig. Leider ist diese Sorte nicht überall fusikladium- und moniliafest. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Maren Nissen**
**mittelfrühreifend** (Oktober-November) B. Die Frucht ist fein gewürzt und ähnlich dem echten Prinzenapfel.

**Martini**
**spätreifend** (Februar-Mai) H, h, B, sC. Dieser sehr wohlschmeckende Tafelapfel ist besonders stark in der nördlichen Elbmarsch vertreten und stellt höchstwahrscheinlich einen Sämling der Cox' Orangenrenette dar. Er kann überall dort stärkstens empfohlen werden, wo beste Bodenverhältnisse vorherrschen, weil er auf geringeren Böden zu klein bleibt. Daneben soll er unbedingt stark im Schnitt gehalten werden. Leidet teilweise etwas unter Roter Spinne. Diese Sorte sollte wegen ihrer guten Haltbarkeit, Farbe, Form und Aroma nicht nur im Nordwesten vertreten bleiben, sondern in allen Erwerbsanbaugebieten auf ihre Eignung erprobt werden. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Minister von Hammerstein**
**spätreifend** (Dezember-März). Für alle Baumformen geeignet, jedoch besonders als Zwergobstbaum zu empfehlen, da sich das Fruchtholz ganz kurz ziehen läßt und der Baum andererseits durch bessere Besonnung schöner gefärbte Früchte hervorbringt. Eine sehr wohlschmeckende Tafelobstsorte, die jedoch nur für den Privatobstbau in Frage kommt. Frucht groß, platt und regelmäßig gebaut. Schale schwach fettig, abgerieben stark glänzend. Farbe wachsgelb mit leichtem roten Anflug. Fleisch gelblichweiß, locker und mürbe, sehr saftreich und erfrischend. Scheidet für den Erwerbsobstbau aus, weil sie nicht transportfähig und zu wenig gefärbt ist. Guter Pollenbildner! Blüte früh.

**Mutterapfel**
**mittelfrühreifend** (Oktober-Dezember) H, h, Nst, B, sC. Die mittel bis großen Früchte sind rundlich bis kegelig, von gelber Farbe und lebhaft rot überzogen und gestreift. Im Geschmack sehr fein, der Cox' Orangenrenette ähnlich. Der Baum wächst mittelstark und bringt regelmäßige Erträge. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Ontarioapfel**
**spätreifend** (Januar-Mai) H, h, **Nst, B.** Eine unserer wertvollsten Tafel- und Wirtschaftssorten. Aus Amerika eingeführt. Frucht 8—9 cm breit und 7—8 cm hoch, platt gedrückt, meist regelmäßig gebaut. Grundfarbe am Baum grünbläulich bereift, bei der Reife lebhaft gelb, auf der Sonnenseite später **lebhaft rot** verwaschen. Fleisch weiß, fest saftig und von angenehmer Säure. Muß unbedingt auf einem frostharten Stammbildner stehen. Soll erst Ende Februar auf den Markt gebracht werden, wenn er seine volle Färbung erreicht hat. Sein großer Vorzug ist, daß die Früchte gleichmäßig groß sind und sich vermöge ihrer starken Wachsschicht sehr lange auf dem Lager halten, ohne zu welken. Ist wegen seines festen Blattes sehr widerstandsfähig gegenüber Schorf. Lediglich in trockenen und eingeschlossenen Lagen leidet er zuweilen unter Mehltau und auf kaltgründigen Böden unter Krebs. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Purpurroter Cousinot**
**mittelspätreifend** (Dezember-Februar) H, h. Eine außerordentlich reichtragende, anspruchslose Wirtschaftssorte für den bäuerlichen Extensivobstbau auch auf leichtesten Geestböden. Frucht mittelgroß, von dunkelroter bis karmesinroter Farbe. Fleisch gelblichweiß, manchmal leicht gerötet, fest, saftig, weinig und süß, jedoch wenig gewürzt. Lagerung kann ziemlich hoch in Erdmieten vor sich gehen. Versand sogar in Säcken möglich. Da er wenig Kulturkosten verursacht, verdient er Beachtung für Straßen- und freie Feldpflanzungen. Für den Liebhaber hat er als Weihnachtsapfel Bedeutung. Die Blüte genießt wegen ihrer besonderen Schönheit Zierwert. Sorte ist windfest und gesund. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Rheinischer Krummstiel**
**spätreifend** (April-Mai) **H,** h. **In Mittel- und Süddeutschland ein gern gepflanzter stark- und breitwachsender Wirtschaftsapfel,** der sich jedoch auch als Tafelapfel verwenden läßt. Frucht leicht rötlich gestreift, Fleisch sehr fest, weiß und angenehm säuerlich. Guter Pollenspender! Blüte spät.

**Rheinischer Roter Winterrambour**
(Teuringer Rambour), **spätreifend** (Dezember-Mai) H, h. Eine sehr schön gefärbte Massenverbrauchssorte für Industrie. Frucht meist plattrund und unregelmäßig, an der Sonnenseite **lebhaft rot gestreift.** Die Frucht erlangt trotz Fehlens hoher Geschmackswerte ihre wirtschaftliche Bedeutung, weil sie überaus haltbar und versandfest ist und sich leicht verkaufen läßt. Bildet sehr große, weitausladende Kronen. Baum wird sehr alt und bleibt gesund. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Röd Cox Orangen**
**mittelfrühreifend** (November-Januar) B, sC. Die Frucht ist mittelgroß, rot gefärbt und der Cox' Orangenrenette sehr ähnlich.

**Roter Boskoop**
(Blutroter Boskoop), **mittelspätreifend** (Dezember-März) H, h, B. Hier handelt es sich um eine **besonders schön gefärbte** Knospenmutation des Schönen von Boskoop, die sich auf dem Markt zunehmender Verbreitung erfreut. Hat sonst die gleichen Eigenschaften wie seine Ausgangssorte. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Roter Eiserapfel**
(Paradiesapfel), **spätreifend** (Dezember-Juni) H. Ein sehr reichtragender Wirtschaftsapfel. Frucht mittelgroß, stumpf zugespitzt, auch hochgebaut, in der Regel mehr breit als hoch. Schale **dunkelkarmesinrot** gefärbt. Fleisch gelblichweiß, saftig mit leichter Säure. Bei guter Lagerung halten sich die Früchte in gutem Zustande bis zum Sommer, ohne zu welken. Schale und Fleisch sind fest, daher ist die Sorte eine gute Versandfrucht. Der Baum wächst stark und gesund, die Krone breit mit abstehenden Ästen. Setzt etwas spät mit dem Ertrag ein, trägt dann aber regelmäßig und reich. Widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, Frucht ist absolut windfest. Vor allem zum Anbau in Mittel- und Süddeutschland. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Rote Sternrenette**
**mittelspätreifend** (November-Februar) H. Diese Wirtschafts- und Tafelobstsorte ist besonders stark am Niederrhein vertreten. Früchte sind rundlich, sehr gleichmäßig und von mittlerer Größe. Das Rot der Frucht ist stark durchsetzt mit weißen, sternförmigen Rostpunkten. Fleisch gelblichweiß, locker und schwach gewürzt. Frucht ist sehr versand- und lagerfest. Verlangt einen guten und nährstoffreichen Boden, weil sonst die Früchte zu klein bleiben. Verträgt einen relativ hohen Grundwasserstand. Die Sorte ist widerstandsfähig gegenüber Krebs und Fusikladium. Frucht nicht ganz windfest. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Roter Trierer Weinapfel**
**mittelspätreifend** (Dezember-April) H, h. Die rundlich-kegelige Frucht ist klein bis mittelgroß, von gelber Grundfarbe, rötlich überzogen und dunkel gestreift. Das Fleisch ist sehr saftreich und herb-süßweinig im Geschmack, was die Sorte besonders zur Apfelweinbereitung wertvoll macht. Der Baum bildet eine hohe, runde Krone, die im Alter durch den außerordentlichen Ertrag oftmals stark herabhängt. Die Leistungsfähigkeit der Sorte kann nur unter günstigen Bedingungen voll entfaltet werden. Blüte mittelspät.

**Schleswiger Renette,** siehe Gelbe Schleswiger Renette

**Schöner aus Bath**
**frühreifend** (Juli-September) h, Nst, B. Einer unserer allerbesten frühen Tafeläpfel. Frucht mittelgroß, flach, regelmäßig geformt, ohne Rippen und Falten. Schale glatt, bei Lagerreife orangegelb, sonnenseits lebhaft rot geflammt. Fleisch gelblich, fest, saftig und würzig. Hält bei guter Lagerung 4—6 Wochen. Verlangt einen sehr guten Boden, damit die Früchte groß genug werden können. Versandfähigkeit der Frucht ist gut. Krone ist breitsparrig. Gedeiht am besten in warmen Lagen. Fruchtet sehr gut und regelmäßig und ist windfest. Widerstandsfähig gegen Krebs, Fusikladium und Monilia. Für hiesige Verhältnisse nur als Niederstamm und Busch zu empfehlen auf Typ XI. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Schöner aus Boskoop**
**mittelspätreifend** (Dezember-April) **H, h,** B. Frucht ist groß bis sehr groß, mehr hoch als breit. Schale meist rauh und stark berostet, sonnenseits oftmals karmesinrote Färbung. Fleisch gelb, fest, saftreich, von vorzüglich gewürztem Renettengeschmack. Wird überall da voll befriedigen, wo die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist. Soll, um früher zu tragen, auf einen schwachwachsenden Stammbildner veredelt werden. Aus dem gleichen Grund soll nur wenig geschnitten, sondern lediglich etwas ausgeglichen werden. Um seine vollen Qualitäten zu erlangen, darf er nicht vor Anfang Oktober geerntet werden. Früchte sitzen sehr fest am Baume und welken bei trockener Luft leicht auf dem Lager. Kronenbau mehr breit als hoch. Als Buschbaum nur auf EM IV veredelt anzubauen. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Schöner aus Nordhausen**
**mittelspätreifend** (November-März) B. Tafelobstsorte. Frucht mittelgroß, regelmäßig gebaut, nach oben und unten abgeflacht. Schale glatt, fettig und glänzend, bei Lagerreife weißlichgelb und sonnenseits matt rot überzogen. Fleisch weiß, fest, später locker, sehr saftig und von angenehmem weinsäuerlichen Geschmack. Früchte werden gleichmäßig groß bis mittelgroß, lager- und versandfest. Fruchtet früh und regelmäßig. Zeichnet sich durch besondere Frosthärte aus. Stellt keine besonderen Bodenansprüche; besonders zum Anbau in Mittel- und Süddeutschland. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Signe Tillisch**
**mittelfrüh**reifend (Oktober-Dezember) H, h, B. Ein außerordentlich wohlschmeckender, hochfeiner Tafelapfel für den Privatanbau. Diese dänische Sorte eignet sich in erster Linie für feuchte, nicht zu leichte Böden. Frucht groß und flach gebaut, 7—8 cm hoch und 8—9 cm breit. Schale dünn, grünlichgelb, auf der Sonnenseite leicht gerötet, bei Vollreife leuchtend gelb. Fleisch würzig und erfrischend. Da sie stark wächst, beginnt sie erst spät mit dem Ertrag. Geeignet für Kühlhauslagerung. Leidet leider zuweilen unter Fusikladium und Stippigkeit, zumal wenn viel Stickstoff gegeben wird. Sie ist ein Wechselträger. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Stahls Winterprinz**
**spät**reifend (Januar-März) h, B. Eine sehr reichtragende Erwerbsobstsorte. Die Frucht ist mittelgroß und länglich geformt. Fleisch gelb, sonnenseits stark gerötet, von hervorragend würzigem Geschmack, trägt stark, aber nicht regelmäßig, ist durch seinen Wachsüberzug lange haltbar, auch für leichte Böden geeignet. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Teuringer Rambour** siehe Rheinischer Winterrambour

**Weißer Klarapfel** siehe Klarapfel

**Weißer Winter-Glockenapfel**
(Echter Weißer Glockenapfel), **spät**reifend (Dezember-April) h, Nst. Eine hiesige weitverbreitete Lokalsorte, die als Tafelapfel jedoch weitere Verbreitung verdient. Steht bereits in der Schweiz an der Spitze der umveredelten Sorten. Frucht mittelgroß, sich glockenförmig zum Kelch hin verjüngend. Farbe reingelb, ohne Zeichnung. Fleisch fest, von angenehm feinsäuerlichem Aroma. Gehört zu unseren wertvollsten Lagersorten. Soll wegen seiner schlechten Verankerung im Boden nur in niederen Baumformen gezogen werden. Für Niederstamm am besten auf Sämling. Soll in den ersten 5—6 Jahren scharf im Schnitt gehalten werden, um wuchsfreudig zu bleiben. Hervorragend für Kühl- und Scheunenlagerung zu gebrauchen. Bislang gibt es kaum eine andere Sorte, die so lange hält und dabei saftig und aromatisch bleibt. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Welschisner**
(Welscheisner, Großer Böhmischer Brünnerling) **spät**reifend (Januar-Mai) H. Eine Massenmarktfrucht für den Spätbedarf auf dem Münchener Markte. Stark verbreitet im Bodenseegebiet und Nieder-Österreich. Frucht mittelgroß bis groß, unregelmäßig geformt, Schale glatt, glänzend, schwach wachsartig. Farbe zuerst zitronengelb, später **leuchtend blutrot** und sehr ansprechend. Bei guter Lagerung bis Juni haltbar. Der Apfel wird im Lager täglich schöner und welkt nicht. Als Tafelapfel ist er zu trocken und hat zu wenig Säure. Er stellt eine örtliche Haupthandelssorte dar, die wegen ihrer Lagerfestigkeit, Haltbarkeit und Versandhärte allgemein beliebt ist. Diese Sorte bedarf nur geringer Pflege und wächst noch sehr gut auf trockenen Böden. Schlechter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Wilstedter Apfel**
**mittelspät**reifend (Dezember-April) H, h, B. Die Früchte zeigen eine dunkelrote Farbe und gleichen in der Form Stahls Winterprinz. Der Wuchs der Sorte ist kräftig.

**Wintergoldparmäne** siehe Goldparmäne

**Winterrambour** siehe Rheinischer Roter Winterrambour

**Zabergäu Renette**
**mittelspät**reifend (Januar-März) H, h. Diese Sorte wurde vor etwa 20 Jahren in einem Seitental des Neckars im Zabergäu aufgefunden. Sie stellt ein Mittelding zwischen Boskoop und Blenheim dar, wird von manchen Fachleuten als alte „Reinette de Canada grise" angesehen. Sie ist frosthärter als Boskoop, nicht so anspruchsvoll an den Boden und besser im Geschmack und Farbe als Boskoop. Frucht groß bis sehr groß, ähnlich wie bei Boskoop. Diese Sorte stellt einen wertvollen Ersatz für den Boskoop dar, fühlt sich auch in genügend luftfeuchten Gebieten am wohlsten. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Zuccalmaglios Renette**
**mittelspät**reifend (Dezember-März) h, B, Sp. Ein hochfeiner Tafelapfel für wärmere Gegenden. Sie stellt eine Kreuzung von Ananas-Renette und Purpurroter Agatapfel dar. Frucht mittelgroß bis groß, hochgebaut, erinnert in der Form an die Ananas-Renette. Schale fest, zitronengelb mit matter Röte. Fleisch gelblich, fest, später mürbe, saftig, mit renettenartig gewürztem, edlem Geschmack. Zur Erzielung gleichmäßig großer Früchte ist es erforderlich, daß bei zu großem Fruchtbehang ausgebrochen und der Baum in den ersten Jahren einem kräftigen Schnitt unterworfen wird. Ertrag setzt ziemlich früh, regelmäßig und reich ein. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

# Befruchtungsverhältnisse unserer Apfelsorten

Bei Anpflanzung von Apfelbäumen verschiedener Sorten fällt den Befruchtungsverhältnissen eine entscheidende Rolle zu. Es muß zunächst festgestellt werden, daß es keine Apfelsorte gibt, die selbstfruchtbar (selbstfertil) ist. In den vorangegangenen Sortenbeschreibungen haben wir am Schlusse bereits kurze Hinweise in Bezug auf Pollenbildner und Blütenbeginn gemacht. Hieraus ist schon zu ersehen, daß es gute und schlechte Pollenbildner gibt. Bei den meisten schlechten Pollenbildnern handelt es sich um Sorten mit erhöhter Chromosomenzahl, die als triploid bezeichnet werden. Die guten Pollenbildner verfügen über einen normalen Chromosomensatz und werden als diploide Sorten bezeichnet. In jahrelangen wissenschaftlichen Versuchen hat man nun für jede Sorte die günstigsten Befruchtersorten ausgewählt, wobei sich diese Sorten natürlich in ihrer Blütezeit decken müssen.

Bei Feststellung der in einer Anlage vorhandenen Pollenspendersorten sind nur solche Bäume von Interesse, die nicht weiter als 100 m voneinander entfernt stehen, weil sonst eine Pollenübertragung zu sehr in Frage gestellt wird.

**Für folgende Sorten sollten nach Rudloff und Schanderl nachfolgende Pollenspender besondere Berücksichtigung finden:**

| | |
|---|---|
| **Ananas Renette** | Baumanns Renette, Cox' Orangen Renette, Croncels, Filippa, Oldenburg, Ontario, Klarapfel, Goldparmäne. |
| **Baumanns Renette** | Ananas Renette, Boiken, Croncels, Danziger Kant, Filippa, Goldparmäne, Landsberger, Oldenburg, Ontario, Klarapfel. |
| **Altenländer Pfannkuchenapfel** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Biesterfelder Renette** | Cox' Orangen, Ontario, Zuccalmaglio, Baumanns, Oldenburg, Klarapfel. |
| **Blenheimer Goldrenette** | Baumanns, Berner Rosenapfel, Champagner Renette, Cox' Orangen Renette, Croncels, Jonathan, Klarapfel, Landsberger, Ontario, Danziger Kant. |
| **Bohnapfel** | Baumanns, Berner Rosen, Früher Viktoria, Goldparmäne, Ontario. |
| **Brettacher** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Champagner Renette** | Baumanns, Berner Rosenapfel, Croncels, Danziger Kantapfel, Glockenapfel, Goldparmäne, Jonathan, Oldenburg, Ontario. |
| **Cox' Orangen Renette** | Goldparmäne, Jonathan, Oldenburg, Ontario, Schöner aus Nordhausen. |
| **Coulons Renette** | Altenländer Pfannkuchen, Cox' Orangen, Klarapfel, Goldparmäne. |
| **Croncels** | Ananas Renette, Baumanns, Cox' Orangen, Goldparmäne, Hammerstein, Klarapfel, Landsberger. |
| **Danziger Kantapfel** | Berner Rosenapfel, Boiken, Champagner Renette, Croncels, Glockenapfel, Jonathan, Ontario, Signe Tillisch, Goldparmäne. |
| **Ellisons Orange** | wie bei Cox' Orangen Renette. |
| **Erbachhofer Mostapfel** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Fesefeld** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Filippa** | Schöner aus Bath, Signe Tillisch, Weißer Astrachan. |
| **Freiherr von Berlepsch** | Ananas, Cox' Orangen, Filippa, Gelber Edel, Goldparmäne, Landsberger, Zuccalmaglios. |
| **Finkenwerder Herbstprinz** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Früher Viktoriaapfel** | Cox' Orangen, Croncels, Goldparmäne, Baumanns, Zuccalmaglios, Schöner aus Nordhausen, Signe Tillisch, Klarapfel, James Grieve. |
| **Geheimrat Breuhahn** | Goldparmäne, Landsberger, Klarapfel, James Grieve, Zuccalmaglios Renette. |
| **Geheimrat Oldenburg** | Ananas Renette, Cox' Orangen, Croncels, Goldparmäne, Zuccalmaglios, Früher Viktoria, James Grieve, Klarapfel. |
| **Goldparmäne** | Ananas Renette, Cox' Orangen, Croncels, Baumanns, James Grieve, Klarapfel, Schöner aus Nordhausen, Zuccalmaglios, Ontario. |
| **Grahams Jubiläumsapfel** | Charlamowsky, Kaiser Alexander, Rote Sternrenette, Roter Trierer Weinapfel. |
| **Gravensteiner** | Baumanns, Ananas Renette, Cox' Orangen, Croncels, Goldparmäne, Ontario, Zuccalmaglios, Klarapfel, Oldenburg, Schöner aus Nordhausen. |

| | |
|---|---|
| **Holsteiner Gelber Cox** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Horneburger Pfannkuchenapfel** | Jonathan, Goldparmäne, Weißer Winter-Glockenapfel, Altenländer Pfannkuchenapfel. |
| **Ingrid Marie** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Jakob Lebel** | Croncels, Cox' Orangen, Baumanns, Goldparmäne, Ontario, Früher Viktoria, Geheimrat Oldenburg, Schöner aus Nordhausen, Zuccalmaglios. |
| **James Grieve** | Croncels, Cox' Orangen, Klarapfel, Zuccalmaglios, Landsberger, Schöner aus Nordhausen. |
| **Jonathan** | Goldparmäne, Oldenburg. |
| **Kaiser Wilhelm** | Baumanns, Cox' Orangen, Goldparmäne, Gelber Edelapfel, Ontario. |
| **Klarapfel** | Ananas Renette, Baumanns, Geheimrat Oldenburg, Goldparmäne, James Grieve. |
| **Krügers Dickstiel** | Geheimrat Oldenburg. |
| **Landsberger Renette** | Baumanns, Cox' Orangen, Croncels, Freiherr v. Berlepsch, Goldparmäne, Klarapfel, Zuccalmaglios. |
| **Laxtons Superb** | Ananas Renette, Cox' Orangen, Croncels, Goldparmäne, James Grieve. |
| **Martini** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Minister von Hammerstein** | Ananas Renette, Baumanns, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Geheimrat Oldenburg, Zuccalmaglios. |
| **Neuer Berner Rosenapfel** | Champagner Renette, Hammerstein. |
| **Ontarioapfel** | Baumanns, Neuer Berner Rosenapfel, Champagner, Cox' Orangen, Danziger Kant, Filippa, Gelber Edelapfel, Glockenapfel, Goldparmäne, Oldenburg, Rote Sternrenette. |
| **Pommerscher Krummstiel** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Purpurroter Cousinot** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Rheinischer Roter Winterrambour** | Boikenapfel, Rote Sternrenette, Schöner aus Nordhausen, Ontarioapfel. |
| **Riesenboikenapfel** | Gelber Edel, Ontario, Rheinischer Krummstiel, Roter Bellefleur, Rote Sternrenette. |
| **Roter Boskoop** | Ananas Renette, Goldparmäne, Baumanns, Ontario, Klarapfel, Landsberger, Oldenburg, James Grieve. |
| **Roter Eiserapfel** | Cox' Orangen Renette, Goldparmäne, Ontarioapfel, Zuccalmaglios. |
| **Rote Sternrenette** | Ontario, Roter Trierer Weinapfel, Baumanns, Landsberger, Zuccalmaglios. |
| **Schöner aus Bath** | Bismarckapfel, Filippa. |
| **Schöner aus Boskoop** | Ananas Renette, Baumanns, Berner Rosenapfel, Boikenapfel, Cox' Orangen, Danziger Kantapfel, Gelber Edel, Goldparmäne, Hammerstein, Landsberger, Oldenburg, Schöner aus Nordhausen, Klarapfel, Zuccalmaglios. |
| **Schöner aus Nordhausen** | Ontario, Goldparmäne, Landsberger, Oldenburg, Zuccalmaglios. |
| **Signe Tillisch** | Filippa, Ananas Renette, Croncels, Baumanns, Landsberger, Klarapfel, Schöner aus Nordhausen. |
| **Stahls Winterprinz** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Weißer Winterglockenapfel** | Jonathan. |
| **Welschisner** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Zabergäu Renette** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Zuccalmaglios Renette** | Ananas Renette, Baumanns, Goldparmäne, Oldenburg, Cox' Orangen, Croncels, James Grieve, Früher Viktoria, Schöner aus Nordhausen. |

# Folgende Apfelsorten sind vorrätig:

| Sorte | Hochst. von unten gezogen | Hochst. auf Stammbildner | Halbst. von unten gezogen | Halbst. auf Stammbildner | Meterstamm auf Stammbildner | Hochbusch auf EM XI | Busch auf EM II | Busch auf EM IV | Busch auf EM XI | Spindelbusch auf EM IX | senkr. Schnurbaum auf EM IX | waag. Schnurbaum 1 arm. IX | waag. Schnurbaum 2 arm. IX | Spalier, 1 Etg. auf EM I | Spalier, 1 Etg. auf EM II | Spalier, 1 Etg. auf EM IV | Spalier, 2 Etg. auf EM I | Spalier, 2 Etg. auf EM IV | Spalier, 2 Etg. 3X v. auf EM IV | Spalier, 2 Etg. 3X v. auf EM XI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamsapfel | | | | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Altenländer Pfannkuchenapfel | | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | X |
| Ananas Renette | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | | X | | |
| Baumanns Renette | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Berner Rosenapfel | | X | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| Biesterfelder Renette | | | | X | | | | X | X | X | X | | | X | | | X | | | |
| Blenheimer Goldrenette | | X | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| Bohnapfel | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brettacher | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coulons Renette | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cox' Orangen Renette | | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Danziger Kantapfel | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ellisons Orange | | | | | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Erbachhofer Mostapfel | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filippa | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Finkenwerder Herbstprinz | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Freiherr von Berlepsch | | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | | | | | |
| Geheimrat Breuhahn | | X | | X | | | | | X | | | | | X | | | X | | | X |
| Geheimrat Oldenburg | | | | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | | X |
| Gelber Edelapfel | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gelber Richard | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gelbe Schleswiger Renette | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Goldparmäne | | X | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Grahams Jubiläumsapfel | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gravensteiner | | X | | X | X | | X | X | | | X | X | X | | X | X | | X | X | |
| Holsteiner Gelber Cox | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horneburger Pfannkuchenapfel | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingrid Marie | | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | X | | | | | |
| Jakob Fischer | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jakob Lebel | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| James Grieve | | X | | X | | X | | | X | X | X | | | X | | | X | | | X |
| Jonathan | | | | | X | | | | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | |
| Kaiser Wilhelm | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klarapfel | | X | | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Krügers Dickstiel | | X | | X | | X | | | X | X | X | | | X | | | X | | | |
| Landsberger Renette | | X | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | |
| Laxtons Superb | | | | | | | | X | X | | | | | X | | | X | | X | |
| Maren Nissen | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| Martini | | X | | X | | X | | | X | | | | | X | | X | X | X | | X |
| Minister von Hammerstein | | X | | X | | | X | | | | | | | X | | | X | | | |
| Mutterapfel | | X | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| Ontarioapfel | | X | | X | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Purpurroter Cousinot | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| Rheinischer Krummstiel | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhein. Roter Winterrambour | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Röd Cox | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X | |
| Roter Boskoop | | X | | X | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| Roter Eiserapfel | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rote Sternrenette | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roter Trierer Weinapfel | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schöner aus Bath | | X | | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | | |
| Schöner aus Boskoop | | X | | X | | | | X | | X | X | X | X | | X | | | | X | X |
| Schöner aus Miltenberg | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| Schöner aus Nordhausen | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Signe Tillisch | | | X | | | | X | | X | X | X | X | X | | | | | | X | |
| Stahls Winterprinz | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stina Lohmann | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Weißer Winterglockenapfel | | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | |
| Welschisner | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wilstedter Apfel | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Wohlschmecker aus Vierlanden | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Zabergäu Renette | | X | | X | | | | | X | X | X | | | X | | | X | | | |
| Zuccalmaglios Renette | | X | | X | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | | |

# B. Birnen

**Andenken an den Kongreß**
**Herbst**birne (September-Anfang Oktober) **H, h,** B, sC. Eine ausgezeichnete Schaufrucht, die durch ihre flammige Röte ins Auge fällt. Die Frucht ist groß, unregelmäßig in der Form, saftig und schwach gewürzt. Der Baum hat ein starkes Wachstum und verlangt mehrere Jahre einen stärkeren Rückschnitt, damit die Äste die großen Früchte tragen können. Die Sorte trägt früh und dankbar und stellt keine besonderen Bodenansprüche.

**Alexander Lucas**
(Butterbirne), **Winter**birne (Oktober-Dezember) H, **h, Nst,** B. Gute französische Tafelfrucht für Erwerbs- und Kleingarten. Hauptsorte für das Alte Land. Frucht groß, stumpf, kegelförmig. Schale glatt und glänzend, leuchtend gelb und gepunktet. Fleisch weiß, sehr saftig und süß, fast schmelzend. Fruchtet früh und regelmäßig. Fruchtholz ist lang. Muß gut im Schnitt gehalten werden. Nicht besonders anspruchsvoll an den Boden, gedeiht sogar noch in Höhenlagen sehr gut, schorffest. Pflückreife 10. Oktober. Schlechter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Augustbirne**
H, h. Eine unserer wertvollsten **Gerüstbildner zum Aufpfropfen anderer Lokalsorten.**

**Boscs Flaschenbirne**
**Herbst**birne (September-November) H, h, B. Eine gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Frucht birnen- bis flaschenförmig, groß, Schale mattgelb, zimtfarben, ziemlich glatt. Fleisch gelblichweiß, süß, sehr saftig, schmelzend. Zum Rohessen ebenso beliebt, wie zum Einmachen. Die Tragbarkeit tritt ziemlich früh ein und ist regelmäßig. Ist zur Formobstzucht nicht geeignet, da sie den kurzen Schnitt nicht verträgt. Ist recht widerstandsfähig gegen Krankheiten. Kronenbau neigt sich nach anfänglich starkem Wachstum mit zunehmendem Alter nach unten. Pflückreife August-September. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Bunte Julibirne**
**Sommer**birne (Juli-August) H, **h, Nst, B.** Diese frühe Marktsorte ist eine **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht mittelgroß, hochgebaut. Schale glatt, grünlichgelb, sonnenseits leicht rötlich gestreift. Die Sorte muß zeitig genug gepflückt werden, um gut im Geschmack zu bleiben, andernfalls wird sie schon nach 12 Tagen teigig. Wuchs in der Jugend kräftig, im Alter jedoch schwach und klein in der Krone. Stellt an den Boden keine hohen Ansprüche und ist wenig anfällig für Schädlinge. Frucht ist windfest. Pflückreife Juli. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Clapps Liebling**
**Sommer**birne (August-September) H, **h, Nst, B.** Unter den Frühbirnen nimmt diese amerikanische Sorte als Tafel-, Markt- und Wirtschaftssorte den ersten Platz ein. **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht groß, im Durchschnitt 8 cm hoch und 6 cm breit von gleichmäßiger, ausgesprochener Birnenform. Schale glänzend, bei Vollreife lebhaft gelb, sonnenseits lebhaft rot. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich und schmelzend. Frucht nicht ganz windfest. Trägt am langen Holz. Zuweilen tritt Fusikladium auf. Busch soll auf Quitte stehen. Pflückreife August. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Conférence**
**Herbst**birne (Anfang Oktober-Anfang November) H, **h, Nst, B.** Eine sehr zu empfehlende, saftige und würzige Tafel- und Erwerbssorte. **Hauptsorte im Alten Land.** Die Frucht ist mittelgroß, lang und gleichförmig, hellgrün, mit vielen Rostpunkten besetzt und ziemlich langstielig. Das Fruchtfleisch ist rosa, sehr saftig und schmelzend, von besonderem Wohlgeschmack. Obgleich sie noch wenig bekannt ist, kann sie wärmstens empfohlen werden. Sie reift zusammen mit der Bürgermeisterbirne, leidet nicht unter Fusikladium, ist gut als Windschutz geeignet und läßt sich gut im Kühlhaus lagern. Früh- und reichtragend. Pflückreife erste Oktoberwoche. Guter Pollenbildner! Blüte früh.

**Diels Butterbirne**
**Winter**birne (November-Dezember) h, B. Eine alte gute Tafelbirne. Frucht groß bis sehr groß, dickbauchig, Grundfarbe goldgelb, sonnenseits leicht gerötet. Fleisch anfangs fest, später weich, halbschmelzend, leicht steinig, sehr saftig und süß. Will man mit dieser Sorte keine Enttäuschung erleben, so soll sie nur in warmen, nährstoffreichen und ausreichend feuchten Böden kultiviert werden. Sorte leidet unter Fusikladium. Als Hochstamm liefert sie zu wenig Handelsfrüchte. Pflückreife Ende September. Vor allem für Mittel- und Süddeutschland. Schlechter Pollenbildner! Blüte früh.

**Frühe aus Trévoux**
**Sommer**birne (Anfang August) H, **h, Nst, B.** Eine gute Markt- und Tafelbirne. Frucht länglich und mittelgroß, Schale gelblichgrün mit schwach marmorierter Röte. Fleisch weiß, schmelzend, saftreich und aromatisch. Sie stellt eine der besten Frühbirnen dar, die auf dem Markt gerne gekauft und gut bezahlt werden. Muß früh gepflückt und gleich verschickt werden. Baum soll in den ersten Jahren im Schnitt gehalten werden. Fruchtbarkeit früh, regelmäßig und reich. Pflückreife Anfang August. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Frühlingsbirne** (Winterbirne)
(November-Januar) h und Nst. Eine ansehnliche **Lokalsorte,** die sich beim Kochen rötlich verfärbt und sich sogar bis in das Frühjahr hinein lagern läßt.

**Gellerts Butterbirne**
**Herbst**birne (September-Oktober) H, **h, B.** Steht unter den Herbstbirnen als edelste Tafelbirne an erster Stelle. Frucht mittelgroß bis groß. Schale gelblichgrün mit zimtfarbenem Rost bedeckt. Fleisch gelblichweiß, schmelzend, sehr saftreich, äußerst würzig. Leider ist sie nicht lange haltbar, jedoch ziemlich frosthart und gesund. Trägt ziemlich spät, periodisch und reich, nicht ganz windfest. Eignet sich wegen ihres starken und aufrechten Wuchses in geschützter Lage als Straßenbaum. Pflückreife Mitte September. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Gräfin von Paris**
(Comtesse de Paris), **Winter**birne (November-Januar) H, **h, Nst, B,** Sp. Eine gute, edle Tafel- und Marktfrucht. Frucht mittelgroß, länglich. Schale gelblichgrün mit zahlreichen Rostfiguren. Fleisch weiß, zart, saftreich und bei ausreichender Wärme sehr süß. Sie kann als eine der ertragreichsten, haltbarsten und kältewiderstandsfähigsten Sorten gelten. Ist gesund, trägt sehr früh, regelmäßig und reich. Hält sich bis in den Januar hinein, ohne zu welken. Wuchs aufrecht; sie bildet auffallend kurzes Fruchtholz und ist damit gut für Zwergformen geeignet. Pflückreife November. Wenn sie auf dem Lager gut ausreifen und ihren vollen Geschmack erhalten soll, muß sie genau wie Josephine von Mecheln spät im November geerntet werden. Dabei schaden einige Frostgrade im Freien gar nichts. Guter Pollenbildner! Blüte früh.

**Graf Moltke**
**Herbst**birne (Oktober) H, h, B. Frucht groß, zimtfarbig berostet, sehr saftig und wohlschmeckend. Der Baum trägt früh und bringt reiche Erträge. Eine der besten Sorten für nördliches Klima.

**Gute Graue**
**Sommer**birne (Anfang September) **H,** h. Eine vorzügliche französische Sorte für rauhe Lagen und den bäuerlichen Extensivobstbau. Frucht klein bis mittelgroß, kreiselförmig, Schale dick, Grundfarbe gelblichgrün, sonnenseits schwach und trüb gerötet. Fleisch mattweiß, schmelzend, äußerst saftig. Die Sorte ist absolut frosthart und liefert sehr große, bis 100 Jahre alte Bäume. Die Tragbarkeit setzt allerdings erst spät ein. Bevorzugt mehr feuchte Böden, die jedoch nicht von hohem Wert zu sein brauchen. Pflückreife Mitte September. Vor allem für Mittel- und Süddeutschland. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Gute Luise**
(Bonne Louise d'Avranches), **Herbst**birne H, **h, B, Sp.** Diese aus der Normandie stammende Tafelbirne zeigt eine große, länglich eiförmige Frucht. Schale glatt, fein, gelblichgrün, sonnenseits leicht punktiert. Fleisch gelblichweiß, sehr saftreich und süß. Eignet sich sehr zum Einmachen und zum Dörren. Wird leider in letzter Zeit von Fusikladium befallen. Sollte nur in allerbesten Lagen als Hochstamm gezogen werden. Vor allem für Mittel- und Süddeutschland. Eignet sich besonders gut für Zwergobst. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Herzogin Elsa**
**Herbst**birne (Ende September-Mitte Oktober) h, B, Sp. In günstigen Lagen eine beliebte Markt- und Liebhabersorte. Ist besonders stark im landwirtschaftlichen Obstbau Württembergs vertreten. Frucht länglich-kreiselförmig, etwa 9 cm hoch und 7 cm breit. Schale reingelb mit feinem zimtfarbenen und grauen Rost bedeckt. Sonnenseits schön gerötet. Fleisch saftig, sehr süß, fein gewürzt. Hält sich je nach Fruchtausbildung 2 bis 6 Wochen. Nicht für Kühllagerung geeignet. Krone bleibt verhältnismäßig klein. Pflückreife Mitte September. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Josephine von Mecheln**
**Winter**birne (Dezember-Januar) H, h, B. Diese sehr edle Tafelbirne läßt sich trotz ihrer kleinen bis mittelgroßen Früchte um die Weihnachtszeit gut verkaufen. Frucht kreiselförmig, fast rundlich, Schale glatt, feinkörnig, gelblichgrün mit zahlreichen Punkten. Fleisch gelblichweiß, schmelzend, feinkörnig und süß. Frosthärte ziemlich hoch. Triebstärke mittelstark. Trägt spät, periodisch und mittelstark, windfest. Pflückreife November. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Jules Guyot**
(Dr. J. Guyot), **Sommer**birne (Ende August-September) B, sC. Eine gute Tafel- und Marktfrucht, die sich zum Einmachen eignet. Sie ist groß bis sehr groß, hellgelb, sonnenwärts leicht gerötet, punktiert und leicht berostet, im Geschmack süßsäuerlich, saftig und angenehm gewürzt. Williams Christbirne sehr ähnlich, kommt aber in der Reife 8—14 Tage früher. Der Baum wächst stark, aufrecht und gedeiht noch in weniger bevorzugten Lagen. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Köstliche aus Charneu**
(Bürgermeisterbirne) **Herbst**birne (Oktober) **H, h,** Nst, B. Eine sehr begehrte Tafel- und Marktsorte, die auch für Wirtschaft und Kühllagerung sehr brauchbar ist. **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht 7 cm breit und 9,5 cm hoch, stark bauchig, kegelförmig. Schale fein grünlichgelb, später zitronengelb, sonnenseits schwach streifig gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein schmelzend, sehr saftig. Soll auf dem Lager nachreifen, wenn sie ihre volle Güte erlangen soll. Die Fruchtbarkeit ist überdurchschnittlich hoch. Gedeiht selbst noch unter wenig günstigen und windreichen Verhältnissen. Nicht für Spalierzucht geeignet, da sie den kurzen Schnitt nicht verträgt. Pflückreife erste Oktoberwoche. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Madame Verté**

**Winter**birne (November-Januar) h, Nst, B. Diese kräftig gewürzte Wintertafelbirne zählt auf den Rheingauer Versteigerungen mit zu den begehrtesten und bestbezahlten Birnen. Frucht mittelgroß, rund, eiförmig. Schale goldgelb und gleichmäßig von Rost überzogen. Fleisch gelblichweiß, saftig, wenig steinig, schmelzend. Hält sich bei guter Lagerung bis Januar. Sie wird auch noch unter hiesigen Verhältnissen weich und saftig. Baum verhältnismäßig schwachwüchsig. Pflückreife Anfang Oktober. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Neue Poiteau**

**Herbst**birne (Oktober-Mitte November) H, h, Nst. Diese sehr reichtragende Wirtschaftssorte sollte überall dort Berücksichtigung finden, wo es sich um sehr rauhe und kühle Lagen handelt, da sie hier sogar noch einen besseren Geschmack entwickelt. Frucht meistens birnenförmig, oft auch oval, 9 bis 10 cm lang und 6 bis 7 cm breit. Grundfarbe hellgrün mit sehr schwacher Färbung. Früchte hängen fest am Baum, daher besonders für windige Lagen zu empfehlen. Trägt reich von früher Jugend bis ins hohe Alter. **Hauptsorte im Alten Land.** Pflückreife September-Oktober. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

**Pastorenbirne**

**Winter**birne (November-Dezember) H, h. Sie kann als eine der besten Wirtschaftsbirnen für den Erwerbsobstbau angesehen werden. Frucht groß bis sehr groß, flaschenförmig, Schale dick und fest, mattgrün, sonnenseits schwach gerötet. Fleisch weißlichgelb, halbschmelzend, etwas grobkörnig, saftreich, ohne besonderes Aroma. Wuchs kräftig, breit und hochkronig, nicht windfest. Trägt reich und regelmäßig. Pflückreife Mitte Oktober. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Pitmaston**

**Herbst**birne (Oktober) Nst, B. Eine der größten Tafelbirnen überhaupt. Frucht 10,5—11,5 cm hoch und 8—8,5 cm breit. Schale sehr dünn, zitronengelb, sonnenseits leicht gerötet. Fleisch sehr zart, schmelzend, äußerst saftreich. Sie stellt bei einer Schwere von ½ kg eine Schaufrucht ersten Ranges dar. Früchte leiden bei frühzeitigem Versand keinen Schaden. Frucht hängt fest am Baum. Schlechter Pollenbildner! Blüte spät.

**Präsident Drouard**

**Winter**birne (Dezember-Januar) h, B, sC. Frucht groß, glockenförmig, hellgelb, braun punktiert, saftig und angenehm gewürzt. Der Baum wächst kräftig pyramidal, trägt früh und reichlich. Sandige, nährstoffreiche Böden sind vorteilhafter als schwere Böden, bezüglich der Lage ist die Sorte nicht empfindlich. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Solanerbirne**

**Sommer**birne (Mitte August bis Anfang September) H, h. Stammt aus Böhmen; trägt sehr gut und regelmäßig, heißt auch Schmalzbirne, wächst stark, ist gesund, für kräftige, warme Böden gut geeignet. Die Frucht ist grün, Großhandelssorte.

**Speckbirne**

**Herbst**birne (September-Oktober) H, h. Eine ausgesprochene Wirtschaftsfrucht. Lange Birnenform, grasgrün. Hat wenig Würze, Aroma und Zucker. Baum starkwachsend, straffer, aufrechter Wuchs, längliches ledriges Blatt. Eine sehr windfeste Wirtschaftssorte für Marschböden.

**Triumph aus Vienne**

**Herbst**birne (Anfang-Ende September) h, Nst, B. Eine gute Tafel- und Marktfrucht für den Erwerbsobstbau. **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht groß bis sehr groß, gleichmäßig, Schale fest, braun berostet, Fleisch fest, saftreich, angenehm süß und schwach gewürzt. Frosthärte mittel. Triebstärke mittelstark. Wenig anfällig gegen Schorf. Trägt früh, regelmäßig und mittelstark. Nicht ganz windfest. Pflückreife Anfang September. Guter Pollenbildner! Blüte mittelfrüh.

**Vereinsdechantsbirne**

**Herbst**birne (Oktober-November) B, Sp. Man kann sie wohl als unsere edelste Tafelbirne überhaupt bezeichnen, die jedoch nur unter allergünstigsten Verhältnissen voll befriedigt. Frucht groß, breitkegelförmig, Schale dünn, hellgelb, oft matt goldartig gerötet mit einigen Rostfiguren. Fleisch weiß, sehr saftreich, schmelzend, von köstlich-hochedlem Geschmack. Früchte werden gleichmäßig ausgebildet und hängen fest am Baum. Sollte besonders in Zwergformen angebaut werden. Spaliere an der Südwand werden stets die größten und edelsten Früchte bringen. Pflückreife Ende September. Guter Pollenbildner! Blüte spät.

**Williams Christbirne**

**Sommer**birne (August-September) H, h, Nst, B. Diese ausgezeichnete Tafel-, Markt- und Wirtschaftsfrucht ist die beste und gefragteste Birne für die Industrie, weil sie eingemacht ihre Würzigkeit behält. **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht mittelgroß bis groß, birnenförmig, Grundfarbe hellgelb, sonnenseits schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, steinfrei, sehr fein, saftreich, schmelzend mit äußerst würzigem Muskatgeschmack. Es gibt kaum eine andere Birne, die, eingemacht, ein so weißes Fleisch behält. Krone legt sich nach anfänglich starkem, aufrechtem Jugendwachstum im Alter durch starken Fruchtbehang auseinander. Trägt früh, regelmäßig und reich, nicht windfest. In Schleswig-Holstein wenig geeignet, da hier meist schorfanfällig. Pflückreife 10 Tage vor Genußreife. Guter Pollenbildner! Blüte mittelspät.

# Befruchtungsverhältnisse der Birnen

Das bei den Äpfeln über dieses Kapitel Gesagte trifft auch für die Birnen zu. Auch hier hat sich in wissenschaftlichen Versuchen herausgestellt, daß nur dann eine sichere Ernte zu erwarten ist, wenn die jeder Sorte eigenen Pollenspender berücksichtigt werden.

**Für folgende Sorten kommen nach Rudloff-Schanderl nachfolgende Pollenspender in Frage:**

| | |
|---|---|
| **Alexander Lucas** | Boscs, Bunte Julibirne, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Köstliche aus Charneu, Madame Verté, Neue Poiteau, Tongern, Williams Christbirne. |
| **Boscs Flaschenbirne** | Sorten wie bei Alexander Lucas. |
| **Bunte Julibirne** | Boscs, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Köstliche aus Charneu, Madame Verté, Neue Poiteau, Williams Christbirne. |
| **Clapps Liebling** | Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Boscs, Williams Christ, Gräfin von Paris, Neue Poiteau, Tongern, Bunte Juli. |
| **Conférence** | Boscs, Esperens Herrenbirne, Gute Luise, Williams Christ. |
| **Diels Butterbirne** | Sorten wie bei Alexander Lucas. |
| **Frühe aus Trévoux** | Boscs, Gellerts, Gute Luise, Madame Verté, Williams Christ, Neue Poiteau. |
| **Gellerts Butterbirne** | Madame Verté, Vereinsdechantsbirne, Williams Christbirne, Boscs, Bunte Juli, Clapps Liebling, Köstliche aus Charneu. |
| **Gräfin von Paris** | Madame Verté, Josephine von Mecheln, Bunte Juli, Gellerts Butterbirne, Clapps Liebling, Köstliche aus Charneu, Gute Luise, Williams Christbirne, Neue Poiteau. |
| **Gute Graue** | Josephine von Mecheln, Boscs, Köstliche aus Charneu. |
| **Gute Luise** | Köstliche aus Charneu, Vereinsdechantsbirne, Frühe aus Trévoux, Clapps Liebling, Josephine von Mecheln, Neue Poiteau, Gräfin von Paris. |
| **Herzogin Elsa** | Gute Luise, Williams Christbirne, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Tongern, Mad. Verté. |
| **Josephine von Mecheln** | Williams Christbirne, Boscs, Bunte Juli, Gräfin von Paris, Mad. Verté, Neue Poiteau, Gute Luise, Gellerts Butterbirne. |
| **Köstliche aus Charneu** | Boscs, Clapps Liebling, Neue Poiteau, Tongern, Williams Christ, Bunte Juli, Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Mad. Verté, Vereinsdechantsbirne. |
| **Madame Verté** | Vereinsdechantsbirne, Boscs, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Neue Poiteau. |
| **Neue Poiteau** | Köstliche aus Charneu, Gellerts Butterbirne, Clapps Liebling, Williams Christbirne, Bunte Julibirne, Gräfin von Paris, Mad. Verté, Josephine von Mecheln, Gute Luise. |
| **Pastorenbirne** | Gellerts Butterbirne, Boscs, Bunte Juli, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Neue Poiteau. |
| **Petersbirne** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Pitmaston** | Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Gute Luise, Mad. Verté, Tongern, Williams Christbirne, Vereinsdechantsbirne. |
| **Solanerbirne** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Speckbirne** | Im Versuch noch nicht festgestellt. |
| **Tongern** | Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Gute Luise, Mad. Verté, Triumph aus Vienne, Vereinsdechantsbirne, Williams Christbirne. |
| **Triumph aus Vienne** | Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Gute Luise, Herzogin Elsa, Vereinsdechantsbirne, Williams Christbirne. |
| **Vereinsdechantsbirne** | Clapps Liebling, Bunte Julibirne, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Gellerts Butterbirne, Williams Christbirne. |
| **Williams Christbirne** | Boscs, Bunte Julibirne, Clapps Liebling, Frühe aus Trévoux, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Herzogin Elsa, Josephine von Mecheln, Köstliche aus Charneu, Mad. Verté, Neue Poiteau, Tongern, Vereinsdechantsbirne. |

# Folgende Birnensorten sind vorrätig:

| | Hochstamm | | | Halbstamm | | | Buschbaum | | Spindelbusch auf Quitte | Spalier, 1 Etg. auf Quitte | senkr. Schnurb. auf Quitte | waag. Schnurb. auf Quitte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von unten gezogen | auf Stammbildner | 3 × v. | von unten gezogen | auf Stammbildner | 3 × v. | auf Wildling | auf Quitte | | | | 1arm. | 2arm. |
| Alexander Lucas | | × | × | | × | | | × | × | × | × | × | × |
| Andenken an den Kongreß | | | | × | | | × | | | | | | |
| Augustbirne | × | | | × | | | | | | | | | |
| Boscs Flaschenbirne | | × | | × | × | | × | | | | | | |
| Bunte Julibirne | | × | | × | × | | × | | | | | | |
| Clapps Liebling | | × | × | × | × | × | × | | | | | | |
| Conference | | × | | × | | | × | × | | | | | |
| Diels Butterbirne | | | | | | | | × | × | | × | × | × |
| Frühe aus Trévoux | | × | | × | × | | × | | | | | | |
| Frühlingsbirne | | | | | × | | | | | | | | |
| Gellerts Butterbirne | × | | | × | | × | | × | × | | | × | × |
| Graf Moltke | | × | | | × | | × | | | | | | |
| Gräfin von Paris | | × | × | × | × | | × | × | × | | × | × | × |
| Gute Graue | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| Gute Luise | | × | | × | × | | | | | | | | |
| Herzogin Elsa | | | | × | | | | × | | | | | |
| Josephine von Mechein | | × | | | × | | × | | | | | | |
| Jules Guyot | | | | | × | | × | | | | | | |
| Köstliche aus Charneu | | × | × | × | × | | × | × | × | × | | × | × |
| Le Lectier | | | | | | | | × | × | | × | × | × |
| Madame Verté | | | | | × | | | × | × | | × | × | × |
| Neue Poiteau | × | × | × | × | × | | | | | | | | |
| Pastorenbirne | | | | | | | | × | | | | × | × |
| Pitmaston | | | | | | | | × | × | | × | × | × |
| Präsident Drouard | × | | | × | × | | × | | | | | | |
| Solanerbirne | × | | | × | | | × | | | | | | |
| Speckbirne | × | | × | × | | | × | | | | | | |
| Triumph aus Vienne | | × | | × | × | | × | | | | | | |
| Vereinsdechantsbirne | | | × | | × | | × | × | × | | × | × | × |
| Williams Christbirne | × | | × | × | | | × | | × | × | × | × | × |

# C. Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

**Bühler Frühzwetsche**
frühreifend, (August-September). **Hauptsorte im Alten Land,** da sie hier erst im September reift und sich dann sehr gut verkaufen läßt. Frucht mittelgroß, meist schön eirund, Haut schwarzblau, fein blauweiß bereift. Verträgt durch ihre Festigkeit sehr gut den Versand. Fleisch grünlichweiß, saftig, süß, gut vom Stein lösend. Diese Sorte ist auch besonders stark am Bodensee vertreten, wo sie ihre beste Süße erreicht. Widerstandsfähig gegen Krankheiten. Eine Haupthandelssorte für Frischmarkt und Konservenbereitung. Selbstfruchtbar!

**Diamant**
spätreifend (Mitte bis Ende September). **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht mittelgroß bis groß, rundlich, blau, von sehr angenehm süßlichem Aroma. Frucht ist als Mundfrucht sehr gut abzusetzen. Gehört mit zu den wertvollsten frühen Sorten. Selbstfruchtbar!

**Emma Leppermann**
frühreifend (Anfang bis Mitte August). Frucht groß bis sehr groß, fast rund, leuchtend gelb bis orangerot, zart weiß bereift. Fleisch gelb, sehr saftreich, schmelzend, süß und wohlschmeckend, mit hellen Adern durchzogen. Sie besticht durch ihr prächtiges Aussehen. Selbstfruchtbar!

**Ersinger Frühzwetsche**
frühreifend (auch unter dem Namen Gerbers Frühzwetsche, Eisentaler Frühzwetsche und Goldquelle verbreitet), Reifezeit August-September. **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht groß, bräunlich-rötlich beduftet. Fleisch dunkelgelb, weich, recht saftig, süßsäuerlich gewürzt. Löst bei Vollreife gut vom Stein. Diese Sorte, deren Wert in letzter Zeit bekannt wurde, kann es, was Süße und Wohlgeschmack anbelangt, als eine der besten mit unseren meisten Pflaumen- ud Zwetschensorten aufnehmen. Selbstfruchtbar.

**Frühe Fruchtbare**
frühreifend (Anfang bis Mitte August). **Hauptsorte im Alten Land.** Diese aus England kommende Sorte hat sich besonders in Norddeutschland schnell verbreitet. Sehr beliebt im Handel und bei den Verbrauchern, da sie als erste frühe Frucht gut vom Stein löst. Als Mund- und Küchenfrucht zu gebrauchen. Frucht mittelgroß, rundlich, schwarzblau, leicht beduftet. Fleisch goldgelb, fein, saftreich und aromatisch. Die Krone wird durch die hohe Fruchtbarkeit nicht sehr groß, was den Vorteil hat, daß sie sich sehr gut als Füller eignet. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Graf Althans Reneklode**
spätreifend (Ende August bis Anfang September). Frucht groß, kugelrund, Haut rosarot, grünlich- bis bräunlichrot marmoriert mit größeren Rostfiguren und blau bereift. Fleisch goldgelb, fest, sehr saftig, sehr aromatisch und süß mit feiner Säure, steinlösend. Eine wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht, die reich trägt und nur mäßige Ansprüche an Klima und Boden stellt. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Große Grüne Reneklode**
frühreifend (Anfang bis Mitte September). **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht von fast runder Form, Längen- und Breitendurchmesser fast gleich. Haut dunkelgrün, sonnenseits dunkelrot punktiert und netzartig mit Rostfiguren überzogen. Fleisch grünlichgelb, fest, doch äußerst zart, sehr süß und köstlich gewürzt. Als Handels- und Marktfrucht ist sie wie keine andere für die Konservenbereitung, wie zum Einmachen und zum Dörren geeignet. Was Süße und Aroma anbelangt, ist sie von keiner anderen Sorte zu schlagen. Unter hiesigen Verhältnissen hat sie zuweilen unter der Pflaumensägewespe zu leiden. Selbstfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Hauszwetsche**
spätreifend (Ende September bis Mitte Oktober). Eine der bekanntesten und reichtragendsten Zwetschen überhaupt, die sich gleich gut zum Rohgenuß, zum Brennen, wie zur Marmeladenbereitung eignet. Daß dennoch öfter Klagen über diese Massensorte auftreten, liegt daran, daß sich im Laufe der Jahre viele gänzlich voneinander abweichende Spielarten gebildet haben. Der von uns vermehrte Typ vereinigt alle guten Eigenschaften. Sie gehört nur in frische, nahrhafte Böden mit genügend Feuchtigkeit. Frucht groß, länglich, oft verschoben eiförmig. Fleisch grünlich bis goldgelb, fest, sehr saftreich, süß, etwas säuerlich, meist gut vom Stein lösend. Selbstfruchtbar! Blüte spät.

**Italienische Zwetsche**
spätreifend (Mitte bis Ende September). Frucht mittelgroß bis groß, jedoch stets größer als die Hauszwetsche. Haut dunkel- bis schwarzblau. Fleisch fest, süßweinig, mit rötlichen Adern durchzogen, vorzügliche Back- und Speisefrucht. Diese saftige und wohlschmeckende Tafel- und Wirtschaftsfrucht ist gut steinlösend und gedeiht auch noch gut in kühleren Lagen. Teilweise selbstfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Königin Viktoria**
frühreifend (Ende August). Ist hervorragend gefärbt, enttäuscht jedoch durch den wässrigen Geschmack. Dennoch hat die Sorte für den Anbau in der Nähe der Städte Bedeutung. Sie trägt immer, und zwar so stark, daß die Äste brechen. Ist in jeder Weise anspruchslos, kommt auch in höheren Lagen gut fort. Gut zum Einmachen geeignet, da sie hierdurch an Geschmack gewinnt. Bei starkem Behang ist ein Ausdünnen der Früchte sehr anzuraten. Selbstfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Lützelsachser Frühzwetsche**
frühreifend (Juli bis Anfang August). **Hauptsorte im Alten Land.** Stammt aus Lützelsachsen bei Weinheim. Erlangt ihre Bedeutung durch frühe Reife und Güte der Frucht. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfer als die Hauszwetsche, saftig, angenehm säuerlich, gut vom Stein lösend. Sie reift etwa 3 Wochen vor der Bühler Frühzwetsche und 10 Tage vor der Zimmers Frühzwetsche. Trägt früh, regelmäßig und reich. Selbstunfruchtbar! Blüte sehr früh.

**Nancy Mirabelle**
**frühreifend (Mitte bis Ende August). Hauptsorte im Alten Land.** Sie liefert als vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht die beste und gesuchteste Mirabelle zum Einmachen, Trocknen und zum Rohgenuß und stellt eine Konservenfrucht ersten Ranges dar. Stellt geringe Ansprüche an Klima, Boden und Lage. Ist gut steinlösend. Trägt mittelfrüh, regelmäßig und reich. Blüte mittelfrüh.

**Ontariopflaume**
frühreifend (erste Hälfte August). Diese amerikanische Sorte liefert uns eine sehr wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Nicht sonderlich anspruchsvoll an Boden und Klima, trägt sie doch reich und regelmäßig. Frucht groß, sehr ansehnlich, besonders, wenn Ende Juni ausgedünnt wird; rundlich bis oval. Fleisch gelb, fest, mäßig gewürzt, vollreif gut vom Stein lösend. Selbstfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Oullins Reneklode**
frühreifend (Mitte August). Für etwas wärmere Lagen stellt sie als hochfeine Tafel- und Wirtschaftsfrucht für den Erwerbs- und Privatobstbau eine sehr wertvolle Sorte dar. Die Frucht ist groß, hochkugelig, Haut fest, goldgelb, vollreif oft rot gepunktet und leicht berostet. Fleisch goldgelb, zart, saftreich und in warmen Lagen sehr süß. Gut versandfähig. Selbstfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Ruth Gerstetter**
besonders frühreifend (Mitte Juli). Die Hauptbedeutung dieser mittelgroßen, rotbläulichen und eierförmigen Sorte liegt in ihrer Frühreife. Obwohl sie nicht als ausgesprochene Qualitätsfrucht bezeichnet werden kann, lassen sich mit ihr als Frühsorte auf dem Markt gute Preise erzielen. Der Baum verfügt nur über eine begrenzte Lebensfähigkeit.

**Schöne aus Löwen**
Reifezeit August. Frucht sehr groß, dunkelviolett, eiförmig, besonders saftreich und süß. Gute Wirtschaftsfrucht. Bringt reiche und regelmäßige Erträge. Selbstfruchtbar.

**The Czar**
frühreifend (Mitte August). **Hauptsorte im Alten Land.** Diese aus England stammende Tafel- und Wirtschaftsfrucht verlangt einen guten, nahrhaften und feuchten Boden. Wuchs mäßig stark aufstrebend. Trägt zuweilen so stark, daß das Triebwachstum zurückbleibt. Früchte sollen ausgepflückt werden, um einem Moniliabefall vorzubeugen. Die Frucht ist groß, rundoval, schwarzblau. Das Fleisch ist gelblich, saftreich, süß und würzig. Frucht ist sehr regen- und versandfest. Löst gut vom Stein. Selbstfruchtbar! Blüte spät.

**Unika, Neuheit 1950**
frühreifend (Mitte Juli bis Anfang August). Diese auffallend großfrüchtige, herzförmige Sorte zeichnet sich durch ihre aromatische, süße und besonders intensiv blutrot gefärbten Früchte aus. Eignet sich gut zur Konservenbereitung.

**Wangenheims Frühzwetsche**
frühreifend (Ende August bis Mitte September). Frucht mittelgroß bis groß, oval und unregelmäßig, Haut stark, leicht abziehbar, beinahe schwarzblau mit hellblauem Reif. Fleisch goldgelb, fest, sehr süß, saftig und süßweinig, löst meist gut vom Stein. Eine wertvolle, versandfeste Tafel- und Wirtschaftsfrucht für alle Zwecke. Stellt an Boden, Klima und Lage keine besonderen Ansprüche, noch gut für rauhe Lagen, winterhart und genügsam. Wuchs sehr stark, Krone breit. Ertrag beginnt zeitig und ist so reich, daß Ausdünnen des Behangs und scharfer Schnitt der Bäume zu empfehlen ist. Selbstfruchtbar! Blüte spät.

**Zimmers Frühzwetsche**
frühreifend (Anfang bis Mitte August). **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht groß, rundlich bis oval. Fleisch goldgelb, mit weißen Adern durchzogen, von sehr angenehmem, süßsäuerlichem, aromatischem Geschmack. Erlangt ihre Hauptbedeutung dadurch, daß sie etwa 10 Tage vor der Bühler reift und auch noch größer und edler im Geschmack ist. Sie liefert hier die erste Zwetsche mit gelbem Fleisch und mit vollendeter Süße. Dennoch verlangt sie wegen ihrer starken Fruchtbarkeit besonders günstige Wachstumsbedingungen. Ein rechtzeitiges Verjüngen und Auspflücken ist unerläßlich. Selbtsunfruchtbar! Blüte sehr früh, jedoch hart.

# Befruchtungsverhältnisse bei Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

Befruchtungsbiologisch müssen wir hier 3 Gruppen unterscheiden:

1. Selbstfruchtbare (selbstfertile) Sorten,
2. Schwach selbstfruchtbare Sorten,
3. Selbstunfruchtbare (selbststerile) Sorten.

Wie auch schon bei anderen Obstgattungen ausgeführt, können Sorten der ersten Gruppe in beliebiger Zahl sortenrein gepflanzt werden, da ihr eigener Pollen (Blütenstaub) eine ausreichende Befruchtung garantiert.

Bei der nächsten und übernächsten Gruppe, wo es sich um schwach selbstfruchtbare und selbstunfruchtbare Sorten handelt, ist es notwendig, daß man beide Gruppen wie selbstunfruchtbare behandelt, da ihr eigener Pollen (Blütenstaub) nur teilweise oder überhaupt nicht zur Befruchtung ausreicht.

**1. Gruppe: Selbstfruchtbare Sorten:**

**Borsumer Zwetsche,**
**Bühler Frühzwetsche,**
**Emma Leppermann,**
**Hauszwetsche,**
**Italienische Zwetsche,**
**Königin Viktoria,**
**Mirabelle von Nancy,**
**Ontariopflaume,**
**Oullins Reneklode,**
**Schöne aus Löwen,**
**The Czar,**
**Wangenheims Frühzwetsche.**

**2. Gruppe: Schwach selbstfruchtbare Sorten:**

**Ersinger Frühzwetsche**
**Kohlstockzwetsche** (= verbesserte Italienische Zwetsche)

**3. Gruppe: Selbstunfruchtbare Sorten:**

**Große Grüne Reneklode,**
**Frühe Fruchtbare,**
**Kirkes Pflaume,**
**Lützelsachser Frühzwetsche,**
**Ruth Gerstetter,**
**Zimmers Frühzwetsche.**

**Für folgende Sorten sind nachfolgende Pollenspender geeignet:**

| | |
|---|---|
| **Frühe Fruchtbare** . . . . | Ersinger Frühzwetsche, Lützelsachser, Ruth Gerstetter, Königin Viktoria, Zimmers Frühzwetsche. |
| **Graf Althans Reneklode** . . | Bühler Frühzwetsche, Lützelsachser, Oullins, Königin Viktoria. |
| **Große Grüne Reneklode** . . | Bühler Frühzwetsche, Graf Althans, Hauszwetsche, Italienische Zwetsche, Königin Viktoria, Oullins Reneklode. |
| **Kohlstockzwetsche** . . . | Königin Viktoria. |
| **Lützelsachser Frühzwetsche** | Bühler Frühzwetsche, The Czar, Ersinger Frühzwetsche, Ontariopflaume, Ruth Gerstetter, Zimmers Frühzwetsche. |
| **Zimmers Frühzwetsche** . . | Hauszwetsche, Königin Viktoria, Oullins Reneklode, Ruth Gerstetter, Wangenheims Frühzwetsche. |

# Vorräte an Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden:

| Sorte | Hochstamm | | | Halbstamm | | | Buschbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von unten gezogen | auf Stammbildner | 3 × v. | von unten gezogen | auf Stammbildner | 3 × v. | |
| Bühler Frühzwetsche | | × | | | × | | × |
| Diamantpflaume | × | | | × | | × | |
| Emma Leppermann | × | | | × | | × | |
| Ersinger Frühzwetsche | | × | × | × | | | × |
| Frühe Fruchtbare | | × | | | × | | |
| Graf Althans Reneklode | × | | × | × | | | |
| Große Grüne Reneklode | | × | × | | × | | |
| Hauszwetsche | × | | × | × | × | | × |
| Italienische Zwetsche | | × | × | | × | | |
| Kirkespflaume | | × | | | × | | × |
| Königin Viktoria | | × | | | | | |
| Lützelsachser Frühzwetsche | | × | | | × | | × |
| Nancy Mirabelle | | × | × | | × | × | |
| Ontariopflaume | | × | | | | | × |
| Oullins Reneklode | × | | | × | | | |
| Ruth Gerstetter | | × | × | | × | | |
| Saure Altenländer Frühzwetsche | × | | | × | | | |
| Schöne aus Löwen | × | | | × | | | |
| The Czar | × | × | | × | × | | × |
| Unikapflaume | | × | | | × | | |
| Wangenheims Frühzwetsche | × | | × | × | | | |
| Zimmers Frühzwetsche | | × | × | | × | | |

# D. Kirschen

## a) Süßkirschen:

**Braunauer**

(Schwarze Herzkirsche), 2.—3. Kirschenwoche, Frucht groß, rundlich. Sie hat einen recht guten, edlen Geschmack und gehört mit zu den wertvollsten Sorten, die wegen ihrer Größe und guten Färbung im Handel stark gefragt ist. Stark vertreten im Bodenseegebiet und im Kreise Querfurt. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Büttners Späte Rote Knorpelkirsche**

(Königskirsche), 5. Kirschenwoche, Frucht groß bis sehr groß, hellgelb mit leuchtend roter Deckfarbe. Sehr stark im Kreise Querfurt verbreitet. Sie nimmt unter den hellfarbigen Knorpelkirschen die erste Stelle ein und ist eine der wertvollsten Spätkirschen für den Erwerbsobstbau. Frucht ist fest und bleibt auch im hochreifen Zustand gut versandfähig. Eignet sich auf Grund ihres kräftigen Wuchses sehr zur Straßenbepflanzung. Der Baum erreicht ein hohes Alter. Selbstunfruchtbar! Blüte früh, aber frostwiderstandsfähig.

**Dönissens Gelbe Knorpelkirsche**
5. Kirschenwoche. Sie ist für den Privatobstbau unter den gelben Knorpelkirschen ohne Zweifel die wertvollste. Frucht mittelgroß, schwefelgelb. Güte der Frucht ist sehr von der Witterung abhängig. Stellt eine eigenartige Tafelzierde dar. Eignet sich besonders gut zum Konservieren. Wird wegen ihrer gelben Farbe nicht von Vögeln gefressen. Bevorzugt leichtere Böden. Selbstunfruchtbar! Blüte spät.

**Fromms Herzkirsche**
3. Kirschenwoche, Frucht groß, dunkel wie ihr Saft, weich und sehr saftreich. Zählt zu den größten schwarzen Herzkirschen und zu den dankbarsten Trägern. Frucht ist leider empfindlich beim Versand. Selbstunfruchtbar! Blüte spät.

**Früheste der Mark**
vor der 1. Kirschenwoche. Ihr Hauptwert liegt in ihrer unübertroffenen Frühreife, was jedoch voraussetzt, daß sie auch in ausreichend warmen und günstigen Lagen steht. Frucht mittelgroß, fest, schwarzrot. Bildet eine hochstrebende Krone, trägt früh und regelmäßig. Selbstunfruchtbar! Blüte früh.

**Große Prinzessinkirsche**
(Lauermanns, Napoleonskirsche), 4. Kirschenwoche, Frucht sehr groß, herzförmig, hellfarbig, mit schöner, roter Zeichnung. Fleisch fest. Diese sehr schöne Knorpelkirsche zählt zu den feinsten Tafelkirschen, ist jedoch mehr für den Privatobstbau geeignet, weil der Baum anspruchsvoll und etwas empfindlich ist. Die Krone ist sehr groß. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Große Schwarze Knorpelkirsche**
5. Kirschenwoche, Frucht mittelgroß bis groß, herzförmig nach unten abgerundet, dunkelbraunrot bis schwarz. Fleisch fest und wohlschmeckend. Diese späte Knorpelkirsche zählt wegen ihrer guten Eignung als Tafel- und Einmachfrucht und ihres außerordentlich hohen Glanzes mit zu den wertvollsten Sorten. Ist im Kreise Querfurt sehr viel als starkwachsender Straßenbaum vertreten. Wird leider in schweren Böden leicht etwas bitter. Selbstunfruchtbar! Blüte früh.

**Hauschilds Frühe Schwarze**
4. Kirschenwoche, **Hauptsorte im Alten Land.** Die späteste der sogenannten „Frühen Schwarzen". Sehr gesund und reichtragend. Die Frucht ist ziemlich klein, fest, regenfest, auffallend blank, tief schwarz und vorzüglich im Geschmack. Große lockere Krone. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Hedelfinger Riesenkirsche**
4.—5. Kirschenwoche, Frucht groß, von länglich-ovaler Form, Haut zäh, dunkelbraunrot bis schwarz. Fleisch fest, knorpelkirschenartig, sehr würzig und wohlschmeckend. Frucht ist unbeschränkt versandfähig, jedoch nicht ganz regenfest. Stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und leidet wenig unter Gummifluß. Ertrag setzt nicht früh ein, ist dann jedoch regelmäßig. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Kassins Frühe**
1.—2. Kirschenwoche. Eine der schmackhaftesten, glänzend dunkelbraunen Herzkirschen. Sie verträgt den Versand, platzt auch nach starkem Regen wenig. Ihre Widerstandsfähigkeit und Gesundheit ist überdurchschnittlich. Die Tragbarkeit beginnt früh und bleibt regelmäßig und reich. Stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Selbstunfruchtbar! Blüte früh.

**Kleine Blanke**
6. Kirschenwoche, **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht klein bis mittelgroß, bei Vollreife dunkelrot bis schwarz. Außerordentlich widerstandsfähig gegen Gummifluß. Selbstunfruchtbar! Blüte früh.

**Primavera, Neuheit 1953 vom Max-Plank-Institut!**
**extrem frühreifend.** Sie liegt in der Reife noch mehrere Tage vor der Frühesten der Mark. Diese relativ große, stumpfe bis kugelförmige Frucht ist breiter als hoch, sitzt besonders fest am Stiel, ist festfleischig, mit dünner, glänzender Fruchthaut, die sich zur Vollreife schwarzrot färbt. **Eine gut vom Stein lösende, sehr wertvolle Sorte, die mehrere Früchte in einem Blütenstand bringt, wodurch die Ernte erleichtert wird.**

**Schneiders Späte Knorpelkirsche**
5. Kirschenwoche, Frucht groß, herzförmig, dunkelbraunrot, saftig und außerordentlich feinschmeckend. Diese Sorte vereinigt so viele Vorzüge, daß man ihr die größte Verbreitung wünschen möchte. Bedingt durch ihre feste Haut, verträgt sie jeden Versand. Tafel- und Einmachfrucht. Selbstunfruchtbar! Blüte spät.

**Schubacks Frühe Schwarze**
3. Kirschenwoche, **Hauptsorte im Alten Land.** Fleisch dunkelrot, sehr weich, Saft dunkelrot, Geschmack sehr süß. Baum breit ausladend, später hängend. Blüte spät. Wichtige frühe, großfrüchtige, dunkle Herzkirsche. Selbstunfruchtbar!

**Teickners Schwarze Herzkirsche**
3. Kirschenwoche, Frucht groß, saftig, schwarz-glänzend. Der Baum ist starkwüchsig und widerstandsfähig. Selbstunfruchtbar! Blüte mittelfrüh.

**Zum Feldes Frühe Schwarze**
2.—3. Kirschenwoche, Frucht mittelgroß, tiefschwarz und besonders regenfest. Selbstunfruchtbar! Blüte sehr früh.

## b) Sauerkirschen:

**Diemitzer Amarelle**

2.—3. Kirschenwoche, Frucht mittelgroß, rundlich, Haut leuchtend gelbrot, durchsichtig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Ihr Hauptwert anderen Amarellen gegenüber ist, daß sie sich durch vermehrte Süße und reiche Tragbarkeit auszeichnet. Bedarf eines guten Bodens und soll stark im Schnitt gehalten werden. **Selbstfruchtbar!** Blüte spät.

**Frühe Ludwigskirsche**

3. Kirschenwoche, Frucht von mittlerer Größe, rundlich, leuchtend rot. Sie ist im mittelrheinischen Gebiet die am meisten begehrte leuchtend rote Handelsfrucht unter den frühen Sauerkirschen, da hellrote Sorten zur Zeit als Belag- und Konservenfrucht bevorzugt werden. Haut fast durchsichtig, Fleisch sehr saftig mit deutlich hervortretender, angenehmer Säure; gut vom Stein lösend. Ihr Vorzug ist, daß sie moniliawiderstandsfähiger als die Schattenmorelle ist. **Selbstfruchtbar!** Blüte früh.

**Königin Hortense**

3.—4. Kirschenwoche, Frucht sehr groß, länglich, hellrot. Fleisch äußerst zart und saftreich. Zeichnet sich durch ihren köstlichen Geschmack und durch ihre durchsichtige, leuchtend rote Farbe aus. Hat leider den Fehler, daß sie sich wegen ihrer dünnen Haut nicht lange lagern läßt und zuweilen im Ertrag nicht befriedigt. Kann sonst als die edelste und schönste unter den Sauerkirschen bezeichnet werden. **Selbstunfruchtbar!**

**Koröser Weichsel**

4. Kirschenwoche, Frucht groß bis sehr groß, dunkelbraunrot, Geschmack süßsäuerlich, Frucht kann ohne Stiel gepflückt werden. Früh- und reichtragend. Der Stein ist klein und gut lösend. **Selbstunfruchtbar!**

**Ostheimer Weichsel**

4. Kirschenwoche. Die mittelgroße Frucht eignet sich sowohl zur Saftherstellung wie auch zum Einmachen. Läßt sich nicht gut versenden und reift nicht gleichmäßig. Mit ihren dünnen und birkenähnlich hängenden Zweigen verträgt sie sehr gut den Rückschnitt.

**Rote Maikirsche**

3. Kirschenwoche, **Hauptsorte im Alten Land.** Frucht mittelgroß bis groß, glänzend, Fleisch saftig und sehr wohlschmeckend. Löst gut vom Stein. Sie kann sich fast mit der Königin Hortense um den Rang der feinsten Tafelkirsche streiten. Muß hier gut im Schnitt gehalten werden, da sie sich wegen ihrer zu hohen Fruchtbarkeit zu schnell erschöpft. **Schwach selbstfruchtbar!** Blüte früh.

**Schattenmorelle**

(Große Lange Lotkirsche), 5.—6. Kirschenwoche. Sie stellt für den Erwerbsobstgärtner die lohnendste Frucht zum Massenanbau und für die Hausfrau die wertvollste zum Einmachen dar. Die Frucht ist zwar weich, aber die Haut doch fest genug, um längeren Versand zu überstehen. Sie trägt so reichlich, daß man stark schneiden muß, um einen genügend starken Holznachwuchs zu bekommen. Die falschen Typen wachsen mehr aufrecht und lassen sich an ihrem langen, dünnen Holz und spitzen Blütenknospen von der echten Art unterscheiden, bei welcher die Knospen rundlich sind. Der schlechte **spitzknospige** Typ ist **selbstunfruchtbar.** Ihr einziger Fehler ist die Moniliaanfälligkeit, die sich nur durch dauernden Rückschnitt bekämpfen läßt. Für leichte Böden ist die beste Unterlage die Vogelkirsche, während man für schwere Böden mehr Prunus mahaleb nehmen sollte. **Selbstfruchtbar!** Blüte spät.

# Die Befruchtungsverhältnisse der Kirschen

## a) Süßkirschen:

Nach bisher festliegenden Untersuchungen sind alle Süßkirschen selbstunfruchtbar (selbststeril). Wie bei keiner anderen Obstgattung finden sich bei ihnen sehr viele Unverträglichkeitsgruppen (Intersterilitätsgruppen), die in den meisten Fällen wechselseitig sind. Diese Umstände sind bei Pflanzungen besonders zu berücksichtigen, wenn die Anlage zum vollen Erfolg führen soll.

**Für folgende Sorten sind nach Rudloff-Schanderl nachfolgende Pollenspender geeignet:**

| | |
|---|---|
| **Altenländer Hedelfinger** . . . . . | Zum Feldes Frühe Schwarze, Jorker Späte. |
| **Braunauer** . . . . . | Büttners Späte Rote Knorpelkirsche, Fromms Herzkirsche, Früheste der Mark, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpel, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche. |
| **Büttners Späte Rote Knorpelkirsche** | Dönissens Gelbe, Fromms Herzkirsche, Früheste der Mark, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche. |
| **Dönissens Gelbe Knorpelkirsche** . | Büttners Späte Rote Knorpelkirsche, Fromms Herzkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe, Große Prinzessinkirsche, Schneiders Späte Knorpelkirsche. |
| **Fromms Herzkirsche** . . . . . | Braunauer, Büttners Späte Rote Knorpelkirsche, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche. |

**Früheste der Mark** . . . . . Braunauer, Büttners Späte Knorpelkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche.

**Große Prinzessinkirsche** . . . . . Braunauer, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Fromms Herzkirsche, Früheste der Mark, Hedelfinger Riesenkirsche, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirche.

**Große Schwarze Knorpelkirsche** . Braunauer, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Fromms Herzkirsche, Früheste der Mark, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche.

**Hauschilds Frühe Schwarze** . . . Jorker Späte, v. Bremens Saure, Kleine Blanke.

**Hedelfinger Riesen** . . . . . Braunauer, Büttners Rote Knorpelkirsche, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Fromms Herzkirsche, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche.

**Kassins Frühe** . . . . . Braunauer, Büttners Rote Knorpelkirsche, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Fromms Herzkirsche, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche, Schneiders Späte Knorpelkirsche.

**Kleine Blanke** . . . . . Zum Feldes Frühe Schwarze, Jorker Spitze, Hauschilds Frühe Schwarze, Minners Bunte.

**Schneiders Späte Knorpelkirsche** . Braunauer, Büttners Rote Knorpelkirsche, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Fromms Schwarze Herzkirsche, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesen, Kassins Frühe.

**Schubacks Frühe Schwarze** . . . Jorker Späte, Minners Bunte, Rube, v. Bremens Saure.

**b) Sauerkirschen:** Bei den Sauerkirschen kommen neben selbstfruchtbaren (selbstfertilen) und selbstunfruchtbaren (selbststerilen) Sorten auch solche mit sämtlichen Graden von Übergängen zwischen diesen beiden vor. Zu beachten ist, daß gewisse Sorten in mehreren Typen verbreitet sind, die sich befruchtungsbiologisch verschieden verhalten.

### Für folgende Sorten sind nachfolgende Pollenspender geeignet:

**Königin Hortense** . . . . . Königliche Amarelle, Ostheimer Weichsel.

**Rote Maikirsche** . . . . . Kassins Frühe, Schattenmorelle, Schneiders Späte Knorpelkirsche.

# Folgende Kirschensorten sind vorrätig:

| Sorte | Hochstamm | Halbstamm | Büsche | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| Büttners Rote Knorpelkirsche | × | × | | |
| Diemitzer Amarelle | × | × | × | |
| Dönissens Gelbe Knorpelkirsche | × | × | | |
| Fromms Herzkirsche | × | × | | |
| Frühe Ludwigskirsche | × | × | × | |
| Große Prinzessinkirsche | × | × | | |
| Große Schwarze Knorpelkirsche | × | × | | |
| Hauschilds Frühe Schwarze | × | × | | |
| Hedelfinger Riesenkirsche | × | × | | |
| Kassins Frühe | × | × | | |
| Kleine Blanke | × | × | | |
| Königin Hortense | × | | × | |
| Koröser Weichsel | × | × | × | |
| Ostheimer Weichsel | × | | | |
| Primavera | × | × | | |
| Rote Maikirsche | × | × | × | |
| Schattenmorelle | × | × | × | × |
| Schneiders Späte Knorpelkirsche | × | × | | |
| Schubacks Frühe Schwarze | × | × | | |
| Teickners Schwarze Herzkirsche | × | × | | |
| Zum Feldes Frühe Schwarze | × | × | | |

# E. Aprikosen

**Große Frühaprikose**
Reifezeit Anfang bis Mitte Juli. Starkwachsend. Hohe Erträge. Frucht groß bis sehr groß, steinlösend und von schöner roter Färbung. Frucht hält sich lange am Baum. Beansprucht einen warmen und sonnigen Standort.

**Nancy-Aprikose**
Reifezeit Anfang bis Mitte August. Die Frucht ist vorzüglich zum Rohgenuß; ganz besonders geeignete Markt- und Handelsfrucht, wie kaum eine andere für Konservenzwecke verwendbar. Hält sich ziemlich lange am Baum. Blüte früh und nicht empfindlich gegen Nachtfröste.

**Triumph aus Trier**
Reifezeit Mitte August. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, gelb und rot punktiert. Fleisch ist fest, saftig und von edlem Aroma. Wuchs mittelstark, Erträge sehr hoch.

**Ungarische Beste**
(Klosterneuburger Aprikose), Anfang bis Mitte August. Frucht groß bis sehr groß, rundlich. Fleisch sehr saftreich, hochgelb mit roten, orangefarbenen, dunkleren Adern durchzogen, schwach süß und wenig gewürzt, löst sehr gut vom Stein. Als Einmach- und Marmeladenfrucht hoch geschätzt und sehr gesucht, daneben gut transportfähig. Leidet selten unter Gummifluß.

## Die Befruchtungsverhältnisse der Aprikosen:

Alle Aprikosen sind selbstfruchtbar, können also sortenrein in beliebiger Menge gepflanzt werden.

# F. Pfirsiche

**Amsden**
Reifezeit Mitte Juli, Frucht mittelgroß bis groß, flach, rund, blutrot überzogen, oft auch verwaschen und marmoriert. Fleisch sehr saftreich und edel, jedoch nicht sehr gewürzt. Leidet wenig unter der Kräuselkrankheit und bleibt lange lebensfähig. Er gilt als einer der besten unter den Frühpfirsichen. Blüte früh, jedoch nicht frostempfindlich.

**Eiserner Kanzler**
Reifezeit Ende August bis Anfang September. Frucht mittelgroß bis groß, hellgrüngelb, zum größten Teil rot überzogen. Fleisch gelblichweiß, gut lösend. Der Baum wächst kräftig, ist sehr fruchtbar und zeichnet sich durch seine Winterhärte aus.

**Madame Rogniat**
Reifezeit Mitte August. Frucht sehr groß und von rundlicher Form, Grundfarbe gelblichgrün, in leuchtendrot übergehend. Fleisch ist gelblichweiß, ohne Röte am Stein, ist äußerst wohlschmeckend und löst gut vom Stein. Trägt früh und reich. Es ist sehr günstig, daß ihre Reifezeit zwischen den früh- und spätreifenden Sorten liegt.

**Mayflower**
Reifezeit Mitte Juli. Eine der besten und frühesten Sorten. Gesundes und mäßiges Wachstum. Verlangt guten Boden und sorgfältige Pflege. Bei starkem Behang muß ausgedünnt werden. Sehr widerstandsfähig gegen die Kräuselkrankheit. Fleisch ist gelblichweiß und sehr wohlschmeckend.

**Proskauer Pfirsich**
Reifezeit Ende August bis Anfang September. Wurde in Proskau aus dem Stein einer amerikanischen Frucht gezogen. Sein Hauptwert liegt in der späten Reife und in seiner allgemeinen Resistenz, so daß er noch in Gegenden gedeiht, wo andere Sorten versagen. Wenn auch der Geschmack gegenüber anderen Sorten etwas zurückbleibt, so ist er doch gut und kräftig, was besonders bei eingemachten Früchten hervortritt.

## Befruchtungsverhältnisse:

Alle Pfirsiche sind wie die Aprikosen **selbstfruchtbar.**

# G. Quitten

**Apfelquitte**
Reife September bis Oktober. Frucht mittelgroß, rundlich und gerippt, zitronengelb, geschätzte Einmachefrucht. Baum wächst mittelstark, gedrungen und breit, kleinblättrig, sehr reichtragend und vollständig winterhart.

**Badener Quitte**
Frucht apfelförmig. Früchte haben ein Durchschnittsgewicht von 150 bis 200 g.

**Bereczki-Quitte**
Reife September-Oktober. Wuchs kräftig aufrecht, starkwüchsig. Frucht sehr groß, gehört mit zu den größten Sorten, stumpf, breit birnförmig mit einem Durchschnittsgewicht von 300 bis 350 g. Fleisch mild und verhältnismäßig süß, zarter als bei den anderen Sorten.

**Champion**
Reife Oktober-November. Wuchs mittelstark, ziemlich aufrecht; sehr früh- und reichtragend. Frucht mittelgroß bis groß, stumpf, birnförmig, regelmäßig gebaut. Hält sich gut auf dem Lager.

**De Bourgeaut** (= Borgeat)
eine alte französische Sorte. Baum groß, starkwüchsig, kräftig und aufrechtwachsend, gesund. Fleisch gelblich, saftig, mild säuerlich. Qualität gut; Durchschnittsgewicht 200—300 g. Sie reift am frühesten von allen Sorten und hat sich auch für Großkultur bewährt.

**Konstantinopeler**
eine alte Sorte, die eine sehr große Verbreitung erlangt hat. Wuchs kräftig aufrecht, trägt früh und reich. Frucht groß, meist breit birnförmig, hoch, gelb, graufilzig.

**Portugiesische Birnquitte**
Frucht groß bis sehr groß, länglich birnförmig. Fleisch saftiger und weniger herb als bei anderen Sorten, läßt sich sehr gut kochen und wird dann dunkelrot. Wuchs stark und kräftig. Läßt zuweilen im Ertrag zu wünschen übrig.

**Riesenquitte von Lescovac**
Reife Anfang bis Mitte Oktober. Wuchs kräftig, in die Breite gehend. Frucht apfelförmig, groß bis sehr groß, Durchschnittsgewicht 500 g, doch sind Früchte bis 1000 g keine Seltenheit. Fleisch weiß, sehr würzig, beim Kochen reinweiß bleibend, während sich alle anderen Sorten röten. Besonders wertvolle Konserve.

**Riesenquitte von Vranje**
Wuchs kräftig und gesund, Frucht sehr groß und häufig bis 1000 g. Gestalt birnförmig. Fleisch sehr zart und feinkörnig, hält sich besonders lange auf dem Lager, da wenig empfindlich gegen Stoß und Fäulnis.

## Befruchtungsverhältnisse:

Alle hier aufgeführten Quittensorten sind selbstfruchtbar.

# H. Mispelsorten

**Großfrüchtige**
Frucht sehr groß, kreiselförmig, 4 bis 5 cm breit, zuletzt braun gefärbt.

**Holländische Riesen**
Frucht sehr groß, Baum mittelstark wachsend und sehr reichtragend.

# II. BEERENOBST

## A. Johannisbeeren

### 1. Rotfrüchtige:

**Erstling aus Vierlanden**
(Vierländer Rote). Diese gleichzeitig mit „Heros" reifende Sorte gehört zu unseren besten Massensorten für den Erwerbsobstbau. Besonders erwähnenswert ist, daß sie unempfindlich gegen die Blattfallkrankheit ist. Sie wächst kräftig mit aufrechtstehenden Trieben. Liefert höhere Erträge als die „Rote Holländer".

**Heros**
Sie ist eine der am frühesten reifenden Sorten. Wächst in den ersten Jahren sehr gut, läßt dann aber infolge starker Fruchtbarkeit sehr nach, so daß ältere Büsche leicht auseinanderfallen. Deswegen benötigt sie nicht nur den besten Boden, sondern muß auch regelmäßig gut geschnitten werden. An den einzelnen Fruchttrauben sitzen bis zu 30 Einzelbeeren, die besonders an jungen Sträuchern groß, dunkelrot und süß sind.

**Rote Holländische**
Sie reift 10 Tage später als „Heros". Wuchs mehr breit als hoch. Ziemlich unempfindlich gegen die Blattfallkrankheit. Infolge regelmäßiger und guter Fruchtbarkeit ist sie die beliebteste Spätsorte für den Erwerbsanbau. Sie ist die anspruchsloseste und widerstandsfähigste Sorte. Vollreife Beeren können noch 10 bis 14 Tage hängen, ohne abzufallen.

### 2. Schwarzfrüchtige:

**Boskoop Riesen**
(Boskoop Giant). Sie hat einen etwas gedrehten Wuchs, wächst aber nur mittelstark. Die Trauben werden 9—10 cm lang, die Beeren sind mit einem langen Stiel versehen, wodurch das Pflücken sehr erleichtert wird. Meist hängen an einem Stiel 15—17 Beeren von angenehm süßem Geschmack.

**Goliath**
stammt aus Holland, wächst in der Jugend sehr stark, läßt jedoch im Alter nach. Die Beeren sind sehr groß, sitzen zu 3 bis 5 an kurzgestielten Trauben. Eignet sich besonders für leichte Böden. Ist wenig empfindlich gegen Krankheiten und Frost. Früchte besonders süß.

**Rosenthals Langtraubige**
Wuchs breit, üppig bis 1,80 m hoch. Trauben sind langgestielt, daher leicht zu pflücken und mit 10 bis 18 großen, saftreichen Einzelbeeren besetzt. Eignen sich gut zur Herstellung von Gelee, Saft und Wein. Empfiehlt sich besonders für leichte Böden. Widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Frost.

**Silvergieters Schwarze**
Unter den schwarzen Sorten kann man diese neue Sorte besonders empfehlen, da sie sehr reich trägt, gleichmäßig reift und im Geschmack nicht so herb ist. Besonders für leichte Böden geeignet. Wenig empfindlich gegen Krankheiten und Frost. Einzelbeeren verhältnismäßig groß.

### 3. Weißfrüchtige:

**Weiße aus Jüterbog**
Sie ähnelt im Wuchs sehr der Roten Holländer. Die Beeren sind recht groß, gelblichweiß und hängen an sehr langen Trauben. Bringt sehr gute Erträge und reift mittelfrüh.

## B. Stachelbeeren

### 1. Rotfrüchtige:

**Maiherzog**
(May Duke), Frucht mittelgroß, breit eiförmig, glatt. Sie hat sich überall als Massenträger erwiesen. Wuchs sehr stark, langtriebig, leicht überhängend. Farbe in der Vollreife dunkelpurpurviolett. Besitzt hohen Marktwert.

**Rote Orleans**
Frucht mittelgroß bis groß, Form langoval. Haut glatt, dunkelpurpurviolett, außerordentlich süß mit feiner Säure.

**Rote Triumphbeere**
(Whinhams Industry), Frucht groß bis sehr groß, elliptisch, drüsenborstig von dunkelbraunroter Farbe. Wuchs kräftig, gesund, leicht überhängend. Ertrag sehr hoch. **Reife mittelfrüh.** Für Frischgenuß und Kelterei. Eignet sich besonders zum Grünverkauf, weil sie sich nach der Blüte sehr schnell entwickelt. Reife Früchte halten sich lange am Strauch. Bevorzugt humose Böden.

## 2. Grün- und Weißfrüchtige:

**Grüne Hansa**
Die Frucht ist groß, rundlich bis elliptisch geformt, hellgrün mit weißen Adern, sehr zart und durchsichtig, süß, aromatisch und dünnschalig.

**Grüne Kugel**
Die große grüne Frucht ist fast kugelrund, ziemlich kurz gestielt, fein flaumig behaart. **Reife mittelfrüh.** Im Geschmack sehr süß und von besonders schönem Aroma, dünnschalig.

**Lady Delamere**
Frucht groß bis sehr groß, elliptisch, durchsichtig marmoriert, fein geadert, saftig und süß. Sie gehört zu den besten grünen Massenträgern für die Verwertungsindustrie, wie zum Grünpflücken. Leidet zuweilen unter Sonnenbrand. Starkwüchsig und sehr fruchtbar.

**Lovetts Triumph**
Eine mittelspät reifende mittelgroße bis sehr große länglich geformte Sorte mit aufrechtem Wuchs und guter Tragbarkeit. Die süßen Beeren sind glattschalig.

**Weiße Triumphbeere**
(White Smith). Die Frucht ist groß, elliptisch, gelblichweiß und zeigt vereinzelte rote Punkte. Wuchs sehr stark, aufrecht, allgemein widerstandsfähig. Ertrag sehr hoch. Als Massensorte für Konservenindustrie und zum Frischgenuß.

**Weiße Volltragende**
Eine ältere englische Sorte mit kräftigem Wuchs. Die Beeren sind dünnschalig, weißgrau und elliptisch. Ertrag hoch. Eine sehr geschätzte Massensorte für alle Zwecke, die mindestens den gleichen Wert wie Weiße Triumphbeere hat.

## 3. Gelbfrüchtige:

**Gelbe Triumphbeere**
(Triumphant). Frucht groß, dünnschalig, glatt, dunkelgelb, Reifezeit mittelfrüh. Wuchs kräftig, aufrecht, mit leicht überhängenden Zweigen. Mund- und Industriefrucht. Sehr reichtragend.

**Hönings Früheste**
Frucht mittelgroß, rund, dünnschalig, vollbehaart, Farbe goldgelb. Früheste Sorte. Sehr fruchtbar, mittelstarker, aufrechter Wuchs. Für Frischgenuß und zum Einmachen.

**Lauffener Gelbe**
Frucht langoval, groß bis sehr groß, glatt, tief ockergelb, kaum durchsichtig, ganz außerordentlich süß und fein säuerliches Aroma. Trägt sehr reich und hat einen kräftigen, gedrungenen bis aufrechten Wuchs.

# C. Brombeeren

## 1. Rankende Sorten:

**Boysenbeere**
Sie ist aus einer Kreuzung von Him- und Brombeere entstanden. Die schwarzroten Früchte sind dreimal so groß und von angenehmem weinsäuerlichem Geschmack.

**laciniata**
Sie ist im Wuchs ähnlich Theodor Reimers, reift jedoch etwa 8 Tage später und hat den Vorteil der besseren Winterhärte. Die Belaubung ist geschlitzt.

**Theodor Reimers**
Sie ist für alle Böden geeignet. Frucht groß, rund, schwarz, saftreich, versandfest und sehr aromatisch. Platzbedarf 3×3 m. Gegen Krankheiten und Schädlinge wenig empfindlich, doch empfindlich gegen Frost. Ertragreichste Sorte, die noch auf Sandböden gut gedeiht. Sie stellt eine selektierte Brombeere dar. Sehr für Hecken und Zäune zu empfehlen. Ohne Schnitt verwildert sie leicht.

## 2. Aufrechtwachsende Sorten:

**Wilsons Frühe**
Sie ist von den aufrechtwachsenden Sorten durch Frühreife, gute Ertragsleistungen und Frostwiderstandsfähigkeit die wertvollste. Besitzt einen hohen Handelswert, da sie sehr früh reift und wenig empfindlich gegen Krankheiten ist. Die Früchte sind ziemlich groß, länglich-oval, tiefschwarz, festfleischig, süß und wohlschmeckend.

# D. Himbeeren

**Deutschland**
Diese aus der Sorte Preußen hervorgegangene Sorte unterscheidet sich von ihrer Muttersorte in folgenden Punkten: verträgt besser Trockenheit, hat ein sehr gutes Aroma und reift etwa 10 Tage später als Preußen. **Durch Verwendung dieser beiden Sorten läßt sich die Ernte erheblich verlängern.**

**Nordmark**
Sie reift 3 Wochen vor der alten englischen Sorte Lloyd George. Diese zweimaltragende Himbeere bringt in der zweiten Ernte noch sehr viele Früchte. Sie wird nur 1,20 bis 1,50 m hoch und benötigt keine hohen Gerüste.

**Preußen**
Sie ist gegenwärtig die am meisten verbreitete Sorte für den Erwerbsanbau. Sehr starkwüchsig, Ruten bis 2 m. Fruchtbarkeit sehr groß, gute Süße und Aroma. Da sie zuweilen unter der Rutenkrankheit leidet, ist es unbedingt notwendig, daß man sie, wenn die Jungruten tischhoch sind, zweimal im Abstand von 14 Tagen mit 1% Kupferkalk spritzt. Eine wertvolle Mund- und Verwertungsfrucht.

# E. Weinreben

**Black Hamburgh**
(Blauer Trollinger), **Treibhaussorte.** Reife: spät, Ende September. Traube sehr groß, pyramidal, meist locker, oft 1—2 kg schwer. Beeren sehr groß, rund bis breitoval, **dunkelblau,** stark bereift. Sehr süß und angenehm im Geschmack.

**Blauer Alicante**
**Treibhaussorte.** Reife: spät. Traube groß bis sehr groß. Beeren locker stehend, groß, breitoval, **schwarzblau,** stark bereift. Wertvolle späte Treibsorte.

**Blauer Portugieser**
**Freilandsorte.** Reife: früh. Trauben mittelgroß bis groß. Beeren mittelgroß, rund, **schwarzblau,** bereift, mit hellen Rostpunkten. Sehr süß und wohlschmeckend. Wuchs sehr stark. Eine schöne frühe Tafeltraube.

**Buckland Sweetwater**
**Treibhaussorte.** Reife: spät. Traube groß, pyramidal, locker, Beeren groß, rundlich, gelblichgrün. Fleisch süß, von angenehmer Würze. Ausgezeichnete, zum Treiben sehr geschätzte Sorte.

**Früher Blauer Burgunder**
**Freilandsorte.** Reife: sehr früh. Traube klein, walzenförmig, dichtbeerig. Beere rund, **schwarzblau,** bereift. Wird als früheste blaue Traube auf dem Markt gern gekauft. Sorte ist wenig anspruchsvoll an Boden und Lage.

**Früher Malingre**
**Freilandsorte.** Reife: sehr früh. Traube mittelgroß, locker, kurz. Beeren klein, oval, **gelblichgrün** bis **goldfarbig.** Fleisch saftig und süß. Der Stock wächst kräftig und ist sehr fruchtbar. **Auch für kältere Gegenden zur Kultur im Freien geeignet.**

**Gelbe Seidentraube**
(Gelber Frühleipziger), **Freilandsorte.** Reife: sehr früh. Traube mittelgroß, locker, Beeren oval, hellgelb, leicht bereift. Fleisch etwas fest, süß und angenehm gewürzt. Eine sehr gute frühe Tafeltraube für geschützte Lagen.

**Gros Colman**
**Treibhaussorte.** Reife: spät. Traube aus dem Treibhaus bis zu 2 kg schwer, pyramidenförmig, von großer Schönheit. Beeren sehr groß, rund, schwärzlich-purpurn, stark bereift. Fleisch fest, süß, jedoch nicht von erster Güte. Benötigt viel Wärme.

**Perle von Czaba**
**Freilandsorte.** Reife: sehr früh. Benötigt einen kräftigen Boden. Ertrag reich, sehr starkwachsend. Entwickelt mittelgroße, **gelblichgrüne,** sehr süße Beeren mit Muskatgeschmack. Sehr geeignet für kältere Gegenden.

**Weißer Gutedel**
**Freilandsorte.** Reife: mittelfrüh. Traube groß, pyramidenförmig. Beeren groß, kugelig, **gelbgrün** geadert. Haut ziemlich stark und fest, süß und angenehm gewürzt. Ertrag außerordentlich reich. Ist in hohem Maße als Tafeltraube geeignet.

# F. Erdbeeren

## A. Großfrüchtige Sorten:

**Deutsch-Evern**
Sie gilt als eine der besten Frühsorten, wenn sie immer nach Frühreife, Ertrag und Gesundheit ausgelesen wird. Beansprucht einen guten, ausreichend feuchten Boden und günstige Lage. Wuchs mittelstark, aufrecht. Ertrag mittel, Fruchtfleisch ziemlich fest. Sollte nur in zweijähriger Kultur gezogen werden, da im 3. Jahr die Früchte schon sehr klein sind. Fremdbefruchtung ist günstig. Gute Sorte für Frühtreiberei.

**Dithmarschen**
**Reife: 14 Tage nach Deutsch-Evern.** Diese Sorte ist als Massenträger der altbekannten Sorte Oberschlesien in Geschmack und Festigkeit der Früchte etwa gleichzusetzen. Bevorzugt schwere Böden. Wenig krankheitsanfällig. Fremdbefruchtung ist günstig.

**Eva Macherauch**
**Reife: ca. 4 Tage nach Deutsch-Evern.** Eine Sorte, die nur für nährstoffreiche Böden zu empfehlen ist. Die Frucht ist groß, rund und hat eine glänzendrote Färbung. Das rote Fruchtfleisch ist fest und aromatisch, was die Sorte als Tafel- und Konservenfrucht wertvoll macht. Durch die runde Form reifen die Früchte gleichmäßig und gut aus.

**Hansa**
(Schwarze Ananas). **Reife: 10 Tage nach Deutsch-Evern.** Hat als Erwerbssorte nur lokale Bedeutung. Ihr Ertrag ist in guten Lagen mit hoher Luftfeuchtigkeit sehr gut. Findet viele Liebhaber durch ihre Fruchtqualität und tiefrote Farbe. Fremdbefruchtung ist günstig.

**Madame Moutôt**
(Rotkäpple v. Schwabenland). **Reife ca. 14 Tage nach Deutsch-Evern.** Sie ist die größte Erdbeersorte überhaupt. Wer schnell große Mengen ernten will, pflanze diese Sorte. Läßt jedoch, was Fruchtqualität und Versandfestigkeit anbelangt, zu wünschen übrig. Sie ist leicht zu ernten und bringt auf geeigneten Standorten sehr gute Ergebnisse. Fremdbefruchtung ist günstig.

**Mieze Schindler**
**Reife: 16 Tage nach Deutsch-Evern.** Eine der wohlschmeckendsten und edelsten Sorten für den Liebhaber. Hocharomatische Sorte mit duftenden schwarzroten Früchten. Bei Vollreife feinster brombeerartiger Geschmack. Zum Rohessen wie zum Einmachen. Scheidet als Hauptertragssorte aus, da sie keinen Versand verträgt. Da nur weibliche Blüten ausgebildet werden, ist Fremdbefruchtung nötig.

**Oberschlesien**
**Reife: 12 Tage nach Deutsch-Evern.** Frucht groß bis sehr groß, kegelförmig breit, glänzend rot. Sie brachte bis heute die höchsten Erträge, ist jedoch an vielen Stellen zu stark abgebaut, so daß vielleicht einmal Dithmarschen an ihre Stelle treten könnte.

**Sieger**
**Reife: ca. 5 Tage nach Deutsch-Evern.** Eine ältere Sorte, die sich besonders für schwerere Böden eignet. Die großen, runden bis herzförmigen Früchte sind süß und wohlschmeckend.

**Georg Soltwedel**
**Reife: 6 Tage nach Deutsch-Evern.** Eine hervorragende Sorte für den Erwerbs- und Privatanbau, die in den ersten 2 Jahren ertragsmäßig von kaum einer anderen Sorte übertroffen wird. Von hochfeinem Aroma. Frucht glänzend dunkelrot, zapfenförmig. Frucht hält sich im gepflückten Zustand 2—3 Tage, wenn kühl gelagert. **Diese Sorte verdient stärkste Verbreitung! Selbstfruchtbar!**

## B. Kleinfrüchtige immertragende Monatserdbeeren:

**Baron Solemacher**
Die Pflanzen bilden keine Ausläufer und sind daher gut für Einfassungen im Gemüsegarten geeignet. Sie tragen den ganzen Sommer. Die roten Früchte sind besonders wohlschmeckend.

**Rügen**
Sie ist sehr fruchtbar und trägt ohne Rücksicht auf die Witterung vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Die dunklen Früchte haben einen hervorragenden Geschmack und feines Aroma.

# Befruchtungsverhältnisse beim Beerenobst

1. **Johannisbeeren:** Es ist ein Fruchtansatz sowohl durch Selbstbefruchtung, wie auch durch Fremdbefruchtung möglich.

2. **Stachelbeeren, Himbeeren und Brombeeren:** Sind alle drei selbstfruchtbar (selbstfertil), können also allein gepflanzt werden.

3. **Erdbeeren:** Bei ihnen gibt es neben eingeschlechtlich, zweihäusigen und zwittrigen Pflanzen alle Übergänge zwischen diesen beiden Geschlechtsformen. Deswegen ist für die Praxis wichtig, daß wir fast alle Sorten befruchtungsbiologisch zusammen pflanzen sollten. Unbedingt erforderlich ist dies bei den Sorten Mieze Schindler und Späte von Leopoldshall, die nur weibliche Blüten ausbilden.

# III. SCHALENOBST

## Haselnüsse

**Cosford**
(Zellerhybride). Reife: Mitte September. Hellbraune Kernhaut, wohlschmeckend. Eine sehr empfehlenswerte Sorte. Der Strauch wächst aufrecht und trägt reich, meist in Büscheln zu 3—5 Nüssen.

**Englische Riesen**
(Zellerhybride). Reife: 1. Septemberhälfte. Trägt früh und reich, meist in Büscheln mit 6—10 Nüssen. Busch kräftig breitwachsend.

**Hallesche Riesennuß**
(Zellernuß). Hat eine außerordentliche Ähnlichkeit mit Wunder aus Bollweiler, die sich auch verwandtschaftlich nahestehen. Nuß groß bis sehr groß, rundlich kegelförmig. Eine der größten und feinsten Nüsse. Wuchs kräftig aufrecht.

**Holsteiner Lambertnuß**
Reift etwas früher als die Zellernuß. Diese aus Kleinasien stammende Nuß zeichnet sich durch ziemlich breite, rundliche Blätter aus. Die Hochblätter sind zu einer schlauch- oder röhrenförmigen Hülle zusammengewachsen. Diese Selektion zeichnet sich durch gleichmäßige und hohe Erträge aus.

**Lange Landsberger**
(Zellernuß). Reife: Anfang bis Mitte September. Nuß groß bis sehr groß, lang, verkehrt eiförmig, etwas breitkantig. Kern hat einen sehr wohlschmeckenden, mandelartigen Geschmack. Wächst kräftig aufrecht, trägt sehr gut und regelmäßig. Blüte mittelfrüh.

**Rote Lambertnuß**
Reife: Ende August. Obwohl die Nuß nur mittelgroß, ist sie doch sehr begehrt, da Kern süß und wohlschmeckend. Kernhaut ist karmesinrot. Der Baum wächst schwach und ist sehr fruchtbar und besitzt wegen des schönen dunkelroten Laubes noch Zierwert.

**Webbs Preisnuß**
(Lambertshybride). Reife: Mitte bis Ende September. Nuß sehr groß, lang bis oval. Schale ziemlich dick, Kern sehr wohlschmeckend. Diese Sorte beginnt schon früh, außerordentlich reich zu tragen. Eine der besten und ertragreichsten Sorten für den Massenanbau.

**Wunder von Bollweiler**
(Zellernuß). Frucht sehr groß, kegelförmig rund. Hat große Ähnlichkeit mit Hallesche Riesennuß, die ihr auch verwandtschaftlich nahesteht. Charakteristisch ist die scharf zulaufende Spitze mit vorstehenden Nahtleisten für Hallesche Riesen, während Wunder von Bollweiler eine stumpfere Spitze aufweist. Eine der wertvollsten Massenertragssorten.

## Befruchtungsverhältnisse bei Haselnüssen

Untersuchungen haben ergeben, daß sämtliche in Kultur befindliche Haselnußsorten praktisch selbststeril sind. Deshalb sind stets Mischpflanzungen mit mehreren Sorten anzulegen unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung zur Blütezeit. Als besonders geeignete Pollenspender haben sich folgende Sorten erwiesen: Cosford, Hallesche Riesen und Waldhasel. Zu Ertragsstörungen kann es besonders dann kommen, wenn plötzlich nach milden Wintermonaten, etwa im Monat Februar, stärkerer Frost eintritt, und zwar zu einer Zeit, wenn sich die Kätzchen schon gestreckt haben und unmittelbar vor dem Stäuben sind. In solchen Fällen ist es durchaus möglich, daß der Pollen vertrocknet bzw. erfriert. Um ein vorzeitiges Treiben der Kätzchen zu verhindern, sind bei Anlagen besonders die Nord- und Westseiten zu bevorzugen.

# IV. SONSTIGES

## Rhabarber

**Queen Viktoria**
Diese Sorte reift sehr früh, bringt einen guten Ertrag und empfiehlt sich sehr für den Erwerbsgartenbau. Unten rot, nach oben mehr grün.

**The Sutton**
Eine Sorte, die ungewöhnlich hohe Erträge bringt. Die langen kräftigen Stiele sind rot.

**Vierländer Blut**
Eignet sich sehr für den Erwerbsanbau und bringt einen guten Ertrag, reift mittelfrüh, ist außen rot und innen rot bis hellrot gefärbt.



# Rosen

## I. Niedrige Rosen

**auf Rosa canina, Rosa multiflora und Edelcanina veredelt.**

**Bei Frühjahrslieferung wird bei Abnahme nach dem 1. Februar ein Überwinterungszuschlag von 10 % berechnet.**

| | Güteklasse A | | | Güteklasse B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
| In Sorten nach Wahl des Lieferanten: | —.60 | 5.40 | 48.— | —.45 | 4.35 | 39.— |
| **Preis-Gruppe 1. . . .** | —.60 | 5.40 | 48.— | —.45 | 4.35 | 39.— |
| „ „ 2. . . . | —.70 | 6.15 | 54.— | —.55 | 4.80 | 44.— |
| „ „ 3. . . . | —.75 | 6.75 | 60.— | —.60 | 5.40 | 48.— |
| „ „ 4. . . . | 1.— | 8.75 | 80.— | —.80 | 7.— | 64.— |
| „ „ 5. . . . | 1.25 | 11.25 | 100.— | 1.— | 9.— | 80.— |
| „ „ 6. . . . | 1.35 | 12.— | 108.— | 1.10 | 10.— | 86.— |

## II. Niedrige Rosen zum Topfen

**Bei Frühjahrslieferung wird bei Abnahme nach dem 1. Februar ein Überwinterungszuschlag von 10 % berechnet.**

**Tee, Teehybrid** und **Polyantha** auf Rosa multiflora veredelt, **extra starke Qualität** 100 St. DM 60.—

## III. Hochstämmige Rosen

**Bei Frühjahrslieferung wird bei Abnahme nach dem 1. Februar ein Überwinterungszuschlag von 10 % berechnet.**

| | | Güteklasse A | | Güteklasse B | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 St. DM | 10 St. DM | 1 St. DM | 10 St. DM |
| Hochstämme auf Sämlingsstamm | 120 cm | 3.— | 28.50 | 2.40 | 22.50 |
| | 100 cm | 2.25 | 21.— | 1.80 | 16.— |
| | 80 cm | 1.50 | 13.50 | 1.20 | 11.— |
| Trauerstämme | 140 cm | 3.75 | 36.— | 3.— | 28.50 |
| | 160 cm | 4.50 | 42.50 | 3.60 | 34.— |

# Übersicht der Rosensorten


| Preisgruppe | | Seite |
|---|---|---|
| 3 | **A**dolf Grille | 41 |
| 4 | Alain | 41 |
| 4 | American Pillar | 47 |
| 5 | andersonii | 45 |
| 5 | Aristide Briand | 45 |
| 5 | Austrian Yellow | 45 |
| 5 | **B**erlin | 44 |
| 3 | Better Times | 38 |
| 2 | Betty Prior | 42 |
| 4 | **C**addy | 39 |
| 5 | canina von Kiese | 44 |
| 5 | Carmen | 44 |
| 5 | centifolia muscosa | 45 |
| 4 | Chaplin's Pink Climber | 47 |
| 6 | Charles Mallerin | 38 |
| 5 | Charlotte Armstrong | 38 |
| 4 | Climbing Amer. Beauty | 47 |
| 5 | „ Gruß an Aachen | 47 |
| 5 | „ Orange Triumph | 46 |
| 2 | Condesa de Sastago | 40 |
| 5 | Conrad Ferd. Meyer | 45 |
| 4 | Crimson Conquest | 46 |
| 2 | „ Glory | 38 |
| 4 | Cynthia Brooke | 40 |
| 2 | **D**agmar Späth | 43 |
| 2 | Dame Edith Helen | 39 |
| 3 | De Ruiter's Herald | 41 |
| 2 | Dick Koster | 42 |
| 4 | Direktor Benschop | 47 |
| 2 | Donald Prior | 41 |
| 4 | Dorothy Perkins | 47 |
| 4 | Düsterlohe | 47 |
| 2 | Duquesa de Peneranda | 40 |
| 3 | **E**clipse | 39 |
| 4 | Elegance | 47 |
| 3 | Elfe | 43 |
| 5 | Elmshorn | 44 |
| 1 | Else Poulsen | 42 |
| 4 | Ena Harkness | 38 |
| 2 | Erna Grootendorst | 41 |
| 2 | Etoile de Hollande | 38 |
| 4 | Excelsa | 46 |
| 3 | **F**anal | 41 |
| 4 | Fanny Blankers-Koen | 40 |
| 4 | Fashion | 42 |
| 5 | Folies Bergères | 39 |
| 2 | Frau Astrid Späth | 42 |
| 2 | Frau Karl Druschki | 40 |
| 3 | Frensham | 41 |
| 5 | Fritz Nobis | 45 |
| 6 | Frühlingsgold | 46 |
| 6 | Frühlingsmorgen | 45 |
| 6 | Frühlingszauber | 44 |
| 2 | **G**abrielle Privat | 42 |
| 5 | Gartendirektor O. Linné | 45 |
| 3 | Geheimrat Duisberg | 39 |
| 4 | Gelbe Holstein | 43 |
| 4 | Gerberose | 47 |
| 6 | Gertrud Westphal | 41 |
| 4 | Glenn Dale | 47 |
| 5 | Gloire de Dijon | 47 |
| 2 | Gloria Dei | 39 |
| 2 | Gloria di Roma | 38 |
| 4 | Gneisenau | 47 |
| 4 | Golden Climber | 47 |
| 4 | „ Glow | 47 |
| 5 | Goldilocks | 43 |
| 3 | Gretel Greul | 39 |
| 2 | Gruß an Aachen | 42 |
| 5 | Guinée | 46 |
| 5 | **H**amburg | 44 |
| 6 | haematodes (pend. haematodes) | 45 |
| 3 | Heidemarie | 41 |
| 3 | Hens Verschuren | 38 |
| 5 | Herrenhausen | 46 |
| 3 | Herzblut | 41 |
| 3 | Holstein | 41 |
| 6 | Hugonis | 46 |
| 2 | **I.** F. Müller | 41 |
| 3 | Inspektor Blohm | 43 |
| 2 | Joseph Guy | 41 |
| 5 | June Morn | 46 |
| 3 | **K**arl Weinhausen | 42 |
| 3 | Käthe Duvigneau | 42 |
| 3 | Kathrine Pechtold | 40 |
| 4 | **L**e Rève | 47 |
| 2 | Luis Brinas | 40 |
| 2 | Luna | 39 |
| 5 | lutea bicolor atropurpurea | 46 |
| 5 | **M**aidens Blush | 45 |
| 5 | Marcelle Gret | 39 |
| 4 | Märchenland | 42 |
| 6 | Maréchal Niel | 47 |
| 2 | Margo Koster | 43 |
| 3 | Martha Kordes | 42 |
| 4 | Mary Wallace | 47 |
| 2 | Mc. Gredy's Yellow | 39 |
| 2 | Mme. Jules Bouché | 40 |
| 4 | Mme. Sancy de Parabère | 47 |
| 1 | Mevr. G. A. van Rossem | 40 |
| 3 | Michèle Meilland | 39 |
| 6 | Midget | 43 |
| 4 | Mission Bells | 39 |
| 5 | Morning Star | 46 |
| 6 | moyesii | 44 |
| 2 | Mrs. John Laing | 39 |
| 2 | Mrs. Pierre S. du Pont | 39 |
| 6 | multibracteata | 45 |
| 2 | **N**arzisse | 40 |
| 5 | New Dawn | 45 |
| 5 | New Yorker | 38 |
| 5 | **O**bergärtner Wiebicke | 42 |
| 6 | omeiensis pteracantha | 46 |
| 6 | Opéra | 38 |
| 2 | Orange Triumph | 43 |
| 2 | Oswald Sieper | 40 |
| 5 | **P**arkfeuer | 44 |
| 2 | Paul Crampel | 43 |
| 4 | Paul's Scarlet Climber | 47 |
| 6 | Peon | 43 |
| 6 | Perla de Alcanada | 43 |
| 6 | Perla de Montserrat | 43 |
| 5 | Pike's Peak | 44 |
| 5 | pimpinellifolia altaica | 46 |
| 5 | „ Stanwell Perpetual | 45 |
| 5 | Pink Grootendorst | 45 |
| 3 | Poinsettia | 38 |
| 2 | Poulsen's Pink | 42 |
| 3 | Provence | 40 |
| 2 | **Q**uebec | 40 |
| 3 | **R.** M. S. Queen Mary | 40 |
| 2 | Rote Gabrielle Privat | 42 |
| 2 | Rote Rapture | 39 |
| 4 | Royal Scarlet Hybrid | 47 |
| 5 | Rubaiyat | 38 |
| 5 | rubiginosa magnifica | 45 |
| 5 | Ruskin | 44 |

| Preis-gruppe | | Seite |
|---|---|---|
| 5 | Sangerhausen | 44 |
| 3 | Schleswig | 42 |
| 4 | Schneeschirm | 43 |
| 5 | Schwerin | 44 |
| 5 | Selfcolored | 44 |
| 2 | Silberlachs | 42 |
| 6 | Sondermeldung | 42 |
| 6 | Sparrieshoop | 45 |
| 6 | Sutter's Gold | 40 |
| 5 | Tallyho | 39 |
| 4 | Tausendschön | 47 |
| 1 | Texas Centennial | 40 |
| 5 | Uetersen | 44 |
| 2 | Ulrich Brunner fils | 39 |
| 4 | Venusta pendula | 47 |
| 5 | Vercors | 39 |
| 4 | Verschurens Pink | 39 |
| 3 | Vincens Bergers Weiße | 40 |
| 5 | Virgo | 40 |
| 6 | Vogue | 43 |
| 5 | Weiße Eva | 46 |
| 2 | Weiße Gruß an Aachen | 43 |
| 6 | White Whings | 46 |
| 4 | Willi Maaß | 42 |
| 6 | Will Scarlet | 45 |


# A. Großblumige Edelrosen

*Alle mit einem ✶ versehenen Edelrosen lassen sich auch gut als öfter blühende (remontierende) Strauchrosen verwenden.*

**Hierbei muß besonders betont werden, daß diese Sorten nur am 2jähr. Holze blühen, woraus folgert, daß die Pflanzen im Frühjahr nur ganz wenig zurückgeschnitten werden dürfen.**

**Abkürzungen:** G — Gruppenrose, S — Schnittrose, T — Treibrose
H — auch als Hochstamm vorhanden

Besonders empfehlenswerte Sorten sind unterstrichen.

**In der Sortenwahl haben wir uns nur auf die wirklich wertvollen Sorten beschränkt.**

| Preis-Gruppe | **Rote Farbtöne:** | |
|---|---|---|
| 3 | **Better Times,** ein sehr wertvoller Sport von Briarcliff, der sich sehr gut als **Treibsorte** eignet. Blume länglich spitz, gut gefüllt, dunkelrot. | G, S, T |
| 6 | **Charles Mallerin (Neuheit 1947!),** eine sehr schöne dunkelrote Sorte von hoher Blühwilligkeit und **herrlichem Duft.** Wuchs stark aufrecht. | G, S |
| 5 | **Charlotte Armstrong,** enorm große, wundervoll gebaute und gefüllte Blumen von **gutem Duft,** reiner hellroter Farbe und gesundem Laub. | G, S |
| 2 | **Crimson Glory,** eine **sehr blühwillige, kälteresistente und kleinbleibende Treibsorte** mit karmesinroten, sammetartigen, dunkel schattierten Blumen mit **einzigartigem Duft.** | H, G, S, T |
| 4 | **Ena Harkness,** Blume von edlem Bau, guter Füllung und langer Haltbarkeit. Von einzigartiger, feuriger, scharlachroter Farbe. Sehr wertvoll! | H, G, S |
| 2 | **Etoile de Hollande, eine alte, sehr blühwillige, kälte- und krankheitsresistente Sorte** mit dunkelroten, edel geformten Blüten und **sehr gutem Duft.** Pflanze gesund und wüchsig, ungeheuer reichblühend. **Gute Treibsorte!** Eine der schönsten dunkelroten Rosen. | H, G, S, T |
| 2 | **Gloria di Roma,** eine leuchtendrote Dame Edith Helen. | G, S |
| 3 | **Hens Verschuren,** Blume groß und sehr edel auf langen Stielen, Farbe unveränderlich, ein **leuchtendes reines Blutrot,** nicht verblassend und nicht verbrennend, wohl die schönste Rose in dieser Farbe. **Gute Treibsorte!** | H, G, S, T |
| 5 | **New Yorker (Neuheit 1948!),** Blume groß, hervorragend gefüllt, Blütenfarbe rein leuchtend dunkelrot, nicht verblauend oder verbrennend, Blumen langstielig, ausgezeichnete **Treib-** und Schnittrose. **Angenehm duftend.** | H, S, T |
| 6 | **Opéra (Neuheit 1949!),** Blume sehr groß, auffallend, einmalig leuchtend kräftig-kirschrot, sehr reichblühend, **angenehm duftend.** | G, S |
| 3 | **Poinsettia,** eine vorzügliche, **sehr blühwillige und krankheitsresistente Treib-,** Schnitt- und Gartenrose. Blume groß bis sehr groß, gut gefüllt, aufrecht auf kräftigen Stielen stehend. Farbe feurig scharlachrot, nie verblauend. | H, G, S, T |
| 5 | **Rubaiyat (Neuheit 1948!),** eine gute Garten- und Schnittrose. Kirschrot, in der Mitte etwas dunkler. Sehr große, vollgefüllte, gut haltbare Blumen. | G, S |

Preis-Gruppe

5 **Tallyho (Neuheit 1948!)**, die Knospen sind becherförmig und entwickeln sich zu großen, edlen, vollgefüllten Blumen. Die Farbe ist auf der Innenseite karmesin und auf der Rückseite der Blumenblätter kardinalrot. **Stark duftend.** S

2 ✶ **Ulrich Brunner fils**, altbekannte, **remontierende**, besonders **frostresistente**, kirschrote Rose. Pflanze stark, langtriebig mit vollkommen **krankheitsfreiem** Laub. G, S

5 **Vercors (Neuheit 1946!)**, Blumen von enormem Umfang, als solche ungewöhnlich auffallend, **angenehm duftend.** Die Farbe ist kupferblutrot, beim Verblühen in scharlachrot übergehend. Pflanze sehr stark wachsend und gut blühend. G, S

## Rosa Farbtöne:

2 **Dame Edith Helen**, eine sehr wertvolle alte Sorte! Blumen sehr groß und stark gefüllt, leuchtend rosa, ohne Nebenton, auf langen, steifen Stielen stehend. Pflanze kräftig und gesund, **herrlicher Duft.** G, S, T

3 **Gretel Greul**, dieser **sehr blühwillige und krankheitsresistente** Sport von Rapture stellt eine wertvolle **Treib-**, Schnitt- und Gartenrose dar. Blume größer als bei der Stammsorte, anfangs karminrot, später in karminrosa übergehend, stark duftend. H, G, S, T

3 **Michèle Meilland (Neuheit 1945!), eine vorzügliche Schnitt- und Gartenrose** von zartester, weißlichrosaner Farbe ohne irgendwelche Schattierungen, **angenehm duftend.** Sie hat einen **ausgezeichneten Schnittrosenwuchs** und gute, gesunde Belaubung. H, G, S

4 **Mission Bells (Neuheit 1949!)** eine sehr ergiebige, **duftende** Teehybride. Der Wuchs ist außerordentlich stark und aufrecht. Blüte hell lachsrosa, sehr ansprechend und unveränderlich. Die Pflanze bringt viele langgestielte Blumen und hat eine absolut einwandfreie, gesunde Belaubung. **Sehr empfehlenswert!** S

2 ✶ **Mrs. John Laing, eine remontierende, sehr blühwillige und frostresistente, großblumige Sorte** von herrlicher Form, seidenartig rosa, **duftend.** Pflanze langtriebig, stark und aufrecht wachsend. G, S

2 **Rote Rapture**, Sport von Rapture, ist in allen Eigenschaften bis auf die Blume der Stammsorte vollkommen gleich. Die Blüten sind dunkler im Ton, etwa dunkelrosa, **gute Treibsorte!** H, G, S, T

4 **Verschurens Pink (Neuheit 1949!)**, eine sehr wertvolle Sorte mit großen Blumen von anziehender Farbe und ungewöhnlich edlem Bau. Sie **duftet ausgezeichnet** und ist von großer Haltbarkeit. Die Farbe ist ein kräftiges schattiertes Rötlichrosa. H, G, S

## Gelbe Farbtöne:

4 **Caddy (Neuheit 1945!)**, zeichnet sich durch sehr große, goldgelbe Blumen, lange Stiele und gesunden aufrechten Wuchs aus. Pflanze stark und aufrecht wachsend. Sehr wertvoll! G, S

3 **Eclipse**, hellzitronengelbe, leicht gefüllte Blume, Knospe langgestreckt, edle Form. Sehr reichblühend. Wuchs gut buschig. G, S

5 **Folies Bergères (Neuheit!)**, eine gefüllte, goldgelbe und rötlich überlaufene Sorte mit **starkem Duft.** Eine sehr reichblühende und wertvolle Beetrose. G, S

3 **Geheimrat Duisberg, eine sehr blühwillige, krankheitsresistente Sorte,** die in ihrer reingelben Farbe stark an Julien Potin erinnert. Wuchs wie Rapture, glänzendes, gesundes Laub. Ist als gelbe **Treibsorte** bisher noch **nicht übertroffen.** H, G, S, T

2 **Gloria Dei, eine sehr blühwillige, kälte- und krankheitsresistente Treib- und Schnittsorte** mit goldgelben, am Rande rot überlaufenen Blüten, äußere Blütenblätter rötlich, stark gefüllt, **gut duftend.** Wuchs kräftig, Laub groß, glänzend. H, G, S, T

2 **Luna**, eine sehr wertvolle, hellgelbe Sorte mit **gutem Duft** und gesundem Laub. Pflanze starkwachsend, Blume auf steilen Stielen stehend. H, G, S

5 **Marcelle Gret (Neuheit 1947!)**, riesige, sattgelbe Blumen auf langen Stielen und mit starkem Wuchs. **Sehr wertvoll!** G, S

2 **Mc. Gredy's Yellow**, eine **sehr reichblühende**, leuchtend reingelbe, ausgezeichnete Schnittsorte. H, S

2 **Mrs. Pierre S. du Pont, eine wertvolle, sehr blühwillige, frost- und krankheitsresistente Gruppenrose** mit gelben Blüten auf ockergelbem Grund, lang und festgestielt, Belaubung glänzend hellgrün. H, G, S

| Preis-Gruppe | | |
|---|---|---|
| 2 | **Narzisse,** eine sehr gute Schnitt- und Gartenrose, Blüten goldgelb mit rosa Hauch an den Petalenrändern. | H. G, S |
| 2 | **Quebec,** rein goldgelbe Schnitt- und Gartenrose mit außerordentlich gesundem Laub und hoher Blühwilligkeit. | H, G, S |
| 6 | **Sutter's Gold (Neuheit 1950!),** Blumen genügend gefüllt, groß, von wundervoller Farbe, goldgelb, außen orangegelb. **Stark duftend.** Pflanze ungewöhnlich stark- und aufrechtwachsend. | G, S |

## Weiße Farbtöne:

| | | |
|---|---|---|
| 2 ✶ | **Frau Karl Druschki,** eine sehr wertvolle, **remontierende,** reinweiße, auffallend große und gefüllte Blüte. | G, S |
| 2 | **Mme. Jules Bouché,** weiß, in der Mitte zartrosa, reichblühend, gut gefüllt, stark- und aufrechtwachsend, sehr **gute Treib-,** Schnitt- und Gartenrose. | G, S, T |
| 2 | **Oswald Sieper,** eine unserer besten weißen, **sehr blühwilligen und krankheitsresistenten Schnittsorten.** Blume groß, weiß, gut gefüllt, auf langen Stielen. **Sehr wertvoll!** | H, G, S |
| 3 | **Vincens Bergers Weiße,** Blumen hervorragend gefüllt, sehr haltbar, gelblich bis reinweiß, Pflanze buschig, ausgezeichnete, **besonders krankheitsresistente Treib-** und Freilandschnittsorte. | H, G, S, T |
| 5 | **Virgo,** schönste weiße Rose, **stark duftend.** Knospen langgestreckt, Blüte wohlgeformt, blendendweiß, der Wuchs ist steil aufrecht. | H, S, T |

## Gemischtfarbige:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Condesa de Sastago,** eine der besten kupfrig gefärbten Sorten mit großen halbgefüllten Blüten. Wuchs stark, gesund und aufrecht. | H, G, S |
| 4 | **Cynthia Brooke (Neuheit 1942!),** Blumen sehr groß und gut gefüllt, von gelber Farbe mit lachsrosa Schattierungen, Gedrungener, buschiger Wuchs und gesunde Belaubung. | G, S |
| 2 | **Duquesa de Peneranda,** die mittelgroßen, orange bis lachsfarbigen Blüten sind vorzüglich gefüllt und von **herrlichem Duft.** Wuchs aufrecht und gesund. | G, S |
| 4 | **Fanny Blankers-Koen (Neuheit!),** Blumen rötlich bis gelb, in einer sehr haltbaren, schöngeformten, langen Knospe. Eine reichblühende, farbenprächtige Gartenrose. | H, G, S |
| 3 | **Kathrine Pechtold,** orangerot, mittelstark gefüllt, gut **duftend.** Der Wuchs ist stark aufrecht, die Belaubung gesund. Die Pflanze blüht unermüdlich bis zum Herbst; **eine gute Treib-** und Gartenrose. | H, G, S,T |
| 2 | **Luis Brinas,** Blume enorm groß, gut geformt, orangefarbig, gut **duftend.** Wuchs kräftig, blüht den ganzen Sommer hindurch. Eine herrliche Gruppen- und Gartenrose. | H, G, S |
| 1 | **Mevr. G. A. v. Rossem,** Blume eigenartig gefärbt, dunkelorange bis aprikosenfarbig, auf goldgelbem Grund, starkwachsende. reichblühende, gute Gruppenrose. | H, G, S |
| 3 | **Provence,** edelgeformte, lange Knospen auf langen kräftigen Stielen stehend. Außenseite aprikosenfarbig, innen gelb, Pflanze gesund, ausgezeichnete Schnittsorte. | H, G, S |
| 3 | **R. M. S. Queen Mary,** dunkellachsorange, edle Form auf langen kräftigen Stielen, vollgefüllt, Wuchs kräftig. **Für Treiberei** sehr wertvoll. **Stark duftend.** | G, S, T |
| 1 | **Texas Centennial,** ein **sehr blühwilliger** Sport von Prés. Herbert Hoover, Blume braunrot bis bronzerot. Sonst die gleichen sehr guten Eigenschaften wie die Stammsorte. **Angenehm duftend.** | H, G, S |

# B. Polyantha-Rosen

**Wegen ihrer reichen Blütenfülle, die bei sachgemäßer Behandlung fast ununterbrochen den ganzen Sommer anhält, sind sie besonders für Gruppen und Einfassungen geeignet.**

*Alle mit einem ✶ versehenen Polyantharosen lassen sich auch gut als öfter blühende Strauchrosen verwenden.*

**Warenzeichenrechtlich geschützte Sorten dürfen weder zu Vermehrungszwecken noch zum Verkauf von Rosenaugen verwendet werden. Ein Verkauf dieser Sorten ist nur im Inlande möglich.**

**Zeichenerklärung:** S — Polyantha für Schnittzwecke, H — auch als Hochstamm lieferbar. Besonders wertvolle und empfehlenswerte Sorten sind unterstrichen.

## Auswahl der z. Zt. besten Sorten!

Preis-Gruppe

### Rote Farbtöne:

3 **Adolf Grille,** eine der wertvollsten niedrigen Sorten, mit feurigroten, großen und stark gefüllten Blumen auf kräftigen Stielen. Außerordentlich reichblühend, ca. 60 cm hoch werdend. H

4 **Alain (Neuheit 1948!),** eine **sehr empfehlenswerte, reichblühende Sorte** mit großen gefüllten, in Büscheln und größeren Dolden zusammensitzenden, leuchtenden, sammetartig bis blutroten Blüten, die sehr haltbar sind und sich bei keiner Witterung verändern. Wird 50—60 cm hoch. S

3 **De Ruiter's Herald (Neuheit 1949!),** Blumen in riesigen Dolden, im Typ wie Orange Triumph, einfach leuchtendscharlach. **Bei Regen und Sonnenbrand unverändert.** Hervorragende Beetrose, wird ca. 50 cm hoch.

2 **Donald Prior,** eine der wertvollsten alten, **schön duftenden** Sorten. Blumen in Dolden, fast ungefüllt, feurig scharlachrot, von großer Leuchtkraft wie bei keiner anderen Rose, sehr haltbar, Wuchs stark, Belaubung krankheitsfrei, bis 50 cm hoch werdend.

2 **Erna Grootendorst,** eine unserer wertvollsten älteren, niedrig bleibenden, **frostharten** Sorten. Leuchtendsamtrot sind die großgefüllten Blüten, welche in großen Dolden blühen. Kann als wesentliche Verbesserung von Rödhätte angesprochen werden, 50 cm hoch werdend. H

3 **Fanal (Neuheit 1946!), eine außerordentlich reichblühende, frost- und krankheitsresistente Sorte** mit leuchtend rosaroten, in offenen Schalen stehenden Blüten, Wuchs aufrecht, gesund, 60 cm hoch werdend. Ihre **Leuchtkraft** wird von keiner anderen Sorte übertroffen.

3 **Frensham (Neuheit 1949!),** eine vorzügliche, **sehr reichblühende Sorte,** die 75 cm hoch wird und sehr buschig und breit wächst. Die halbgefüllten Blüten sitzen in Büscheln zusammen und haben eine auffallend leuchtend dunkelrote Farbe.

6 **Gertrud Westphal (Neuheit 1951!), Warenzeichen rechtlich geschützt.** Eine sehr wirkungsvolle Sorte, deren in lockeren Büscheln zusammensitzenden scharlachroten Blüten **von ganz besonderer Farb- und Leuchtkraft sind.** Die Sorte **bleibt niedrig** und blüht ohne Unterbrechung bis in den Herbst hinein.

3 **Heidemarie,** eine einfach karminrote Polyantha-Hybride mit großen Blumen, starkwachsend, wirkt als Einzelpflanze sehr schön, ca. 100 cm hoch werdend.

3 **Herzblut,** eine sehr wertvolle Sorte mit enorm großen Blüten, die halbgefüllt sind und in Büscheln zusammensitzen. Farbe **leuchtend blutrot, ungewöhnlich haltbar,** die Pflanze wächst buschig und gedrungen, hat herrliche, gesunde Belaubung, ca. 60 cm hoch werdend. H

3 **Holstein,** eine sehr zu empfehlende Sorte mit sehr großen, einfachen, leuchtend dunkelroten Blüten. Pflanze gesund, hart, **reich- und dauerblühend,** ca. 60 cm hoch werdend.

2 **I. F. Müller,** ein besonders wertvoller und **frostharter** Sport von Rödhätte, feurig blutrot, Blume groß, in mächtigen Dolden, sehr haltbar, gesundes Laub, 40—50 cm hoch werdend.

2 **Joseph Guy,** es gibt wohl kaum eine andere Sorte, die sich über viele Jahre hinweg einer so gleichbleibenden Beliebtheit erfreut. Blüten lebhaft scharlachrot, großdoldig und halbgefüllt, außerordentlich reichblühend und **frosthart,** eine der besten Polyantharosen, bis 50 cm hoch werdend. H

Preis-Gruppe

3 ✶ **Karl Weinhausen (Neuheit 1942!), eine außerordentlich reichblühende, frost- und krankheitsresistente Sorte** von dunkelroter Farbe mit schwacher Lachstönung, halbgefüllt, stark im Wuchs, 60—70 cm hoch werdend, die sich auch sehr gut als **öfter blühende Strauchrose** verwenden läßt.

3 ✶ **Käthe Duvigneau (Neuheit 1942!),** eine sehr wertvolle, **außerordentlich reichblühende, frost- und krankheitsresistente Sorte.** Die dunkelblutroten Blüten sitzen in großen Dolden zusammen. Diese starkwüchsige Gruppenrose, die 60—80 cm hoch wird, läßt sich auch gut als **öfter blühende Strauchrose** verwenden.

2 **Rote Gabrielle Privat,** ein hellroter Sport von Gabrielle Privat mit all ihren Vorzügen. Eignet sich **besonders für die Topfkultur unter Glas,** daneben jedoch auch sehr schön im Garten. Wird 40—50 cm hoch.

6 **Sondermeldung (Neuheit 1950!), Warenzeichen rechtlich geschützt.** Eine sensationelle Züchtung mit großen, vollgefüllten, vollkommen **edelrosengleichen,** ziegel- bis mennigroten Blumen, die sich durch ganz besondere Haltbarkeit auszeichnen. Die Pflanze wächst stark, ist buschig und unermüdlich treibend, wird ca. 60 cm hoch. **Gute Treibsorte!** S

4 **Willi Maaß,** Blume gefüllt, sammetartig leuchtendrot, leicht **duftend.** Bildet große Blütendolden. Wuchs stark und gesund. Wird 60—70 cm hoch. H

## Rosa Farbtöne:

2 ✶ **Betty Prior,** eine alte, **gesunde, wetter- und frostharte Sorte, die sich auch sehr gut als öfterblühende Strauchrose verwenden läßt.** Außen karminrosa, innen etwas heller, Blume groß, in Büscheln, Wuchs kräftig, ca. 70 cm hoch werdend.

2 **Dick Koster,** eine der **besten Topfrosen,** mit lachsrosa bis orange Blüten, die ziemlich groß sind. Gleichmäßiger Wuchs, reichblühend, 30—40 cm hoch werdend.

1 **Else Poulsen,** eine alte, sehr wertvolle Sorte mit rein leuchtendrosa Blüten, sehr reichblühend, gute Schnitt- und Gruppensorte, 60—70 cm hoch werdend. S

2 **Frau Astrid Späth,** ein sehr wertvoller und **frostharter** Sport von J. Guy, rein rosafarbene, großblumige Sorte, die gleich gut für Freilandkultur, als auch als Topfrose geeignet ist, bis 50 cm hoch werdend. S

2 **Gabrielle Privat,** eine **vorzügliche Topfrose,** die nur 40—50 cm hoch wird. Blüten klein, gefüllt, rein rosa, sehr haltbar. Die Pflanze wächst buschig und blüht ungewöhnlich reich in Dolden. S

2 **Gruß an Aachen,** eine ältere, sehr wertvolle Sorte. Blüten gelblich rosa, gut gefüllt, großblumig, sehr reichblühend, 40—50 cm hoch werdend. S

4 ✶ **Märchenland,** eine außerordentlich reichblühende, frost- und krankheitsresistente, **stark remontierende** Polyanthahybride mit Strauchrosencharakter. Blüten hellrosa mit Lachstönung, in großen Büscheln blühend, Blumen gefüllt, **mit kräftigem Caninaduft,** Laub glänzend dunkelgrün.

3 **Martha Kordes,** Blumen groß, halbgefüllt, ungewöhnlich haltbar, von unveränderlich orangerosa Farbe. Pflanze buschig, **reich- und dauernd blühend.** S

5 **Obergärtner Wiebicke (Neuheit 1950!),** eine außerordentlich wertvolle Sorte mit schalenförmigen, enorm großen, halb gefüllten karminrosa Blüten, die von großer Haltbarkeit sind. Diese gesunde und frostharte Sorte ist **sehr blühwillig** und überreich mit dichten Blütenbüscheln bedeckt, ca. 50 cm hoch werdend.

2 **Poulsens Pink,** Blumen groß in Büscheln zusammensitzend, im Typ an Else Poulsen erinnernd, jedoch kräftiger. Die Farbe ist lachsrosa mit helleren Schattierungen. Eine sehr wertvolle und gesunde Sorte. 60—70 cm hoch werdend. S

3 **Schleswig (Neuheit 1948!),** ein prächtiges reinrosa Gegenstück zu der bekannten Holstein. Blüten sind riesig groß, vollkommen einfach, in oft gewaltigen Sträußen. Pflanze wächst stark und aufrecht, ca. 60 cm hoch werdend.

2 ✶ **Silberlachs (Neuheit 1944!),** Blüten schalenförmig, silberlachsfarbig, Wuchs breitbuschig, Laub hellgrün, sehr unempfindlich, läßt sich auch gut als **öfter blühende Strauchrose** verwenden und bestens geeignet für Stauden- und Terrassenanlagen, bis 100 cm hoch werdend.

## Orange und fleischfarbige Farbtöne:

4 **Fashion (Neuheit 1947!),** eine sensationelle amerikanische Neuzüchtung. Sie blüht leuchtend lachsfarbig mit Pfirsichton, eine noch nie gesehene Farbe, die auch im Verblühen sehr farbfest bleibt. 50-60 cm hoch werdend. S

Preis-Gruppe

2 **Margo Koster,** ein niedrigbleibender Sport von Greta Kluis in lachsorange. Sie eignet sich sehr gut zur Beetbepflanzung und ist vor allen Dingen eine hervorragende Topfrose. S

2 **Orange Triumph,** eine ältere, **besonders reichblühende und kälteresistente Sorte,** die sich noch nicht ersetzen läßt. Blumen vollgefüllt, orangescharlachrot, in großen Dolden. Wuchs stark, Belaubung gesund, sehr gute Beet- und Schnittrose, ca. 60 cm hoch werdend. S

2 **Paul Crampel,** eine sehr gute Sorte, die große Ähnlichkeit mit Gloria Mundi hat, nur noch leuchtender in der Farbe, ca. 50 cm hoch werdend.

6 **Vogue (Neuheit 1951!), Warenzeichen rechtlich geschützt.** Edelrosenähnliche Blüten in großen lachs- bis kupferfarbenen Dolden. Eine **duftende,** 70 cm hoch werdende Beetsorte.

## Gelbe Farbtöne:

4 ✶ **Gelbe Holstein (Neuheit 1949!),** die Blumen sind halbgefüllt, groß und sitzen in großen Rispen zusammen. Die Farbe ist ein angenehmes, wirkungsvolles Hellgelb, in der Knospe dunkelgelb. **Das gesunde Laub** weist eine auffallend sattgrüne und frische Farbe auf. Ca. 100 cm hoch werdend, läßt sich auch sehr gut als **öfter blühende Strauchrose** verwenden. S

5 **Goldilocks (Neuheit 1948!),** sie stellt eine **der besten neuen gelben Polyanthasorten** dar, die man zu den blütenreichsten und schönsten ihrer Art zählen kann. Die sehr großen Einzelblumen sitzen in Büscheln zusammen, sind halbgefüllt und sind von prächtiger goldgelber Farbe, die sehr haltbar ist. Wird ca. 60 cm hoch. S

## Weiße Farbtöne:

2 **Dagmar Späth,** eine alte, **außerordentlich reichblühende, frostharte Sorte.** Sport von J. Guy, mit alabasterweißen Blumen, die anfangs zartrosa überhaucht sind, sonst wie die Stammsorte, bis 50 cm hoch werdend. S

3 **Elfe, eine außerordentlich reichblühende, frost- und krankheitsresistente Sorte** mit kräftigem, leicht überhängendem Wuchs, Blüten zu großen Büscheln vereint, etwa 8 cm Durchmesser, reinweiß mit rosa Anflug, einfach, das Laub ist sehr gesund, 80—100 cm hoch werdend.

3 ✶ **Inspektor Blohm,** eine **außerordentlich reichblühende und krankheitsresistente Sorte.** Die Farbe der Blüten ist blendend reinweiß ohne Schattierungen. Die **schön duftenden Blumen** erscheinen in großen Dolden, sind gut gefüllt und haltbar. Die Pflanze wird etwa 80 cm hoch, wächst breitbuschig und läßt sich auch sehr gut als **öfterblühende Strauchrose** verwenden. S

4 ✶ **Schneeschirm, eine außerordentlich reichblühende und krankheitsresistente dekorative Polyanthahybride mit überhängendem Strauchrosencharakter für Garten und Park.** Die einfachen, reinweißen Blüten zeigen einen leichten gelblichen Anflug. Sie blüht **ununterbrochen von Juni bis Herbst.**

2 **Weiße Gruß an Aachen (Neuheit 1944!),** ein sehr wertvoller, reinweißer Sport von Gruß an Aachen, große, vollgefüllte, reinweiße Blumen, von ungewöhnlicher Haltbarkeit, ca. 50 cm hoch werdend. S

# C. Zwergbengalrosen

**Sie gehören zu den kleinsten Rosen der Welt, werden oft nur 10—20 cm hoch und eignen sich auf Grund ihres Zwergwuchses und Blütenreichtums besonders für Steingärten und zur Topfkultur.**

6 **Midget,** Blüten klein, **reinrot,** außerordentlich wirkungsvoll.

6 **Peon,** die Blüten sind klein, halb gefüllt, **leuchtendrot mit weißer Mitte.**

6 **Perla de Montserrat, Blumen** von **reinrosa bis feurigrosa Farbe,** vollblühend.

6 **Perla de Alcanada,** Farbe **karmin-karmesinrot,** ungewöhnlich vollblühend.

# D. Strauch- und Parkrosen

## Auswahl der z. Zt. besten Sorten!

Sie bieten in der Vielgestaltigkeit des angebotenen Sortiments Werkstoff für jede Gelegenheit. **Blütenreichtum, Farbe** und **Duft, Fruchtzierde** und **Verschiedenartigkeit der Belaubung und Bestachelung** bringen unschätzbare Abwechslung in jeden Garten und Park.

*Auf die in der laufenden Sortenbeschreibung durch einen ✶ besonders gekennzeichneten öfter blühenden (remontierenden) Strauchrosen sei hier besonders hingewiesen.*

S — auch als Solitärpflanze 3 × v. lieferbar.

**Warenzeichenrechtlich geschützte Sorten dürfen weder zu Vermehrungszwecken noch zum Verkauf von Rosenaugen verwendet werden. Ein Verkauf dieser Sorten ist nur im Inlande möglich.**

Besonders wertvolle und empfehlenswerte Sorten sind unterstrichen.

| Preis-Gruppe | Rote Farbtöne: | Höhe ca. cm | Blütebeginn |
|---|---|---|---|
| 5 ✶ | **Berlin (Neuheit 1949!)**, eine absolut gesunde, vorzügliche Sorte, Blüten feurig zinnoberrot mit gelber Mitte, in riesigen Dolden blühend, ungewöhnlich haltbar. Pflanze stark und buschig wachsend, **blüht unermüdlich bis zum Herbst.** | 150 | 6. Woche |
| 5 | **Canina von Kiese,** Blüte karminrot, halbgefüllt, **duftend,** 8—9 cm Durchmesser, die schönste aller Hundsrosen. | 250—300 | 3. Woche |
| 5 ✶ | **Carmen** (rugosa hybr.), dunkelrot, einfach, sehr kräftig wachsend, **remontierend, duftend.** | 150 | 4. Woche |
| 5 ✶ | **Elmshorn (Neuheit 1951!), öfter blühende Sorte,** Blumen in ungewöhnlich großen, gut gefüllten und hellroten Dolden, die sehr lange haltbar sind. Belaubung frischgrün, vollkommen krankheitsfrei. | 150—200 | 3. Woche |
| 6 | **Frühlingszauber** (spinosissima hybr.), eine sehr gute Sorte mit sehr großen, halbgefüllten und hellroten Blüten. Sehr reichblühend. | 200 | 1. Woche |
| 5 ✶ | **Hamburg,** eine sehr schöne **immerblühende Strauchrose** mit sehr großen, in Dolden stehenden, halbgefüllten, feurigscharlachroten Blüten, die sich sehr gut in der Farbe halten. | 120 | 5. Woche |
| 3 ✶ | **Heidemarie (Neuheit 1945!),** eine **immerblühende,** großblumige, einfache, karminrote Polyantha-Hybride mit Strauchrosencharakter, die sich sehr gut als Einzelpflanze macht. | 100 | 5. Woche |
| 6 S | **moyesii** (Hemsl. et Wils.), karminrot, einfachblühend, große glatte, krugförmige Früchte, die im Herbst eine besondere Zierde bilden, starkwachsend. **Einzelpflanzen eignen sich gut als Blütenstrauchersatz. Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 200—300 | 3. Woche |
| 5 | **Parkfeuer** (lutea hybr.) (Lambert.), einfach, karminrot, Laub und Zweige rötlich, starkwüchsig. | 250—350 | 4. Woche |
| 5 ✶ | **Pike's Peak** (acicularis), große schalenförmige, halbgefüllte Blumen von dunkelroter Farbe mit gelber Mitte, **öfterblühend.** | 120 | 5. Woche |
| 5 ✶ | **Ruskin** (rugosa hybr.), blutrot, gefüllt, Blume sehr groß, **duftend,** Wuchs kräftig, **blüht ununterbrochen.** | 200 | 4. Woche |
| 5 ✶ | **Sangerhausen, immerblühende Kletter-** und **Strauchrose.** Die halbgefüllten Blüten haben einen Durchmesser von ca. 12 cm und sind leuchtend feurigrot. Sehr wertvoll! | 150 | 5. Woche |
| 5 ✶ | **Schwerin,** Blume groß, gut gefüllt, in Büscheln blühend, Farbe feurigblutrot. Aufrechter Wuchs, vollkommen winterhart, **remontierend.** | 200 | 5. Woche |
| 5 | **Selfcolored,** ein sehr wertvoller roter Sport von gallica versicolor, **duftend,** große gefüllte Blüten. | 100 | 7. Woche |
| 5 ✶ | **Uetersen,** eine halbgefüllte Hermann Löns von leuchtendroter Farbe. Beim ersten Flor voll mit Blumen bedeckt und später **remontierend.** Sehr wertvoll und fast noch schöner als Paul's Scarlet Climber. | 150 | 5 Woche |

**Ulrich Brunner fils** siehe unter Edelrosen.

| Preis-Gruppe | | Höhe ca. cm | Blütebeginn |
|---|---|---|---|
| 6 ✶ | **Will Scarlet (Neuheit 1952!)**, eine den ganzen Sommer über **unermüdlich blühende** leuchtend blutrote Sorte mit wunderschönen riesigen Blütendolden. **Sehr wertvoll!** | 150—200 | 6. Woche |
| | **Rosa Farbtöne:** | | |
| 5 S | **Sandersonii**, eine vorzügliche Sorte mit großen, einfachen karmesinrosa Blumen, starkwachsend, sehr reichblühend, duftend, gesundes Laub, außerordentlich winterhart. **Einzelpflanzen eignen sich gut als Blütenstrauchersatz. Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 200 | 4. Woche |
| 5 | **Aristide Briand,** Blume violettrosa, edelrosenähnlich, gefüllt, in Dolden unaufhörlich blühend, **schwacher Duft,** auch als Kletterrose zu verwenden. | 150 | 7. Woche |
| 5 | **centifolia muscosa,** altbekannte, schönste Moosrose, Blumen mittelgroß, vollgefüllt, kräftigrosa, sehr reich- und vollblühend. | 100—150 | 6. Woche |
| 5 ✶ | **Conrad Ferdinand Meyer** (rugosa hybr.), bekannte und sehr wertvolle Sorte mit rosafarbigen, **sehr wohlriechenden Blüten.** Strauch starkwachsend u. besonders schön und **remontierend.** | 200 | 3. Woche |
| 5 | **Fritz Nobis (Neuheit 1940!)** (rubigin. hybr.), Blumen groß, halb gefüllt, edelrosengleich, gelblichrosa, sehr reichblühend und **wertvoll.** | 200 | 4. Woche |
| 6 | **Frühlingsmorgen** (spinosissima hybr.), eine sehr gute Sorte mit sehr großen, halbgefüllten, karminrosa Blüten. Sehr reichblühend. | 150—200 | 1. Woche |
| 5 | **Gartendirektor O. Linné,** blüht sehr reichlich in großen breiten Rispen, karminrosa, gefüllt, auf weißem Grund, Pflanze buschig und starkwachsend. | 100 | 7. Woche |
| 5 | **haematodes** (pendulina haematodes, Boiss.), (R. oxyodon haematodes, Arb. Zösch.), Blüten einfach, kräftigrosa. Bildet steil aufrecht wachsende schöne Hecken, die im Herbst durch die Früchte zieren. Früchte haben den höchsten Gehalt an Vitamin C. | 250 | 3. Woche |
| | **Märchenland,** siehe unter Polyantha-Rosen. | | |
| 5 | **Maidens Blush** (alba hybr.), Blumen mittelgroß, gefüllt, fleischfarbigrosa. Pflanze buschig wachsend, reichblühend. Eine sehr wertvolle Sorte. | 150—200 | 5. Woche |
| | **Mrs. John Laing,** siehe unter Edelrosen. | | |
| 6 | **multibracteata** (Hemsl. u. Wils.), neuere ostasiatische Art, dünnzweigig, mit kleinen, 3—4 gefiederten, stumpfgrünen Blättern an dünnen, blaßgrünen Trieben und vielen schöngefärbten Früchten. Blüten hellrosa, Juni-Juli. **Sehr wertvoll!** | 250 | 6. Woche |
| 5 ✶ S | **New Dawn,** eine **öfterblühende** und sehr bekannte, außerordentlich wertvolle Weltrose von zartrosa Farbe, gut gefüllt, sehr winterhart und widerstandsfähig. **Als Einzelpflanze kann man mit ihr sehr schöne Blüteneffekte erzielen. Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 120—150 | 5. Woche |
| 5 ✶ | **pimpinellifolia Stanwell Perpetual,** bis 9 cm breite Blumen, zartrosa, gefüllt, **herrlicher Duft,** eine der wenigen Pimpinellifolia-Sorten, die einen guten **zweiten Blütenflor** hervorbringen. Sehr wertvoll! | 100—150 | 3. Woche |
| 5 ✶ | **Pink Grootendorst** (rugosa hybr.), Blumen gefüllt, reinrosa, nelkenförmig, in Büscheln. Pflanze niedrige Büsche bildend, **öfterblühend.** | 150 | 4. Woche |
| 5 | **rubiginosa magnifica,** karminrosa, halbgefüllt, **duftend,** besonders schön und reichblühend, gute Heckenrose. | 150—200 | 3. Woche |
| 6 ✶ | **Sparrieshoop (Neuheit 1952!), Warenzeichen rechtl. geschützt.** Blumen groß, halbgefüllt, zart rosa, in großen Dolden. **Öfterblühend.** | 150 | 5. Woche |
| | **Gelbe Farbtöne:** | | |
| 5 S | **Austrian Yellow** (lutea hybr.), (Gérard.), eine sehr wertvolle, leuchtend goldgelbe einfach- und frühblühende Sorte. **Einzelpflanzen eignen sich gut als Blütenstrauchersatz. Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 150 | 3. Woche |

| Preis-Gruppe | | Höhe ca. cm | Blütebeginn |
|---|---|---|---|
| 5 | **bicolor atropurpurea** (lutea hybr.), (Jacq.), die einfachen Blüten sind innen braunrot, außen gelb; gibt mit Austrian Yellow zusammen einen guten Farbklang. | 150—200 | 3. Woche |
| 6 S | **Frühlingsgold** (spinosissima hybr.), **eine der besten Sorten dieser Art.** Blume rein goldgelb, einfach, bis 12 cm Durchmesser, außerordentlich reichblühend, bildet ganz hervorragende Büsche. **Einzelpflanzen eignen sich gut als Blütenstrauchersatz. Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 150—200 | 1. Woche |
| 6 S | **Hugonis,** die mittelgroßen, einfachen gelben Blüten erscheinen sehr früh im Mai, sehr reichblühend und von elegantem Wuchs. **Sehr wertvoll. Einzelpflanzen eignen sich gut als Blütenstrauchersatz. Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 150—200 | 1. Woche |

### Weiße Farbtöne:

**Frau Karl Druschki** siehe unter Edelrosen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 ✶ | **Herrenhausen, immerblühende** Kletter- und Strauchrose. Die ca. 6 cm Durchmesser große, vollgefüllte Blume ist reinweiß und schimmert leicht grünlich. | 100 | 6. Woche |
| 5 ✶ | **Morning Star (Neuheit 1949!),** Blumen groß, edelrosengleich, gefüllt, lange haltbar, zu mehreren oder in Büscheln blühend, **fein duftend.** Eine gelb-weiße, **öfterblühende,** sehr empfehlenswerte New Dawn. | 100 | 5. Woche |
| 6 S | **omeiensis pteracantha** (Rehd. et Wils), (R. serica pterac. Franch.), mit breiten, in der Jugend feurigrot durchscheinenden Stacheln und sehr dekorativer, farnähnlich gefiederter Belaubung. **Freistehend lassen sich mit dieser Sorte schöne Effekte erzielen.** Blüten einfach, weiß, Früchte rot. Einzelpflanzen eignen sich gut als Blütenstrauchersatz. **Vorrätig als Solitär 3 × v.** Preise siehe unter Rosen (Laubgehölze). | 200—300 | 1. Woche |
| 5 | **pimpinellifolia altaica,** große, einfache, weiße Blumen. | 100—150 | 3. Woche |

**Schneeschirm,** siehe unter Polyantha-Rosen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 ✶ | **Weiße Eva** (Lamb.), ein **öfter blühender, weißer,** halbgefüllter Sport von Eva, der sehr reichblühend ist. | 150 | 6. Woche |
| 6 | **White Whings, Neueinführung aus Amerika!** Eine mittelstarkwachsende, leicht überhängende Sorte mit bis 12 cm großen, einfachen, alabasterweißen Blüten, auf denen sich die langen, scharlachroten Staubgefäße dekorativ abheben. | 100 | 4. Woche |

# E. Kletterrosen (Rank- oder Schlingrosen)

**Lambertianarosen siehe unter Strauchrosen.**

**Für Lauben und Pergolen, Säulen, Bögen, Mauern, alte Bäume, Böschungen und Teichränder bieten Kletterrosen vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.**

*Alle öfter blühenden (remontierenden) Sorten sind durch einen ✶ gekennzeichnet.*

**Zeichenerklärung:** H, Tr, als Hoch- und Trauerstamm vorhanden.
Besonders wertvolle und empfehlenswerte Sorten sind unterstrichen.

**Auswahl der z. Zt. besten Sorten!**

### Rote Farbtöne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | **Climbing Orange Triumph,** eine stark gefüllte, orangescharlachrote, reich- und spätblühende Sorte mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, widerstandsfähig. | | |
| 4 | **Crimson Conquest,** sammetartig scharlach, karmesinrot, in großen Dolden blühend, Einzelblume sehr groß, der Wuchs dieser wertvollen Sorte ist sehr stark. | | |
| 4 | **Excelsa,** eine sehr wertvolle, kleinblumige und besonders frostharte Kletterrose mit leuchtenden, gut gefüllten, scharlachroten Blüten, die sehr haltbar sind. Pflanze sehr starkwachsend, mit schöner, gesunder Belaubung. | | Tr |
| 5 ✶ | **Guinée,** Blumen **duftend,** gefüllt, edelrosenähnlich. **Öfter blühend.** | | |
| 4 | **June Morn,** stark kletternde, reichblühende Sorte. Blumen edelrosengleich, besonders groß, vollkommen gefüllt, lange haltbar und stark **duftend.** Die Farbe der Blumenblätter ist außen leuchtendgoldgelb und innen leuchtendblutrot. | | |

Preis-
Gruppe

4 ✶ **Paul's Scarlet Climber,** eine **schwachremontierende,** halbgefüllte, großblumige, besonders krankheits- und kälteresistente dunkelrote Sorte von langer Blütendauer. Auch als Strauchrose zu verwenden. Tr

4 **Royal Scarlet Hybrid,** Einzelblume sehr groß, feurig scharlachrot, halbgefüllt in Dolden. Pflanze sehr reich- und unermüdlich blühend.

## Rosa Farbtöne:

4 **American Pillar,** eine vorzügliche Sorte mit leuchtend karminrosa Blüten mit weißer Mitte, Blume einfach, in großen Rispen stehend. Pflanze starkwüchsig, winterhart und reichblühend. **Eine der besten Kletterrosen.**

4 **Chaplin's Pink Climber,** die leuchtend reinrosa Blüten sind halb gefüllt, sehr groß und **ungewöhnlich lange haltbar.** Pflanze enorm stark wachsend, reichblühend, hart, gesund im Laub. Eine der besten rosa Kletterrosen.

4 **Climbing American Beauty,** zinnoberrosa, starkwachsend, **schwach duftend.** Tr

5 ✶ **Climbing Gruß an Aachen,** Blume groß, vollgefüllt, rosigweiß, Pflanze starkwüchsig, hart und **öfter blühend.**

4 **Dorothy Perkins,** eine weltbekannte und sehr wertvolle, kleinblumige und spätblühende zartrosa Sorte, deren gut gefüllte Blüten in großen Rispen hängen, sehr reichblühend. Die Pflanze wächst stark und hat sehr gesundes, glänzendes Laub.

4 **Düsterlohe,** dunkelrosa, Blüten groß, einfach in Büscheln, starkwachsend.

4 ✶ **Gerberose,** eine wertvolle großblumige, halbgefüllte und **schwach remontierende,** rosafarbene Kletterrose mit edelrosenähnlichen Einzelblumen, kräftigem Wuchs und gesunder, glänzendgrüner Belaubung.

4 **Mme. Sancy de Parabère,** Blumen groß, gefüllt, leuchtend rosa, gut duftend, blüht als erste, vollkommen winterhart, verträgt noch leichten Schatten. Diese ganz glattholzige Sorte läßt sich auch gut als Strauchrose verwenden.

4 **Mary Wallace,** eine sehr wertvolle Sorte mit großen, edelrosenähnlichen, gut gefüllten leuchtend-silbrigrosa Blüten. Pflanze blüht sehr reich u. voll. Tr

**New Dawn,** siehe unter Strauchrosen.

4 **Tausendschön,** zartrosa, Blume mittelgroß, in großen, lockeren Sträußen blühend, eine bekannte und sehr empfehlenswerte Kletterrose! Tr

4 **Venusta pendula,** Blüten in Dolden, rosigweiß, Pflanze reichblühend, starkwüchsig und frosthart. Außerordentlich winterhart, voll- und reichblühend. Sehr wertvoll!

## Gelbe Farbtöne:

4 **Elegance,** eine vorzügliche, reingelbe, edelrosenähnliche und gefüllte Sorte. Pflanze starkwüchsig, eine der schönsten gelben Kletterrosen, die auch zum Blumenschnitt verwendet werden kann. Tr

4 **Glenn Dale,** zitronenfarbig, in hellgelb übergehend. Die schön duftende Blume ähnelt einer edelgeformten Teehybride, ist gut gefüllt. Blüht sehr dankbar in großen Dolden, winterhart. Sehr wertvoll!

5 ✶ **Gloire de Dijon,** Blumen enorm groß, vollgefüllt, stark duftend, von schöner goldgelber Farbe. Die Blüten dieser **schwach remontierenden** und starkwachsenden Sorte sind von langer Haltbarkeit.

4 **Golden Climber,** Blume goldgelb, edelrosenähnlich, **von herrlichem Duft,** sie steht meistens einzeln auf sehr langem Stiel. Die Pflanze klettert enorm stark, ist widerstandsfähig gegen Kälte und Krankheiten. Tr

4 **Golden Glow,** goldgelb, gefüllt, edelrosenähnlich, **eine der schönsten gelben Kletterrosen.** Blüten in Büscheln, ungewöhnlich reich- und vollblühend, starkwüchsig, mit schöner Belaubung.

4 **Le Rêve,** Blumen groß, edelrosenähnlich, gut gefüllt, haltbar, leuchtend gelb. Pflanze sehr stark wachsend, hart, sehr reich- und vollblühend. Diese vorzügliche Sorte blüht oft im Herbst zum zweiten Male und setzt gelbe, birnenförmige Früchte an.

6 **Maréchal Niel,** Blume sehr groß, becherförmig, von unübertroffener Formschönheit, Blütenfarbe goldgelb, **wohlriechend.** H

## Weiße Farbtöne:

4 ✶ **Direktor Benschop,** eine der besten **schwach remontierenden** Rank- und Buschrosen, deren Knospe vor dem Aufblühen gelblichweiß erscheint und erst beim Aufblühen in reinweiß übergeht. Die Blüten sind groß und sitzen in Büscheln zusammen, sind halbgefüllt und sehr lange haltbar. Ist sowohl als Trauerrose, als auch wegen ihres breiten Wuchses gut als Buschrose zu verwenden.

4 **Gneisenau,** eine vorzügliche, spätblühende, schneeweiße und außerordentlich reichblühende Sorte.




# Laubgehölze

**Zier- und Nutzgehölze für Park- und Gartenanlagen in 3—5jähriger kräftiger Ware mehrmals verpflanzt aus weitem Stand.**

## Allee-, Solitär- und Zierbäume

Die als „im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt, aus extra weitem Stand" bezeichneten Bäume sind in fertigem Zustande in besonders weitem Stand verschult. Dadurch ist ein **sicheres Anwachsen gewährleistet.** Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bei einem Stammumfang | von 7—8 cm | beträgt die Stammhöhe | ca. 180 cm |
| | bei 8—12 cm | beträgt die Stammhöhe | ca. 200 cm |
| | bei 12—18 cm | beträgt die Stammhöhe | ca. 240 cm |
| | bei üb. 18 cm | beträgt die Stammhöhe | 240-300 cm |

Auf besonderen Wunsch können auch Bäume mit höheren oder niedrigeren Stämmen geliefert werden. Besonders möchten wir hervorheben, daß wir **für Straßenpflanzungen auch alle Alleebäume mit übernormaler Stammhöhe bis ca. 3 m liefern können.**

## Heckenpflanzen

Die für Hecken geeigneten Pflanzen sind durch ein **H** kenntlich gemacht. Unsere Heckenpflanzen ziehen wir auf einem hochgelegenen, milden und **leicht humosen Lehmboden.** Zum Aufpflanzen der jungen Quartiere werden nur besonders vorkultivierte Pflanzen verwendet.

Durch kurzen Rückschnitt erreichen wir, daß die jungen Pflanzen von unten auf eine dichte Verzweigung erhalten. Durch einen **reichlich bemessenen Reihenabstand** (70 cm) kann sich jede Pflanze frei entwickeln. **Auf Grund dieser Kulturmethoden können wir für ein freudiges Weiterwachsen dieser Pflanzen garantieren.**

## Solitär- und Windschutzgehölze (Bodenschutzgehölze)

Alle von uns zum Verkauf angebotenen Einzelexemplare sind in Abständen von 2—3 Jahren regelmäßig verpflanzt und bieten damit gleichfalls die Gewähr für ein gutes Weiterwachsen. Mit Ausnahme von ungewöhnlichen Witterungsfaktoren, wie plötzliche, überdurchschnittliche Hitze oder ungewöhnlich starke Fröste, übernehmen wir bei sachgemäßer Behandlung und Pflege der großen Solitärpflanzen **volle Garantie für das Anwachsen.** Bei Ersatzlieferungen werden lediglich die zusätzlichen Transport- und Verpackungskosten in Rechnung gestellt. In diesem Zusammenhang möchten wir noch darauf hinweisen, daß erfahrungsgemäß in der Zeit nach Johanni bei größeren Einzelpflanzen ein besonders großer Wasserbedarf eintritt, wie dies in hohem Maße bei großen Buchen beobachtet werden kann. **(Am Schluß des Kataloges finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Windschutzgehölze.)**

**Die Größenmaße bei den Ziergehölzen sind nicht als bindend zu betrachten. Sie können im geringen Maße nach unten oder oben abgewandelt werden.**

**Zeichenerklärung:**

B = Bienennährpflanze
e = für niedrige Einfassungen
E = für Einzelpflanzen geeignet
F = Gehölz mit besonders schönen Früchten
H = Heckenpflanzen
I = Immergrüne
L = Gehölze mit besonders schönen Laub- und Herbstfärbungen
R = Rauchharte Gehölze, besonders für Industriegegenden
S = Pflanzen für Schatten- und Unterpflanzung
St = Steingartenpflanze
W = Winterschutz verlangend

**Hinweise zur Nomenklatur!**

**Zum Unterschied von den bisher gebräuchlichen Synonyma sind die jeweils nomenklaturmäßig gültigen Gattungs- und Arten-Namen im Katalog unterstrichen.**

# In Sorten unserer Wahl:

| | | |
|---|---|---|
| 1. **Vor-, Zier- und Decksträucher** bis zur Preislage von DM 80,— | per 100 Stück DM | 48,50 |
| 2. **Vor-, Zier- und Decksträucher** bis zur Preislage von DM 120,— | per 100 Stück DM | 67,50 |
| 3. **Baumartige Gehölze und Heister,** 200—300 cm hoch | per 100 Stück DM | 112,— |

# Nach Wahl des Bestellers:

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Acanthopanax** (Miq.) - Stachelkraftwurz - ARALIACEAE | | | | |
| **sieboldianus** (Mak.), (A. pentaphyllus, March.) **H** | | | | |
| Japan, bis 3 m hoher Strauch mit bogig abstehenden, stacheligen Zweigen und glänzend grüner, fünfteiliger Belaubung. . . . . | 80—125 | 1,90 | 17,— | |
| **Acer** (L.) - Ahorn - ACERACEAE | | | | |
| **campestre** (L.), **Feldahorn** **H, R** | | | | |
| Sehr gute, heimische, schattenvertragende Heckenpflanze, die einen kalkigen Boden bevorzugt, auch sehr als **kleinkroniger Straßenbaum** zu empfehlen. | 80—100 | 0,85 | 7,50 | 64,— |
| | 100—125 | 1,10 | 9,75 | 86,— |
| | 125—150 | 1,35 | 12,— | 112,— |
| **Heckenpflanzen,** mehrmals verpflanzt und regelmäßig geschnitten, aus weitem Stand | 150—175 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 175—200 | 2,35 | 20,— | 180,— |
| **Heister** und **Büsche** mit natürlicher seitl. Bezweigung | 80—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 100—125 | 0,85 | 8,25 | 75,— |
| | 125—150 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt, mit Ballen | 300—350 | 18,— | | |
| Breite 150—250 cm, Stammumfang 8—12 cm | 350—400 | 25,— | | |
| Breite 250—350 cm, Stammumfang 18—25 cm | 300—400 | 45,— | | |
| 25—35 cm | | 60,— | | |
| 20—30 cm | 400—500 | 68,— | | |
| 30—40 cm | | 75,— | | |
| Breite 200—300 cm, Stammumfang 25—35 cm | 600—700 | 75,— | | |
| **Solitärstammbüsche,** 100—150 cm breit und 350—400 cm hoch und **Hochstämme** 3 × verpflanzt. Auf Wunsch mit Ballen + 25 % Stammumfang | 8—10 | 8,25 | 75,— | |
| | 10—12 | 10,— | 90,— | |
| | 12—14 | 13,50 | 120,— | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 200—250 cm, Kronendurchm. 200—300 cm, Kronenhöhe 250—350 cm. Auf Wunsch mit Ballen. Preis auf Anfrage. Stammumfang | 18—20 | 34,— | | |
| | 20—25 | 45,— | | |
| | 25—30 | 60,— | | |
| **cappadocicum rubrum,** siehe A. laetum rubrum | | | | |
| **dasycarpum,** siehe A. saccharinum | | | | |
| **ginnala** (Maxim.) **L, R** | | | | |
| China, Japan, mehr strauch- als baumartiges, bis 6 m hoch werdendes Gehölz mit stark ausgezackten Blättern und besonders schöner, leuchtendroter Herbstfärbung. | 80—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 125—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpfl. 100—150 cm breit. Mit Ballen | 150—200 | 6,40 | | |
| | 200—250 | 9,— | | |
| | 250—300 | 13,50 | | |

| Acer (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **japonicum aconitifolia** (Mech.), (A. j. parsonii, Veitch; A. j. filicifolium, Hesse; A. j. laciniatum, Vanh.) **E, L, St** | | | | |
| Wohl die schönste japanische Art, mit großen, handtellerförmigen, tief geschlitzten, rötlich braunen Blättern, die sich im Herbst wundervoll scharlach färben, Blüte im April an ca. 7 cm langen Stielen hängend. Wuchs schirmartig. Mit Ballen | 60—80 | 15,— | | |
| „ **osakazuki** (Hort.) **E, L, St** | | | | |
| Bis 3 m hoher, sehr winterharter Baum mit grünem, gespreiztem Laub und sehr schöner, hochroter Herbstfärbung. | | | | |
| Solitär, 4 × verpflanzt. 300—350 cm breit. Mit Ballen | 225—250 | 225,— | | |
| **laetum rubrum** (Rupr.), (A. cappadocicum rubrum, Nash.) **L** | | | | |
| Kaukasus, mittelhoher Baum, mit glänzenden schwarzgrünen Blättern, die im Austrieb lebhaft feurigrot sind. Benötigt einen nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden. | 100—150 | 2,25 | | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. 80—125 cm breit. Mit Ballen | 150—200 | 6,40 | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande z. 3. × verpflanzt Stammumfang | 10—12 | 8,— | | |
| | 12—14 | 10,— | | |
| | 14—16 | 13,50 | | |
| | 16—18 | 14,50 | | |
| **negundo** (L.) **L, R** | | | | |
| Nordamerika, breitkroniger oft mehrstämmiger, bis 25 m hoch werdender Baum mit grün gefiederten, gesunden Blättern, die zum Herbst goldgelb gefärbt sind. Hat sich in unseren Städten als **unempfindlich gegen Rauch und Staub** erwiesen. | 125—150 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 150—200 | 0,85 | 8,25 | 75,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| **Hochstämme** und **Stammbüsche,** 250—350 cm hoch Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | |
| „ **argenteo variegatum** (Bonamy) **L** | | | | |
| Zierliche, weißbunte Belaubung. | | | | |
| **Büsche,** 3 × verpflanzt | 125—150 | 3,75 | 34,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 3,75 | 34,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 175—200 | 5,25 | 47,— | |
| „ **auratum,** siehe A. neg. odessanum | | | | |
| „ **aureo-variegatum** (Wesm.) **L** | | | | |
| Eine Verbesserung von A. neg. fol. aureo-marginatum, mit schöner, gesunder, goldbunter Belaubung. | | | | |
| **Büsche,** 3 × verpflanzt | 125—150 | 3,75 | 34,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 3,75 | 34,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 175—200 | 5,25 | 47,— | |
| „ **odessanum** (Rothe), (A. neg. auratum, Schwer) **L** | | | | |
| Gelbliches Blatt, austreibende Blätter rötlich überlaufen. | | | | |
| **Büsche,** 3 × verpflanzt | 100—150 | 3,75 | 34,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 3,75 | 34,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 175—200 | 5,25 | 47,— | |
| **palmatum atropurpureum** (Nichols.), **rotblättriger Fächerahorn** **E, L, St** | 50—60 | 6,— | | |
| | 60—80 | 7,50 | | |
| Japan, mittelgroßer Strauch mit tiefroter Belaubung. | 80—100 | 9,— | | |
| Mit Ballen | 100—120 | 12,— | | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. Breite 60—80 cm | 100—125 | 15,— | | |
| 80—100 cm | 100—125 | 18,— | | |
| | 125—150 | 22,50 | | |
| „ **dissectum** (Thunb.), **Japanischer Schlitzahorn E, L, R, St** | 40—50 | 12,— | | |
| Mit grüner, zierlich zerschlitzter Belaubung. Mit Ballen | 50—60 | 15,— | | |
| Solitär, 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Breite 100—125 cm | 80—100 | 75,— | | |
| | 100—125 | 83,— | | |
| | 125—150 | 100,— | | |
| Breite 125—150 cm | 60—80 | 94,— | | |
| 150—175 cm | 60—80 | 120,— | | |
| „ „ **atropurpureum** (Hort.), (A. palm. ornat., Schwer.) **E, L, R, St** | | | | |
| Eine besonders graziös wachsende Sorte mit zierlicher, feingeschlitzter, intensiv roter Belaubung. Mit Ballen | 40—50 | 12,— | | |
| Solitär, 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Breite 175—200 cm | 175—200 | 180,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Acer palmatum dissectum** (Fortsetzung) | | | | |
| „ „ **rubrifolium** (Hort.) **E, L, R, St** | | | | |
| Unterscheidet sich von A. palm. diss. atropurp. nur durch seine weniger intensiv rote Belaubung. | 40—50 | 12,— | | |
| Mit Ballen | 50—60 | 15,— | | |
| „ **septemlobum purpureum** (Schwer.), (A. palm. rubrum, Schwer.) **E, L, St** | | | | |
| Blätter groß, im Austrieb rot, später dunkelgrün. Mit Ballen | 60—70 | 12,50 | | |
| **platanoides** (L.), **Spitzahorn** **B, L, R** | | | | |
| Europa, Kaukasus, bis 30 m hoch werdender heimischer Straßen- und Parkbaum, der selbst noch in trockenen Lagen gut gedeiht. Herbstfärbung hellgelb. | 125—150 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Stammbüsche,** bis unten beästet, ca. 60 cm breit und 250—300 cm hoch Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 10—12 | 6,20 | 56,— | 505,— |
| | 12—14 | 7,50 | 67,50 | 600,— |
| | 14—16 | 9,— | 81,— | 675,— |
| | 16—18 | 10,50 | 94,— | |
| | 18—20 | 12,50 | | |
| | 20—25 | 18,50 | | |
| „ **drummondii** (Drumm.) **L** | | | | |
| Austrieb rosarot, Blätter später graugrün, schön beständig weiß gerandet. | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| | 250—300 | 4,— | 36,— | 330,— |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 8—10 | 8,— | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| „ **globosum** (Nichols.), **Kugelspitzahorn** **R** | | | | |
| Dieser **kleinkronige Alleebaum** bildet ohne Schnitt regelmäßige Kugel- oder Kegelkronen, je nachdem, ob der Mitteltrieb eingekürzt wird, oder stehen bleibt. **Verträgt vorzüglich die heiße Stadtluft.** | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 20—25 | 25,— | | |
| „ **reitenbachii** (Nichols.), (A. plat. rubrum, Herd.) **B, L** | | | | |
| Blätter beim ersten und zweiten Austrieb blutrot bis bräunlich purpurn, wobei der zweite Austrieb der schönste ist. Färbt sich im Spätsommer schwarzrot. | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| | 250—300 | 4,— | 36,— | 330,— |
| **Parkbäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 8—10 | 8,— | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| | 12—14 | 12,50 | | |
| | 14—16 | 15,— | | |
| „ **rubrum,** siehe A. plat. reitenbachii | | | | |
| „ **schwedleri** (K. Koch) **L** | | | | |
| Austrieb blutrot, Blätter später dunkel rotgrün, Blattstiel und Nerven rotbleibend. | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| | 250—300 | 4,— | 36,— | 330,— |
| **Parkbäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 8—10 | 8,— | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| | 12—14 | 12,50 | | |
| | 14—16 | 15,— | | |
| | 16—18 | 19,— | | |
| | 18—20 | 25,— | | |
| | 20—25 | 33,— | | |
| | 25—30 | 46,— | | |
| **pseudoplatanus** (L.), **Bergahorn** **B, R** | | | | |
| Europa, Asien, schönster heimischer, bis 40 m hoch werdender, breitkroniger Alleebaum für Hoch- und Tiefland. | 125—150 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Acer pseudoplatanus** (Fortsetzung) | | | | |
| **Stammbüsche,** bis unten beästet, ca. 60 cm breit und 250—350 cm hoch Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 12—14 | 7,50 | 67,50 | 600,— |
| | 14—16 | 9,— | 81,— | |
| | 16—18 | 10,50 | | |
| | 18—20 | 12,50 | | |
| | 20—25 | 18,50 | | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 200—225 cm, Kronendurchm. 125—150 cm, Kronenhöhe 250—300 cm Stammumfang | 14—16 | 13,50 | | |
| | 16—18 | 16,— | | |
| | 18—20 | 19,— | | |
| Kronendurchm. 200—250 cm, Kronenhöhe 250—300 cm Stammumfang | 20—25 | 28,— | | |
| „ **leopoldii** (Schwer.) **L** | | | | |
| Austrieb kupfrig-gelb, später weißlich und rosa gescheckt. | 125—150 | 2,— | 18,50 | |
| | 150—200 | 2,70 | 25,— | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 3,30 | 30,— | |
| | 250—300 | 4,— | 36,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe ca. 225 cm, Kronendurchmesser 200 cm, Kronenhöhe 250—300 cm Stammumfang | 20—25 | 37,50 | | |
| **saccharinum** (L.), (A. dasycarp., Ehrh.), **Silberahorn B, L, R** | | | | |
| Nordamerika, bis 35 m hoher, besonders **industriefester, malerisch wachsender Baum** mit zierlichen, spitzgelappten, unterseits silbergrauen Blättern, Herbstfärbung glänzend gelb. | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,— | 18,50 | 169,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Mehrstämmige Büsche** mit 3—4 Grundtrieben . . | 150—200 | 3,— | 27,— | |
| | 200—250 | 3,75 | 34,— | |
| | 250—300 | 4,50 | 40,— | |
| mit 5—8 Grundtrieben . . | 150—200 | 4,10 | 37,50 | |
| | 200—250 | 5,40 | 49,— | |
| | 250—300 | 6,60 | 60,— | |
| | 300—350 | 8,25 | | |
| **Stammbüsche,** 60—80 cm breit und 250—350 cm hoch Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 49,50 | |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 49,50 | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 12—14 | 10,— | | |
| | 14—16 | 13,50 | | |
| | 16—18 | 14,50 | | |
| | 18—20 | 19,— | | |
| | 20—25 | 25,— | | |
| | 25—30 | 33,— | | |
| „ **wieri** (Pax.) **E, L, R** | | | | |
| Einer unserer **schönsten Parkbäume für Einzelstellung** in windgeschützten Lagen, mit geschlitzten Blättern und graziös herunterhängenden dünnen Zweigen. | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Heister,** natürlich beästet | 250—300 | 4,— | 36,— | 330,— |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt. 175—300 cm breit. Auf Wunsch mit Ballen + 25 % | 200—250 | 6,75 | | |
| | 250—300 | 11,50 | | |
| | 300—350 | 18,— | | |
| | 350—400 | 27,— | | |
| | 400—450 | 36,— | | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpfl. Auf Wunsch m. Ball. + 25 % Kronendurchm. 150—200 cm, Kronenhöhe 400—500 cm Stammumfang | 18—20 | 45,— | | |
| Kronendurchm. 200—250 cm, Kronenhöhe 500—600 cm Stammumfang | 20—25 | 60,— | | |
| Kronendurchm. 250—400 cm, Kronenhöhe 700—800 cm Stammumfang | 30—35 | 90,— | | |
| Auf Wunsch mit Ballen, Preis auf Anfrage | 40—45 | 180,— | | |

**Actinidia,** siehe unter Schlingpflanzen

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Aesculus** (L.) - Roßkastanie - HIPPOCASTANACEAE | | | | |
| **carnea** (Hayne), (A. rubicunda, Loisel), (A. hippoc. x pavia) **B** | | | | |
| Diese rotblühende Roßkastanie bildet mit ihren dunkelgrünen, glänzenden Blättern breite und **abgeflachte mittelgroße Kronen und setzt wenig Früchte an.** | 8—10 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 10—12 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | 825,— |
| **Alleebäume** mit 2jährigen Kronen Stammumfang | 14—16 | 13,— | 118,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 200—250 cm, Kronendurchm. 400—500 cm, Kronenhöhe 350—450 cm Stammumfang | 40—50 | 190,— | | |
| | 50—60 | 265,— | | |
| | 60—70 | 375,— | | |
| Auf Wunsch mit Ballen, Preis auf Anfrage | 70—80 | 450,— | | |
| „ **briotii** (Nichols.) **B** | | | | |
| Form mit auffallend langen und besonders leuchtend blutroten Blüten, wohl die schönste unter den rotblühenden Kastanien. | 8—10 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 10—12 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | 825,— |
| **Alleebäume** mit 2jährigen Kronen Stammumfang | 14—16 | 13,— | | |
| **hippocastanum** (L.), **Roßkastanie** **B, E** | | | | |
| Bis über 30 m hoher, schattenverträglicher und schattenspendender Park- und Alleebaum. Erlangt seine volle symmetrische Schönheit nur als völlig freistehendes Exemplar. | 150—200 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 250—300 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 10—12 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 14—16 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 16—18 | 10,— | 90,— | 825,— |
| | 18—20 | 13,— | 118,— | 1050,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 16—18 | 12,50 | 112,— | 1000,— |
| | 18—20 | 16,50 | 150,— | 1350,— |
| | 20—25 | 23,— | 210,— | 1875,— |
| | 25—30 | 29,— | 255,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 200—250 cm, Kronendurchm. 150—200 cm, Kronenhöhe 250—300 cm Stammumfang | 18—20 | 25,— | | |
| | 20—25 | 34,— | | |
| | 25—30 | 45,— | | |
| Auf Wunsch mit Ballen, Preis auf Anfrage | | | | |
| Kronendurchm. ca. 300 cm, Kronenhöhe 400—600 cm Auf Wunsch mit Ballen, Preis auf Anfrage Stammumfang | 35—40 | 112,— | | |
| | 40—45 | 130,— | | |
| | 45—50 | 150,— | | |
| Kronendurchm. 400—600 cm, Kronenhöhe 400—600 cm Auf Wunsch mit Ballen, Preis auf Anfrage Stammumfang | 50—60 | 205,— | | |
| | 60—70 | 300,— | | |
| | 70—80 | 375,— | | |
| „ **baumannii,** siehe A. hipp. plena | | | | |
| „ **plena** (Lem.), (A. hipp. baumannii, C. Schnd.), **gefüllt-blühende Roßkastanie** **L** | | | | |
| Bildet regelmäßige, pyramidenförmige Kronen, hat eine längere Blühdauer und **setzt keine Früchte an,** eignet sich deswegen besonders für Verkehrsstraßen. | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| **Alleebäume** mit 1—2jährigen Kronen. Stammumfang | 14—16 | 10,— | 90,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 200—225 cm, Kronendurchm. 400—500 cm, Kronenhöhe 500—600 cm Auf Wunsch mit Ballen, Preis auf Anfrage Stammumfang | 70—80 | 450,— | | |
| **macrostachya,** siehe A. parviflora | | | | |
| **parviflora** (Walt.), (A. macrostachya, Mchx.) **B, E** | | | | |
| Nordamerika, mittelhoher, baumartiger, bis 4 m hoch werdender, reichblühender, breiter Strauch mit interessanten weißen Blütenrispen im Juli bis August. **Hervorragend für Einzelstellung.** eintriebig | 60—80 | 3,40 | 30,— | |
| 3 × verpflanzt ab 2 Trieben | 60—80 | 4,50 | | |
| **pavia nana** (Dipp.), (A. pavia humilis, Mouillef.) **E** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, niedriger, dem Boden fest aufliegender Strauch mit lockeren, hellroten 10—12 cm langen Rispen, Ende Mai—Juni. **Als freistehendes Exemplar auf Rasenflächen sehr zu empfehlen.** 3 × verpflanzt | 60—80 | 4,50 | | |
| **rubicunda,** siehe A. carnea | | | | |
| **Akebia,** siehe unter Schlingpflanzen | | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Ailantus** (Desf.) - Götterbaum - SIMARUBACEAE | | | | |
| **altissima** (Swingle.), (A. glandulosa, Desf.) **B, R** | | | | |
| China, bis 25 m hoher, stattlicher, sparrig verzweigter und dekorativ belaubter Parkbaum mit 50—60 cm langen Fiederblättern, Blüten grünlich in großen Rispen, später zahlreiche, rötliche Fruchtstände. **Dieser Baum sollte wegen seiner dekorativen, gesunden, großen Fiederblätter weit häufiger gepflanzt werden.** **Heister,** natürlich beästet | 125—150 | 1,15 | 10,— | |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt, mehrtriebig. Mit großem Wurzelwerk, feucht verpackt | 150—200 | 3,40 | 30,— | |
| | 200—250 | 4,20 | 37,50 | |
| | 250—300 | 5,80 | 52,50 | |
| | 300—350 | 8,25 | 75,— | |
| | 350—400 | 12,— | | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 150—200 cm. Mit großem Wurzelwerk, feucht verpackt Stammumfang | 12—14 | 9,— | 81,— | |
| | 14—16 | 12,— | | |
| | 16—18 | 15,— | | |
| | 18—20 | 19,— | | |
| | 20—25 | 26,— | | |
| **glandulosa,** siehe A. altissima | | | | |
| **Alnus** (Gaertn.) - Erle - Eller - CORYLACEAE | | | | |
| **glutinosa** (Gaertn.), **Schwarzerle, Roterle** **B, R, S** | | | | |
| Europa, Asien, bis 30 m hoher, im Alter malerischer Baum für feuchte Böden, in Bruchlandschaften mit nährstoffreichem, aber kalkarmem Bodenwasser. Kommt wegen seines starken Wurzelgeflechtes jedoch auch in trockenen Lagen durch und bildet hier **durch sein leicht verrottendes Laub schnell Humus. Treibt nach starkem Rückschnitt gut wieder durch.** Eignet sich besonders für **Windschutz-, Halden- und Wasserlaufpflanzung.** | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 125—150 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 200—250 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 250—300 | 1,45 | 13,— | 112,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 10—12 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 12—14 | 4,20 | | |
| | 14—16 | 4,50 | | |
| **Stammbüsche,** 150—200 cm breit und 350—400 cm hoch Stammumfang | 12—14 | 5,— | | |
| | 14—16 | 6,— | | |
| **incana** (Moench.), **Weißerle, Grauerle** **B, R, S** | | | | |
| Nördl. Halbkugel, bildet bis 25 m hohe Bäume mit glatter hellgrauer Borke. Ist im Gegensatz zu A. glutinosa **mehr für trockene Böden geeignet.** Stickstoffsammelnd, stark ausläufertreibend und sehr **gut für Haldenbepflanzung geeignet.** | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 125—150 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 200—250 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 250—300 | 1,45 | 13,— | 112,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 2,50 | 22,50 | |
| | 10—12 | 3,— | 27,— | |
| **Stammbüsche,** 150—250 cm breit und 400—600 cm hoch Stammumfang | 16—18 | 7,50 | | |
| | 18—20 | 9,— | | |
| | 20—25 | 12,— | | |
| | 25—30 | 15,— | | |
| „ **aurea** (Dipp.) **B, F, L** | | | | |
| Blätter im Austrieb schön gelb. Im Winter fallen die dunkelgelbe Zweigrinde und die **karminroten männlichen Kätzchen** sehr angenehm auf. | 150—200 | 2,— | | |
| | 200—250 | 3,— | | |
| **Solitärstammbüsche,** 3 × verpflanzt. 125—150 cm breit 250—300 cm hoch. Stammumfang | 10—12 | 7,50 | | |
| 300—350 cm hoch. Stammumfang | 12—14 | 9,— | | |
| 350—400 cm hoch. Stammumfang | 14—16 | 10,50 | | |
| Auf Wunsch mit Ballen + 25 % | | | | |
| **Amelanchier** (Med.) - Felsenbirne - ROSACEAE | | | | |
| **asiatica** (S. & Z.) **B, E, L, R, S** | | | | |
| Japan, Korea, wird bei uns bis 9 m hoch, zeichnet sich durch **schönen Habitus, Blütenreichtum und rötlich-orange Herbstfärbung** aus. Blüten sternförmig, rahmweiß, mit rotbraunen, anmutig überhängenden Zweigen. **Wertvoller Einzelstrauch.** 3 × verpflanzt | 80—125 | 3,40 | | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Amelanchier** (Fortsetzung) | | | | |
| **canadensis** (Med.) **B, E, F, L, R, S** | | | | |
| Östl. Nordamerika, bis 8 m hoch werdender, mehrtriebiger, aufrechtwachsender Strauch. Blüten sehr groß, in zierlich hängenden, vielblumigen Trauben. Die vielen weißen Blüten bilden zu den jungen rötlichen Triebspitzen einen schönen Kontrast. Früchte rot und wohlschmeckend. Die **lebhaft orangescharlachfarbene Herbstfärbung ist von ganz besonderer Schönheit.** Einer unserer **wertvollsten Blütensträucher** überhaupt. **Sehr gut für Einzelstellung geeignet.** | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 80—125 | 1,40 | 12,— | 108,— |
| 3 × verpflanzt, vieltriebig | 60—80 | 1,50 | 13,50 | |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt, mit Ballen. Auf Wunsch ohne Ballen — 20 % mit 2—4 Grundtrieben | 125—150 | 4,20 | 37,50 | |
| | 150—200 | 5,— | 45,— | |
| | 200—250 | 5,80 | 52,50 | |
| | 250—300 | 6,75 | 60,— | |
| mit 5—8 Grundtrieben | 125—150 | 6,— | 54,— | |
| | 150—200 | 6,60 | 60,— | |
| | 200—250 | 10,— | 90,— | |
| | 250—300 | 13,50 | 120,— | |
| mit 8—15 Grundtrieben | 200—250 | 15,— | 135,— | |
| | 250—300 | 19,— | 170,— | |
| | 300—350 | 22,50 | 200,— | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 8—10 | 7,50 | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| | 12—14 | 12,50 | | |
| | 14—16 | 15,— | | |
| **laevis** (Wieg.) **B, E, F, L, R, S** | | | | |
| Nordamerika, bis 4 m hoher Baum mit abstehenden Zweigen und zierlichem Wuchs, **im Austrieb rötlich.** Blüten weiß, sehr groß, in lockeren, vielblumigen, kahlen, hängenden Trauben Mitte Mai. . . . . | 80—125 | 3,40 | 30,— | |
| **Solitärbüsche,** 4 × verpfl. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 150—200 | 18,— | | |
| 200—250 cm breit | 300—350 | 34,— | | |
| **ovalis** (Med.), (A. rotundifolia, Dum.; A. vulgaris, Moench.), **Gemeine Felsenbirne** **B, L, R, S** | | | | |
| Wuchs straff aufrecht, bis 3 m hoch. Blüten in weißen Trauben, Herbstfärbung orangescharlach. **Besonders für Hecken und sonnige und steinige Hänge geeignet.** . . . | 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Amorpha** (L.) - Bastardindigo - LEGUMINOSAE | | | | |
| **canescens** (Nutt.) **B** | | | | |
| Nordamerika, Halbstrauch, bis 1 m hoch, Blüten blau, in 10—15 cm langen Ähren, **Juni-Juli. Verträgt einen trokkenen Standort.** Mit Ballen | 40—60 | 2,50 | | |
| **fruticosa** (L.) **B** | | | | |
| Nordamerika, Strauch bis 6 m hoch, **für leicht sandigen Boden,** Blüten violettblau, in 15 cm langen, aufrechten Trauben im **Juli** bis **August** . . . . . | 100—150 | 0,65 | 5,80 | 50,— |
| **Ampelopsis,** siehe unter Kletterpflanzen | | | | |
| **Andromeda** (L.) - Lavendelheide - ERICACEAE | | | | |
| **axillaris,** siehe Leucothoe axillaris | | | | |
| **catesbaei,** siehe unter Leucothoe catesbaei | | | | |
| **floribunda** (Pursh.), Pieris floribunda (Benth & Hook) **I, S** | 30—40 | 2,— | 16,50 | 150,— |
| Immergüner, bis 1,50 m hoher, breitbuschiger Strauch mit großen, aufrechten, weißen Blütenrispen im April-Mai. Liebt Halbschatten, jedoch **keinen gedüngten Kulturboden.** Verträgt gut den Schnitt. Mit Ballen | 40—60 | 3,— | 25,— | 225,— |
| | 60—80 | 5,— | 42,— | 375,— |
| | 80—100 | 7,10 | 64,— | |
| | 100—125 | 11,50 | | |
| **japonica** (Thunb.), (Pieris japonica, D. Dan.) **I, R, S** | | | | |
| Bis 3 m hoch werdender, breitbuschiger Strauch mit 15 bis 20 cm langen, elegant überhängenden Blütenrispen im März-Mai. Liebt Halbschatten. **Eines unserer wertvollsten immergrünen Gehölze, das auf allen Böden gut gedeiht.** Mit Ballen | 30—40 | 2,25 | 19,— | 165,— |
| | 40—60 | 3,40 | 28,— | 250,— |
| | 60—80 | 5,50 | 46,— | 420,— |
| | 80—100 | 8,— | 67,50 | |
| | 100—125 | 13,50 | | |
| **pulverulenta,** siehe Zenobia pulverulenta | | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Aralia** (L.) - Aralie - ARALIACEAE | | | | |
| **chinensis mandschuria** (Rehd.), (Aralia elata, Seem.) **E, L** | | | | |
| Japan, Korea, bis 5 m hoher, dickästiger, wenig bestachelter Baum oder Strauch mit großen bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Die großen weißen Blütenrispen erscheinen im **August** bis **September. Ein sehr interessantes Einzelgehölz.** eintriebig | 60—80 | 1,65 | 15,— | |
| | 80—100 | 2,50 | 22,50 | |
| | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit großem Wurzelwerk, feucht verpackt eintriebig | 200—250 | 12,— | | |
| | 250—300 | 15,— | | |
| 2—3 Grundtriebe | 80—100 | 5,— | | |
| | 100—125 | 6,75 | | |
| | 125—150 | 9,— | | |
| | 150—200 | 12,— | | |
| | 200—250 | 18,— | | |
| 4—5 Grundtriebe | 125—150 | 16,50 | | |
| | 150—200 | 22,50 | | |
| **Aristolochia,** siehe unter Schlingpflanzen | | | | |
| **Arundinaria** (Mchx.) - Winterharter Bambus - GRAMINEAE | | | | |
| **murielae** (Gamble), (Sinarundinaria murielae, Nakai.) | | | | |
| China, Japan, neue, bis 2,50 m hoch werdende Sorte mit zierlicher Belaubung. Entwickelt sich später zu schönen, großen Büschen mit frischgrüner Belaubung. **Sehr wertvoll.** Mit Ballen | 40—60 | 2,50 | 22,50 | |
| | 60—80 | 3,30 | 30,— | |
| | 80—100 | 5,— | 45,— | |
| **Azalea** - Azalee - ERICACEAE | | | | |
| **amoena,** siehe A. amoenum-Gruppe | | | | |
| **arendsii,** siehe A. arendsii-Gruppe | | | | |
| **hatsugiri,** siehe Kurume Azaleen | | | | |
| **hinodegiri,** siehe Kurume Azaleen | | | | |
| **hinomayo,** siehe Kurume Azaleen | | | | |
| **ledifolia noordtiana** (Hort.), (led. van Noordt), (Rhod. mucronatum var. noordtianum, Wils.) **St, W** | | | | |
| Wintergrün, reichblühend, Blüten sehr groß und schön weiß gefärbt. Blüte im Mai. **Verbesserung von A. ledifolia alba.** Mit Ballen | 30—40 | 4,50 | | |
| | 40—50 | 5,70 | | |
| | 50—60 | 6,75 | | |
| **mollis** (Andr.), (Rhod. japonicum, Suring) **B** | 30—40 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| China, blüht April-Mai in gelben, orange und roten Schattierungen. **Bildet im Gegensatz zu A. pontica größere und auffallendere glocken- und trichterförmige Blüten.** Mit Ballen | 40—50 | 3,60 | 33,— | 300,— |
| | 50—60 | 4,30 | 39,— | 352,— |
| | 60—70 | 5,40 | 50,— | |
| | 70—80 | 7,50 | 67,50 | |
| | 80—100 | 10,50 | | |
| **mollis Hybriden in Sorten** (Rhod. japonicum Hybriden) | | | | |
| **Alphonse Lavalée,** hellachs, dunkelorange Zeichnung | | | | |
| **Comte de Gomer,** lachsrosa, dunkelorange Zeichnung | | | | |
| **Dr. M. Oosthoek,** dunkellachsrosa, dunkellachs Zeichnung | | | | |
| **Dr. Reichenbach,** orange, lachs Tönung | | | | |
| **Frans van der Bom,** orange, lachsrosa Tönung | | | | |
| **Hortulanus H. Witte,** gelborange, lachsrosa Tönung | 30—40 | 4,— | 36,— | |
| **Hugo Hardijzer,** lachsrosa, dunkelzinnober Tönung | 40—50 | 5,— | 45,— | |
| **Hugo Koster,** zinnober, braune Tönung | 50—60 | 6,60 | 60,— | |
| **Koster's Brillant Red,** scharlach, orange Zeichnung | 60—70 | 9,— | 81,— | |
| **Koster's Brillant Yellow,** gelborange, Zeichnung dunkler | 70—80 | 12,50 | 112,— | |
| **M. Koster,** lachsrosa, orange Zeichnung | 80—100 | 16,50 | 150,— | |
| **Spek's Brillant,** scharlach, zinnober Tönung | 100—125 | 21,— | | |
| **occidentalis Hybriden in Sorten** | | | | |
| **Delicatissima,** weiß, rosa Tönung und dunkelorange | | | | |
| **Irene Koster,** rosa, gelborange Zeichnung mit karmin | | | | |
| **Magnifica,** weiß, rosa Tönung mit karmin Mit Ballen | | | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt von **Koster's Brillant Red.** Mit Ballen | 50—60 | 9,— | | |
| | 60—70 | 12,50 | | |
| 50—60 cm breit | 70—80 | 16,50 | | |
| 60—80 cm breit | 70—80 | 21,— | | |
| **pontica** (L.), (Rhod. flavum, Don.) **B, L** | | | | |
| Kleinasien, Kaukasus, 3—4 m hoch werdend. Die im Vergleich zu A. mollis relativ kleinen, starkduftenden, orangegelben Blüten zeichnen sich durch ihre große Zahl und die lang aus der Blüte heraushängenden Staubgefäße aus. **Herbstfärbung besonders schön, liebt sonnige Lage.** Mit Ballen | 30—40 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 40—50 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 50—60 | 3,60 | 33,— | 300,— |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

*Aralia chinensis mandschurica*

Solitär 3 × v. 2-3 Triebe 150/200

*Ailantus altissima (glandulosa)*

Solitär 3 × v. 200/250

*Carpinus betulus*

Solitärbusch malerisch gewachsen
3 × v.
Höhe 300/350 — Breite 150/200

*Amelanchier canadensis*

Solitärbusch 3 × v.
8-15 Grundtriebe, Höhe 200/250

| Azalea pontica (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär,** 4 × verpfl. aus extra weitem Stand. Mit Ballen | 60—70 | 5,80 | 50,— | |
| | 70—80 | 6,75 | 60,— | |
| | 80—100 | 10,— | 90,— | |
| | 100—125 | 15,— | 135,— | |
| | 125—150 | 22,50 | 200,— | |
| **pontica - Hybriden** (Genter-Hybr.) in Sorten | | | | |
| **Bouquet de Flore,** karmin, gelbe Zeichnung | | | | |
| **Coccinea Speciosa,** lachs, orange Zeichnung | | | | |
| **Daviesii,** weiß, gelb getönt | | | | |
| **General Trauff,** karmin, dunkelgelborange Zeichnung | 30—40 | 4,— | 36,— | |
| **Gloria Mundi,** lachsrosa, orange Zeichnung | 40—50 | 5,— | 45,— | |
| **Grandeur Triomphante,** karmin-rosa, orange Zeichnung | 50—60 | 6,60 | 60,— | |
| **Ignea Nova,** karmin, orange Zeichnung | 60—70 | 8,25 | 75,— | |
| **Josephine Klinger,** hellachsrosa, Röhre außen dunkler | 70—80 | 11,50 | 100,— | |
| **Nancy Waterer,** goldgelb | 80—100 | 16,50 | 150,— | |
| **Narcissiflora,** hellgelb, goldgelber Fleck | 100—125 | 21,— | | |
| **Pallas,** lachsrosa, orange Fleck | 125—150 | 30,— | | |
| **Pucella,** rosa, dunkelorange Fleck | | | | |
| **Sang de Gentbrügge,** dunkelkarmin, dunkellachs Zeichnung | | | | |
| **Unique,** orange, dunkelgelborange Zeichnung | | | | |
| **Wilhelm III,** lachsrosa, dunkelorange Fleck Mit Ballen | | | | |

## Japanische Azaleen (Halbimmergrün)

### Azalea obtusum kaempferi x Malvatica - Kreuzungen St, W

Diese **winterharten, blühwilligen Kreuzungen ähneln** entweder mehr der 2,50 m hohen wintergrünen A. malvatica, die sich durch einen dichten, breitrundlichen Wuchs, behaarte, glänzende Blätter und 5 cm breite Blüten auszeichnet, oder mehr der bis 1,50 m hohen, laubabwerfenden A. obt. kaempferi mit ihrem sparrig verzweigten Wuchs und den 3—5 cm breiten Blüten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Alice,** karmin, rotbraune Zeichnung | | | | |
| **Betty,** rosa, schwachrote Zeichnung | | | | |
| **Favorite,** rubin, schwache rotbraune Zeichnung | | | | |
| **Feodora,** rosa, rote Zeichnung | 25—30 | 3,— | 27,— | 250,— |
| **Jeanette,** rosa, braunrote Zeichnung | 30—40 | 4,20 | 37,50 | 340,— |
| **John Cairns,** scharlach, schwache dunkle Zeichnung | 40—50 | 5,— | 45,— | 410,— |
| **Kathleen,** dunkelrosa, schwache rotbraune Zeichnung | 50—60 | 6,90 | 62,— | |
| **Orange Beauty,** lachsrosa, schwache Tönung | 60—70 | 10,— | | |
| **Zampa,** dunkelscharlach, schwache rote Zeichnung Mit Ballen | | | | |

### Azalea vuykiana - Kreuzungen St, W

Diese mittelstarkwachsenden Kreuzungen zeichnen sich besonders durch **große, einfache, 5—6 cm breite Blüten aus.** Da ihre Farben leicht in der Sonne verbleichen, sollte eine halbschattige Lage bevorzugt werden. Daneben verlangen sie Winterschutz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Beethoven,** purpur, rotbraune Zeichnung | | | | |
| **Joh. Seb. Bach,** purpurviolett, dunkelpurpur Zeichnung | 25—30 | 3,— | 27,— | 250,— |
| **Joseph Haydn,** hellpurpurviolett | 30—40 | 4,20 | 37,50 | 340,— |
| **Mozart,** rosa, schwache rote Zeichnung | 40—40 | 5,— | 45,— | 410,— |
| **Palestrina,** weiß, hellgrüne Zeichnung | 50—60 | 6,90 | 62,— | |
| **P. W. Hardijzer,** rosa, rubin Zeichnung | 60—70 | 10,— | | |
| **Schubert,** rosa Mit Ballen | | | | |

### Kurume Azaleen St, W

Diese widerstandsfähigen, schwachwachsenden Kreuzungen sind aus der in Japan wildwachsenden Rhod. obtusum japonicum, deren Blätter beiderseits behaart sind, und Rhod. obt. amoenum in der japanischen Inselstadt Kurume entstanden. **Diese feintriebigen, immergrünen Sorten zeichnen sich durch Leuchtkraft, Durchsichtigkeit und sehr starke Blühwilligkeit aus.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **hatsugiri** (Hort.) I, St, W | 20—25 | 3,— | 27,— | 250,— |
| Kleinbleibender, immergrüner, japanischer, **flachwachsender** Strauch mit violettroten Blüten im Mai. Mit Ballen | 25—30 | 4,20 | 37,50 | 340,— |
| | 30—40 | 5,25 | 48,— | 435,— |
| **hinomayo** (Hort.) I, St, W | 20—25 | 3,— | 27,— | |
| Blütenfarbe rosa mit schwach roter Zeichnung. Blüte | 25—30 | 4,20 | 37,50 | |
| früh im Mai. Mit Ballen | 30—40 | 5,25 | 48,— | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Azalea arendsii und A. amoenum - Gruppe** | | | | |
| Sie sind aus Kreuzungen der besten Kurume Azaleen mit Rhod. mucr. noordtianum entstanden und stellen eine **wintergrüne, harte und sehr blühwillige Rasse** dar. Die 5—8 cm breiten Blüten variieren vom zartesten Lila bis zum Karminrosa. | | | | |
| **amoena** (Ldl.), (Rhod. obtusum amoenum, Rehd.) **B, I, St, W** | 20—25 | 3,— | 27,— | 250,— |
| Kleiner, **immergrüner, flachwachsender** Strauch mit hellviolettroten Blüten im Mai. Mit Ballen | 25—30 | 4,20 | 37,50 | 340,— |
| | 30—40 | 5,25 | 48,— | |
| **arendsii** (G. A.) **St, W** | | | | |
| Blüten 5 bis 8 cm breit und in reicher Fülle im Mai. Die Farben variieren von rosa bis lila. Die Pflanzen werden bis 1 m hoch und breit. Mit Ballen | 25—30 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 30—40 | 4,20 | 37,50 | 340,— |
| | 40—50 | 5,— | 45,— | |
| „ **Ülfe** (Nr. 8) **Blütenfarbe:** ein reines, leuchtendes Purpur. Mit Ballen | 30—40 | 4,20 | 37,50 | |
| **Berberis** (L.) - Sauerdorn, Berberitze - BERBERIDACEAE | | | | |
| **aggregata** (C. Schneid.) **B, F** | | | | |
| China, bis 2 m hoher Strauch, laubabwerfend, Blätter quirlig sitzend, lebhaft grün, **Blüten in gelben Rispen,** Mai-Juni. **Frucht zinnoberrot bereift** . . . . . | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 60—80 | 3,75 | | |
| | 80—100 | 4,50 | | |
| | 100—125 | 6,— | | |
| **buxifolia nana** (Mouiller.), (B. d. nana, Hort.) **e, H, I, S, St** | | | | |
| Südamerika, zwergartig mit rotgrüner Belaubung, immergrün, gut **für kleine Einfassungen geeignet. Verträgt jeden Schnitt.** | 15—20 | 0,45 | 3,75 | 34,— |
| | 20—25 | 0,55 | 4,90 | 45,— |
| **Einfassungspflanzen,** in jüngerer Ware per lfd. m | 15—20 | 0,90 | 8,— | 67,50 |
| **candidula** (C. Schneid.) **I, R, S, St, W** | | | | |
| China, ähnlich B. verruculosa, jedoch noch schöner und zierlicher, Zweige haben kleine Warzen. Immergrüner Zwergstrauch mit kleinen, glänzenden Blättern, **unterseits bläulichweiß.** Mit Ballen | 20—25 | 2,25 | 19,— | 165,— |
| | 25—30 | 2,70 | 22,50 | 200,— |
| | 30—40 | 3,60 | 30,— | 270,— |
| | 40—50 | 4,— | 34,— | 300,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 50—60 cm breit | 40—50 | 6,— | | |
| **dulcis nana,** siehe B. buxifolia nana | | | | |
| **gagnepainii** (C. Schneid.) **B, I, R, S, St, W** | 25—30 | 2,25 | 19,— | 165,— |
| China, bis 1,50 m hoch werdender Strauch, mit schöner immergrüner Belaubung und buschigem, **malerischem Wuchs.** Wertvolle und harte Art, die sich auch gut für schattige Partien eignet. Mit Ballen | 30—40 | 2,70 | 22,50 | 200,— |
| | 40—50 | 3,60 | 30,— | 270,— |
| | 50—60 | 4,50 | 37,50 | 340,— |
| | 60—80 | 5,25 | 47,— | |
| | 80—100 | 7,50 | 67,50 | |
| „ **hybrida** (Hort.) **B, I, R, S, St, W** | 30—40 | 2,70 | 22,50 | 200,— |
| Ähnlich der Art, Blätter etwas kürzer und breiter, am Rande gewellt. Ist ein Bastard zwischen B. gagnep. und verruculosa. Mit Ballen | 40—50 | 3,60 | 30,— | 270,— |
| | 50—60 | 4,50 | 37,50 | 340,— |
| | 60—80 | 5,25 | 47,— | |
| | 80—100 | 7,50 | 67,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—70 cm breit | 60—80 | 6,60 | | |
| | 80—100 | 10,— | | |
| | 100—125 | 15,— | | |
| **hookeri** (Lem.) **B, I, R, S, St, W** | 30—40 | 2,70 | 22,50 | |
| Himalaya, bis 2 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit lederartigen Blättern und schwarzen, hellbläulich bereiften Beeren. Blüten Mai-Juni, schwefelgelb. Mit Ballen | 40—50 | 3,60 | 30,— | |
| | 50—60 | 4,50 | 37,50 | |
| | 60—80 | 5,25 | 47,— | |
| **julianae** (C. Schneid.) **B, I, R, S, St, W** | | | | |
| China, bis 2 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Triebe kantig, gelbbraun, mit großen dreiteiligen, gelbbraunen Dornen. **Kann zu den wertvollsten und härtesten hoch wachsenden Arten gezählt werden.** Mit Ballen | 30—40 | 2,70 | 22,50 | |
| | 40—50 | 3,60 | 30,— | |
| | 50—60 | 4,50 | 37,50 | |
| | 60—80 | 5,25 | 47,— | |
| **linearifolia** (Philippi) **I, S, St, W** | 30—40 | 3,60 | | |
| Chile, 1—2 m hoher, immergrüner Strauch mit glänzender dunkelgrüner Belaubung. Mit Ballen | 40—50 | 4,— | | |
| | 50—60 | 4,90 | | |
| **lologensis** (Sandw.), Neueinführung! **I, St, W** | | | | |
| Chile, eine immergrüne Naturhybride zwischen B. darwinii und B. linearifolia. Das Blatt erinnert an B. darwinii, die Blütenform aber an B. linearifolia. **Sehr reichblühend mit großen tiefgelben, glockenförmigen Blumen im Juni.** Mit Ballen | 30—40 | 3,60 | | |
| | 40—50 | 4,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Berberis** (Fortsetzung) | | | | |
| **mentorensis** (Horvath.) **E** | | | | |
| In den USA entstandene Hybride aus B. thunbergii x julianae. | | | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 100—125 | 22,50 | | |
| 175—200 cm breit | 125—150 | 34,— | | |
| **stenophylla** (Lindl.), (B. darwinii x empetrifolia) **B, E, I, S, St, W** | 30—40 | 2,70 | 22,50 | 200,— |
| Immergrüner, bis 3 m hoher Strauch, mit überhängenden, | 40—60 | 3,40 | 28,— | 250,— |
| rotbraunen Zweigen, **außerordentlich reichblühend,** Blüten | 60—80 | 4,— | 34,— | 300,— |
| goldgelb im Mai. Sehr wertvoller und schöner Strauch, der | 80—100 | 5,40 | 45,— | |
| etwas Schutz verlangt und sich **gut treiben läßt.** Mit Ballen | 100—125 | 6,75 | 60,— | |
| **thunbergii** (DC) **B, F, H, L** | | | | |
| Japan, niedriger, bis 150 cm hoch werdender Strauch, im | | | | |
| Mai mit blaugelben Blütenglöckchen, im Herbst mit koral- | 30—40 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| lenroten Früchten und feurigroter Herbstfärbung. **Auch** | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **ohne Schnitt ist sie eine unserer wertvollsten Hecken-** | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **pflanzen.** | 80—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| „ **atropurpurea** (Chenault.) **B, F, H, L** | | | | |
| Wuchs und Farbe der Blüte wie bei der Art, mit tief- | | | | |
| bronzerotem Laub, eine **wenig Unterhaltungskosten** ver- | 30—40 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| ursachende, wertvolle Heckenpflanze, die jeden Schnitt | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| verträgt. | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—250 cm breit | 175—200 | 34,— | | |
| | 200—250 | 45,— | | |
| „ „ **nana** (Kleiner Favorit), **Neuheit!** **B, e, H, L, St** | | | | |
| Eine sehr kompakt wachsende Sorte, die kaum hö- | 10—15 | 0,85 | 7,50 | 67,50 |
| her als 30 cm wird und **wie kaum eine andere Sorte** | 15—20 | 1,25 | 11,50 | 100,— |
| **für niedrige Hecken geeignet** ist. | 20—25 | 1,65 | 15,— | |
| **verruculosa** (Hemsl. & Wils.) **B, I, S, St, W** | | | | |
| Westchina, sehr wertvoller, bis 1 m hoch werdender, im- | 20—25 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| mergrüner, **kompakt wachsender Strauch** mit hellgrüner, | 25—30 | 2,40 | 20,— | 180,— |
| scharf stacheliger, kleiner Belaubung. Blüten goldgelb, | 30—40 | 3,20 | 27,— | 240,— |
| Früchte länglich, hellblau. Zweige sind dicht mit kleinen | 40—50 | 3,60 | 30,— | 270,— |
| braunen Warzen besetzt. Mit Ballen | 50—60 | 4,20 | 36,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—70 cm breit | 50—60 | 6,— | | |
| 60—80 cm breit | 60—80 | 8,25 | | |
| **wilsoniae** (Hemsl. & Wils.) **e, E, F, H, L, St** | | | | |
| Westchina, bis 1 m hoher, wintergrüner, halbkugelförmi- | | | | |
| ger Busch mit zierlicher, bis zum Boden reichender Belau- | | | | |
| bung. **Herbstfärbung zinnoberrot. Die korallenroten** | | | | |
| **Früchte halten sich lange bis in den Winter hinein. Sehr** | 30—40 | 3,20 | 27,— | |
| **zu empfehlen.** Mit Ballen | 40—50 | 3,60 | 30,— | |
| „ **subcaulialata** (C. Schneid.) **F, H, L, St** | | | | |
| Unterscheidet sich von B. wilsoniae durch seine etwas | | | | |
| größere, gewellte, unterseits mehr grauweiß bereifte Be- | | | | |
| laubung und besonders durch **seinen stärkeren, mehr** | | | | |
| **aufrechten Wuchs.** Früchte gehäuft, lachsfarbig bis | 40—60 | 1,15 | 10,— | |
| gelbrot. | 60—80 | 1,25 | 11,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 4,20 | | |
| | 100—125 | 5,— | | |
| **Betula** (L.) - Birke - CORYLACEAE | | | | |
| **japonica mandschurica** (Winkl.), (B. platyph., Suk.) **E, L, R** | | | | |
| Nordostasien, bis 20 m hoher Baum, **der 3 Wochen früher** | | | | |
| **als alle anderen Birken austreibt** und dessen Laub sich | | | | |
| im Herbst schön gelb färbt. Mit Ballen | 150—200 | 4,50 | | |
| **koehnei** (C. Schneid.), (Betula pendula x papyrifera) **E, R** | | | | |
| Bildet einen großen lockerkronigen Baum mit überhängen- | | | | |
| den Zweigen, **dessen Rinde bis zu den jüngsten Ästen blen-** | 150—200 | 4,50 | | |
| **dend weiß ist.** Mit Ballen | 200—250 | 5,80 | | |
| **nana** (L.), **nördliche Zwergbirke** **St** | | | | |
| Ein niedergestreckt bis aufstrebender, höchstens 1 m ho- | | | | |
| her Strauch mit filzigen Trieben. Blätter fast kreisrund. | | | | |
| Zierliche, für Felsgruppen und Moorbeete geeignete Art. | 20—30 | 1,50 | 12,— | |
| Mit Ballen | 30—40 | 1,80 | 15,— | |
| **nigra** (L.), **Schwarzbirke** **L** | | | | |
| Amerika, bis 30 m hoher, malerischer, oft mehrstämmi- | | | | |
| ger Baum mit sich **in Fetzen ablösender, schwarzbrauner** | 100—125 | 2,25 | 20,— | |
| **Rinde.** Diese Art verträgt sehr feuchte Lagen und weist | 125—150 | 3,— | 27,— | 250,— |
| eine tiefgelbe Herbstfärbung auf. Mit Ballen | 150—200 | 3,75 | 34,— | 300,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Betula** (Fortsetzung) | | | | |
| **papyrifera** (Marsh.), (B. papyrac., Alt.), **Papierbirke E, L, R** | | | | |
| Nordamerika, bis 30 m hoher Baum, oft von Grund an mehrstämmig, mit **blendend weißer Stamm- und Astrinde und braunroten Zweigen.** | | | | |
| **Stammbüsche,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand, ca. 80-130 cm Stammhöhe, 100—150 cm breit. Mit Ballen. Stammumfang | 10—12 | 9,40 | 82,50 | |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | |
| | 14—16 | 13,50 | 120,— | |
| | 16—18 | 16,50 | 150,— | |
| **Solitärstammbüsche,** 3 × verpflanzt. 200—250 cm breit und 350—450 cm hoch. Mit Ballen. Stammumfang | 14—16 | 18,— | | |
| | 16—18 | 22,50 | | |
| | 18—20 | 27,— | | |
| | 20—25 | 33,— | | |
| **pendula und Varietäten,** siehe B. verrucosa | | | | |
| **platyphylla,** siehe B. japonica mandschurica | | | | |
| **pubescens** (Ehrh.), **Moorbirke L, R** | | | | |
| Europa, Sibirien, bis 15 m hoher, heimischer Baum mit aufrechter oder ausgebreiteter Verästelung und behaarten Zweigen. Obwohl sie sich auch für trockene Böden eignet, fühlt sie sich in **feuchten Lagen besonders wohl.** | | | | |
| Größen und Preise wie B. verrucosa | | | | |
| **verrucosa** (Ehrh.), (Betula pendula, Roth. = Betula alba, L. z. T.), **Sandbirke, Gemeine Weißbirke L, R** | | | | |
| Europa, Asien, bis 30 m hoher Baum mit weißer, bald in rissige Borke übergehende Stammrinde. Nimmt mit zunehmendem Alter einen hängenden Charakter an. Ein vorzügliches **Pioniergehölz,** das an Boden und Klima geringste Anforderungen stellt. **Daneben ist sie sehr windfest** und somit ein **wichtiges Windschutzgehölz.** | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung. Mit Ballen + 25 %, mindestens DM 0,25 je Stück | 125—150 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Alleebäume,** mit Ballen + 25 % Stammumfang | 7—8 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand. Auf Wunsch auch mit niedriger Stammhöhe lieferbar. Mit Ballen + 25 %. Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 40,— | 360,— |
| | 10—12 | 6,20 | 57,— | 500,— |
| | 12—14 | 7,50 | 67,50 | 600,— |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Auf Wunsch auch mit niedriger Stammhöhe lieferbar. Mit Ballen. Stammumfang | 14—16 | 11,50 | | |
| | 16—18 | 13,50 | | |
| | 18—20 | 19,— | | |
| | 20—25 | 22,50 | | |
| | 25—30 | 37,50 | | |
| | 30—35 | 60,— | | |
| | 35—40 | 100,— | | |
| | 40—45 | 150,— | | |
| | 45—50 | 200,— | | |
| **Natürlich gewachsene, besonders breite Büsche und Stammbüsche aus Einzelstand** Mit Ballen | | | | |
| **1-stämmig,** | | | | |
| 150—200 cm breit, 300—400 cm hoch, Stammumfang | 10—12 | 6,— | | |
| | 12—14 | 7,50 | | |
| 150—250 cm breit, 300—450 cm hoch, Stammumfang | 14—16 | 11,50 | | |
| | 16—18 | 13,50 | | |
| 350—450 cm hoch, Stammumfang | 18—20 | 18,— | | |
| | 20—25 | 22,50 | | |
| 350—550 cm hoch, Stammumfang | 25—30 | 37,50 | | |
| 200—300 cm breit, 400—600 cm hoch, Stammumfang | 30—35 | 52,— | | |
| 300—400 cm breit, 400—600 cm hoch, Stammumfang | 30—35 | 60,— | | |
| **2-stämmig,** | | | | |
| 150-250 cm breit, 300-350 cm hoch, Gesamtstammumf. | 20—30 | 11,50 | | |
| 300-350 cm hoch | | 15,— | | |
| 350-400 cm hoch | | 18,— | | |
| 400-450 cm hoch | | 25,— | | |
| 450-500 cm hoch | | 30,— | | |
| 200-350 cm breit, 300-350 cm hoch, Gesamtstammumf. | 30—40 | 21,— | | |
| 350-400 cm hoch | | 25,— | | |
| 400-450 cm hoch | | 30,— | | |
| 450-500 cm hoch | | 33,— | | |
| 500-550 cm hoch | | 37,50 | | |
| 300-350 cm hoch, Gesamtstammumf. | 40—50 | 25,— | | |
| 350-400 cm hoch | | 27,— | | |
| 400-450 cm hoch | | 32,— | | |
| 450-500 cm hoch | | 37,50 | | |
| 500-550 cm hoch | | 43,— | | |

| Betula verrucosa (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| 400-500 cm hoch, Gesamtstammumf. | 50—60 | 45,— | | |
| 500-600 cm hoch | | 52,— | | |
| **3-stämmig,** | | | | |
| 150-200 cm breit, 300-350 cm hoch, Gesamtstammumf. | 30—40 | 22,50 | | |
| 350-400 cm hoch | | 25,— | | |
| 400-450 cm hoch | | 27,— | | |
| 450-500 cm hoch | | 30,— | | |
| 500-550 cm hoch | | 33,— | | |
| 300-350 cm hoch, Gesamtstammumf. | 40—50 | 25,— | | |
| 350-400 cm hoch | | 28,50 | | |
| 400-450 cm hoch | | 36,— | | |
| 200-350 cm breit, 300-350 cm hoch, Gesamtstammumf. | 50—60 | 28,50 | | |
| 350-400 cm hoch | | 36,— | | |
| 400-450 cm hoch | | 45,— | | |
| 400-450 cm hoch, Gesamtstammumf. | 60—70 | 52,— | | |
| 300-400 cm breit, ca. 500 cm hoch, Gesamtstammumf. | 70—80 | 60,— | | |
| **4- und mehrstämmig,** | | | | |
| 150-250 cm breit, 250-300 cm hoch, Gesamtstammumf. | 30—40 | 16,50 | | |
| 300-350 cm hoch | | 21,— | | |
| 350-400 cm hoch | | 25,— | | |
| 350-400 cm hoch, Gesamtstammumf. | 40—50 | 28,50 | | |
| 400-450 cm hoch | | 36,— | | |
| 350-400 cm hoch, Gesamtstammumf. | 50—60 | 36,— | | |
| 400-450 cm hoch | | 45,— | | |
| 200-350 cm breit, 400-450 cm hoch, Gesamtstammumf. | 60—80 | 57,— | | |
| 450-500 cm hoch | | 67,50 | | |
| „ **fastigiata** (B. pendula fastigiata, K. Koch) **E, L, R** | 150—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Straff aufrecht wachsend,** Zweige etwas gewunden, bis in den November hinein grün bleibend. **Sollte an Stelle der Pyramidenpappel viel häufiger Verwendung finden.** Mit Ballen | 200—250 | 5,— | 45,— | |
| | 250—300 | 6,75 | | |
| | 300—350 | 9,— | | |
| | 350—400 | 10,50 | | |
| „ **laciniata** (Hort.) **E, L, R** | | | | |
| Hängebirke mit zierlicher, tief eingeschnittener Belaubung. **Die sehr dünnen und fein herunterhängenden Zweige** verleihen ihr einen leichten und graziösen Charakter. Mit Ballen. | 150—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 150 cm, Kronendurchm. 300—400 cm, Kronenhöhe 700—800 cm Mit Ballen. Stammumfang | 40—45 | 210,— | | |
| „ **purpurea** (B. pend. purpurea, C. Schneid.) **E, L, R** | 100—125 | 3,75 | | |
| Belaubung dunkelpurpur, wie bei der Blutbuche. | 125—150 | 5,— | | |
| Mit Ballen | 150—175 | 6,— | | |
| „ **tristis** (B. pendula tristis, Hort.), **Trauerbirke E, L, R** | 150—200 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| Feinverzweigte Hängeform mit **aufrechtwachsendem Spitzentrieb.** Zweige lang herunterhängend. Nicht für Grabbepflanzung zu empfehlen, da zu starkwachsend. | 200—250 | 5,— | 45,— | 405,— |
| | 250—300 | 6,75 | 60,— | 540,— |
| | 300—350 | 9,— | 81,— | 675,— |
| **Pyramiden,** mit Ballen | 350—400 | 10,50 | 94,— | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand. Mit Ballen. Stammumfang | 7—8 | 6,75 | 60,— | |
| | 8—10 | 9,— | 81,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 150 cm, Kronendurchm. 300—400 cm, Kronenhöhe 700—800 cm Mit Ballen. Stammumfang | 45—50 | 375,— | | |
| „ **youngii** (B. pendula youngii, C. Schn.) **E, L, R** | 150—200 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| Ganz fein und dichtverzweigte, **stark hängende Trauerbirke,** die sich ihres schwachen Wuchses wegen unter anderem sehr zur Grabbepflanzung eignet. | 200—250 | 5,— | 45,— | 405,— |
| | 250—300 | 6,75 | 60,— | 540,— |
| | 300—350 | 9,— | 81,— | 675,— |
| **Pyramiden,** mit Ballen | 350—400 | 10,50 | 94,— | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand. Mit Ballen. Stammumfang | 7—8 | 6,75 | 60,— | |
| | 8—10 | 9,— | 81,— | |
| | 10—12 | 10,50 | 94,— | |
| **Bignonia,** siehe unter Kletterpflanzen | | | | |
| **Buddleia** (L.) - Buddleia, Fliederspeer, Sommerflieder LOGANIACEAE | | | | |
| **alternifolia** (Maxim.) **E, R** | | | | |
| Westchina, bis über 2 m hoher, sehr wertvoller und **besonders winterharter** Strauch, mit elegant überhängenden Langtrieben, **für trockene Lagen.** Blüten lebhaft lavendelpurpurn, in dichten Büscheln auf der ganzen Länge der vorjährigen Langtriebe. Der volle Blütenreichtum zeigt sich erst im Alter. Schnitt soll ganz unterbleiben. Mit Topfballen | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 125—150 | 6,60 | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Buddleia** (Fortsetzung) | | | | |
| **davidii** (Franch.), (B. variabilis, Hemsl.) **R, W** | | | | |
| China, Strauch bis 3 m hoch, Blätter 15—20 cm lang, dichtgesägt. Blüten lila, wohlriechend, in aufrechten bis nikkenden, 15—30 cm langen Ähren. Juli—Oktober. . . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **Empire Blue** (Hort.), Neuheit! **R, W** | | | | |
| Sie stellt **die am intensivsten blau gefärbte Sorte dar. Sehr wertvoll.** Mit Topfballen | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| Ohne Topfballen | 80—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| „ **Fascination** (Hort.), Neuheit! **R, W** | | | | |
| **Mit enorm großen, bis 60 cm langen Blütenähren,** am Fuß 10 cm breit, spitz zulaufend, dunkel lilarosa. Mit Topfballen | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| Ohne Topfballen | 80—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| „ **Ile de France** (Hort.) **R, W** | | | | |
| Blütenähren bis 30 cm lang, dunkelpurpur, **sehr wertvoll.** Mit Topfballen | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| Ohne Topfballen | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 150—200 | 5,— | | |
| 150—200 cm breit | 200—250 | 6,50 | | |
| „ **magnifica** (Rehd. & Wils.) **R, W** | | | | |
| Eine sehr spätblühende und kräftig wachsende Sorte mit purpurrosa gefärbten Blüten. Kronenzipfel zurückgeschlagen. Mit Topfballen | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| „ **Peace** (Hort.) **R, W** | | | | |
| Diese sehr frostharte Sorte blüht mit ihren 30 cm langen, reinweißen Blütenähren bis lange in den Herbst hinein. Mit Topfballen | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| Ohne Topfballen | 80—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| „ **Royal Red** (Hort.), Neuheit! **R, W** | | | | |
| Sehr lange Ähren, dicht besetzt, mit **prachtvoll tief purpurroten Blüten, sehr reichblühend.** Mit Topfballen | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| Ohne Topfballen | 80—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 5,25 | | |
| **variabilis,** siehe B. davidii | | | | |

## Buxus (L.) - Buchsbaum - BUXACEAE

Alle Buxus bevorzugen einen alkalischen, nicht zu trokkenen Boden. In trockenen Böden leiden sie fast immer unter Ungeziefer.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **japonica aurea** (Hort.), (B. sempervirens aurea, Loud.) | 50—60 | 4,50 | | |
| **I, L, S, St** | 60—70 | 6,— | | |
| Blätter goldgelb, liebt Halbschatten, b. 2 m hoch werdend. | 70—80 | 7,50 | | |
| Mit Ballen. Hoch und breit | 80—90 | 10,— | | |
| „ **nana** (Hort.), (B. microphylla japonica nana, Rehd. & Wils.) **E, I, S, St** | | | | |
| Zweige niederhängend, sehr langsam wachsend, **bildet ohne Schnitt sehr schöne breitrunde Polster,** Belaubung hellgrün. **Hiermit lassen sich im Steingarten schöne Effekte erzielen.** | 30—40 | 3,60 | 25,— | |
| | 40—50 | 4,50 | 36,— | |
| **Flachkugeln,** mit Ballen. Breite | 50—60 | 5,25 | 42,— | |
| **microphylla jap. nana** (Rehd. & Wils.), siehe B. jap. nana | | | | |
| **sempervirens arborescens** (L.) **e, H, I, R, S** | | | | |
| Südeuropa, Westasien, baumartiger Buchsbaum, wertvolles, **schattenverträgliches Unterholz. Ausgezeichnet Rauch und Ruß der Städte aushaltend.** Der von uns geführte Typ zeichnet sich besonders durch dichte Verzweigung aus. | 15—20 | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| | 20—25 | 0,50 | 4,20 | 37,50 |
| | 25—30 | 0,60 | 5,25 | 45,— |
| **Mehrmals verschulte Heckenpflanzen.** Ohne Ballen | 30—40 | 0,80 | 6,75 | 60,— |
| Mit Ballen | 30—40 | 1,20 | 10,— | 90,— |
| | 40—50 | 1,50 | 12,50 | 112,— |
| **Pyramiden,** in Form geschnitten, mit Ballen. Breite ca. 15 cm | 40—50 | 3,— | 25,— | 225,— |
| | 50—60 | 4,20 | 33,— | 300,— |
| Breite ca. 20 cm | 60—70 | 5,25 | 42,— | 375,— |
| | 70—80 | 6,75 | 54,— | 500,— |
| | 80—90 | 7,50 | 60,— | |
| | 90—100 | 9,— | 75,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Buxus sempervirens arborescens** (Fortsetzung) | | | | |
| **Kugeln,** in Form geschnitten, mit Ballen. Breite und Höhe | 20—25 | 2,55 | 20,— | 188,— |
| | 25—30 | 3,10 | 25,— | 225,— |
| | 30—35 | 4,50 | 36,— | 330,— |
| | 35—40 | 6,50 | 52,50 | 470,— |
| | 40—50 | 9,— | 70,— | |
| **Breite Büsche,** natürlich gewachsen, mit Ballen . . | 40—60 | 2,25 | 18,— | 165,— |
| | 60—80 | 6,— | 50,— | 450,— |
| | 80—100 | 9,— | 75,— | |
| **Solitärbüsche,** 4 × verpfl. Mit Ball. 125—150 cm breit | 80—100 | 22,50 | | |
| „ „ **handsworthoides** (J. Timm & Co.) **I, R, Sch** Eine sehr gesunde, robuste, aufrechtwachsende Form mit frischgrüner Belaubung. Im Wuchs der B. semp. handsworthiensis sehr ähnlich. | | | | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 9,— | 75,— | |
| | 100—125 | 15,— | 120,— | |
| „ **aurea** (Loud.), siehe B. jap. aurea | | | | |
| „ **suffruticosa** (L.), **Einfassungsbuchsbaum** **e, I, R, S** per lfd. m 1000 St. DM 325,— | | 0,55 | 5,— | 36,— |
| verpflanzt, per lfd. m 1000 St. DM 405,— | | 0,65 | 5,50 | 45,— |

## Calluna (Salisb.) - Besenheide - ERICACEAE

Alle Callunen verlangen einen **kalkfreien, möglichst ungedüngten** Boden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **vulgaris** (Hull.), **Besenheide** **B, e, I, St** Mit Ballen. 1000 St. DM 135,— | | 0,20 | 1,70 | 15,— |
| „ **alba** (Br.) **B, e, I, St** Wie die Art, mit weißen Blüten, Ende Juli-August. | | | | |
| „ **alportii** (Beij.) **B, e, I, St** Wuchs stark aufrecht, bis 50 cm hoch, Belaubung grüngrau, Blüten rot bis violettrot, August-September. | | | | |
| „ **aurea** (Beij.) **B, e, I, St** Laub im Sommer und Winter intensiv leuchtend goldgelb, Blüten hell lilarosa, Juli-August. | | | | |
| „ **foxii** (Bean) **B, e, I, St** Bis 10 cm hoch, kissenförmig, Blüten zierlich, lilarosa, Ende Juli-August. | 8—12 cm Durchm. m. Ball. | 0,55 | 4,20 | 37,50 |
| „ **hammondii** (Beij.) **B, e, I, St** Hochwachsend, dunkelgrüne Blätter, ziemlich große, weiße Blüten, Ende Juli-August. | 12—20 cm Durchm. m. Ball. | 0,60 | 5,— | 45,— |
| „ **H. E. Beale** (M. & B.) **B, e, I, St** Wuchs stark, sparrig, aufrecht, bis 40 cm, Blüten dicht gedrängt, stark gefüllt, rosa, Ende August-September. Sehr haltbar als Schnittblume. **Eine der allerbesten Sorten.** | | | | |
| „ **tenuis** (Hort.) **B, e, I, St** Frühblühend, Anfang Juli, dunkelpurpurn, Wuchs gedrungen. | | | | |

## Calycanthus (L.) - Gewürzstrauch, Kelchblume - CALYCANTHACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **floridus** (L.) **E, R** Amerika, bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit dichtfilzigen Trieben. Blüten dunkelrotbraun, **stark erdbeerartig duftend,** Juni-Juli. Aus Ablegern. Mit Ballen | 40—60 | 2,25 | 20,— | |
| | 60—80 | 3,— | 27,— | |

## Campsis, siehe unter Kletterpflanzen

## Caragana (Lam.) - Erbsenstrauch - LEGUMINOSAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **arborescens** (Lam.) **B, H** Sibirien, baumartiger, bis 6 m hoher Strauch, Blüten hellgelb im Mai. **Als Deck-, Dünen- und Vogelschutzstrauch, auch für sonnige und trockene Lagen.** | 80—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 125—175 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 250—300 cm breit | 250—300 | 30,— | | |
| | 300—350 | 37,50 | | |
| „ **pendula** (Carr.) **B** Eine Form mit fast senkrecht herabhängenden Zweigen. **Halbstämme,** Stammhöhe | ca. 100 | 2,60 | 22,50 | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Carpinus** (L.) - Weißbuche, Hainbuche - CORYLACEAE | | | | |
| **betulus** (L.) **H, R, S** | | | | |
| Bis 20 m hoher, heimischer, schattenverträglicher Baum mit weit abstehenden, bis zum Boden herabhängenden Ästen. Eine der schönsten Heckenpflanzen überhaupt, da sie jeden Schnitt und Schatten verträgt. Sie ist ein sehr **regenerationsfähiges Windschutzgehölz.** | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—100 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 100—125 | 1,20 | 11,— | 98,— |
| | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Heckenpflanzen** aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt und regelmäßig geschnitten. Mit Ballen + 25 %, mindestens DM 0,25 je Stück | 150—175 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| | 175—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 200—225 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| **Heckenpflanzen und ungeschnittene Säulen,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand. Mit Ballen ca. 60 cm breit | 200—225 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 225—250 | 5,40 | 49,— | 450,— |
| | 250—275 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 275—300 | 7,20 | 66,— | 600,— |
| ca. 60—100 cm breit | 300—350 | 9,— | 82,50 | 750,— |
| | 350—400 | 15,— | 135,— | |
| | 400—450 | 25,— | 225,— | |
| **Heister,** auf einen Mitteltrieb gezogene Pflanzen mit natürlicher Bezweigung | 100—125 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 125—150 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 200—250 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Solitärbüsche,** malerisch gewachsen. 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—200 cm breit | 250—300 | 27,— | 250,— | |
| | 300—350 | 33,— | 300,— | |
| | 350—400 | 42,— | 375,— | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—300 cm breit | 600—800 | 225,— | | |
| 300—400 cm breit | 600—800 | 300,— | | |
| **Hochstämme mit beästeten Stämmen und Stammbüsche,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 65—100 cm breit und 300—400 cm hoch. Stammumfang | 7—8 | 7,50 | 67,50 | 600,— |
| | 8—10 | 9,— | 82,50 | 750,— |
| | 10—12 | 12,— | 110,— | 975,— |
| **Stammbüsche,** 3 ×verpflanzt. Mit Ballen. 80—120 cm breit und 350—450 cm hoch Stammumfang | 12—14 | 15,— | 135,— | |
| | 14—16 | 18,— | 165,— | |
| | 16—18 | 22,50 | 200,— | |
| | 18—20 | 30,— | 270,— | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. | 20—25 | 37,50 | | |
| 150—200 cm breit, 400—600 cm hoch. Stammumfang | 25—30 | 52,50 | | |
| 200—300 cm breit, 400—600 cm hoch. Stammumfang | 20—25 | 42,— | | |
| | 25—30 | 56,— | | |
| | 30—35 | 75,— | | |
| | 35—40 | 100,— | | |
| | 40—45 | 135,— | | |
| 600—800 cm hoch. Stammumfang | 25—30 | 75,— | | |
| | 30—35 | 100,— | | |
| | 35—40 | 135,— | | |
| | 40—45 | 188,— | | |
| 300—400 cm breit, 600—800 cm hoch. Stammumfang | 25—30 | 82,50 | | |
| | 30—35 | 112,— | | |
| | 35—40 | 150,— | | |
| | 40—45 | 200,— | | |
| | 45—50 | 260,— | | |
| 800—1000 cm hoch, Stammumfang | 40—45 | 260,— | | |
| | 45—50 | 340,— | | |
| „ **columnaris** (Späth), **Pyramidenweiß- oder Hainbuche** **E, H, L, R, S** | 100—125 | 3,60 | | |
| Diese veredelte Form bildet **dichte, aufrechte Pyramiden mit gesunder, hellgrüner Belaubung.** | 125—150 | 4,50 | | |
| | 150—200 | 6,— | | |
| **Pyramiden,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen | 200—250 | 7,50 | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen | 250—300 | 10,— | | |
| | 300—350 | 22,50 | | |
| | 350—400 | 34,— | | |
| **Caryopteris** (Bge.) - Bartblume - VERBENACEAE | | | | |
| **clandonensis** (Simmonds) **St, W** | | | | |
| Japan, Ostchina (incana x mongolica), bis 1 m hoch werdender, reichblühender, sommergrüner Strauch **für sandige und sonnige Lagen, der durch seine späten, tiefvioletten Blüten,** August-September, **erhöhte Bedeutung erlangt.** | 40—50 | 2,25 | 20,— | |
| **Castanea** (Mill.) - Edelkastanie - FAGACEAE | | | | |
| **sativa** (Mill.), (C. vesca, Gaertn.) **B, E, F, L, R** | | | | |
| Echte oder **eßbare Kastanie,** Südeuropa, Westasien, bis 30 m hoher Baum mit breit ausladender Krone. Sie ist neben der Eiche der beste Gerbsäurelieferant. Bevorzugt saure bis schwachsaure Böden. Um sicher zu tragen, verlangt sie wärmere Klimalagen. **Sehr wertvolles, schönlaubiges Einzelgehölz mit langen, grünlichweißen, männlichen Kätzchen, Juni-Juli.** **Spindel** | 100—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 125—150 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Castanea sativa** (Fortsetzung) | | | | |
| **Solitärspindel,** 3 × verpfl. Mit Ballen. 100-150 cm breit | 150—200 | 6,75 | | |
| | 200—250 | 10,— | | |
| | 250—300 | 15,— | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 8—10 | 8,— | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| | 12—14 | 12,50 | | |
| **vesca,** siehe C. sativa | | | | |
| **Catalpa** (L.) - Trompetenbaum - BIGNONIACEAE | | | | |
| **bignonioides** (Walt.), (C. syringaefolia, Sims.) **B, E, R** | | | | |
| Amerika, bis 15 m hoher, besonders spät austreibender Baum mit kurzem Stamm und breiter Krone. Gedeiht in seiner Heimat sowohl in sogenannten feuchten „Catalpa-Löchern", wie auch gut auf sandigen Böden. Blätter bis 30 cm lang. **Blüten in reichbesetzten, bis 25 cm langen Rispen,** Blüte weiß, Schlund gelblich bis purpurn gestreift und gefleckt. **Büsche** | 100—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 125—150 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Solitärbüsche,** mehrstämmig, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—175 | 5,— | 45,— | |
| | 175—200 | 5,80 | 52,50 | |
| | 200—250 | 7,50 | 67,50 | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 6,40 | 58,— | |
| | 10—12 | 8,25 | 75,— | |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | |
| **Parkbäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand, in Stammhöhe und Kronenbildung verschieden Stammumfang | 8—10 | 8,— | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| | 12—14 | 12,50 | | |
| | 14—16 | 15,— | | |
| | 16—18 | 19,— | | |
| | 18—20 | 25,— | | |
| | 20—25 | 33,— | | |
| **speciosa** (Warder), (C. cordifolia, Jaume) **B, E, R** | | | | |
| Amerika, stark und pyramidal wachsender, bis 30 m hoher, spätaustreibender Baum mit langzugespitzter Belaubung. **Büsche** | 100—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 125—150 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Solitärbüsche,** mehrstämmig, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—175 | 5,— | 45,— | |
| | 175—200 | 5,80 | 52,50 | |
| | 200—250 | 7,50 | 67,50 | |
| **syringaefolia,** siehe C. bignonioides | | | | |
| **Ceanothus** (L.) - Säckelblume - RHAMNACEAE | | | | |
| **americanus** (L.) **St, W** | | | | |
| Östl. Nordamerika, Strauch bis 1 m hoch, Wuchs aufrecht, Blüte weiß, in großen, end- und seitenständigen **Rispen im Juni bis Herbst.** Sie ist die härteste Art. Verträgt leichten Boden. . . . . | 40—60 | 2,25 | 20,— | |
| **Hybriden** in nachfolgenden Sorten, benötigen einen Winterschutz. **St, W** | | | | |
| **Coelestis,** himmelblau | | | | |
| **Gloire de Versailles** (Christen), dunkelblau, Wuchs kräftig | | | | |
| **Henri Desfossé,** dunkelblau | | | | |
| **Marie Simon** (Sim.-Louis.), lilarosa | | | | |
| **Topaze** (Lem.), zart indigoblau Mit Ballen | 40—60 | 3,60 | 33,— | |
| **Celastrus,** siehe unter Kletterpflanzen | | | | |
| **Cercidiphyllum** (S. et Z.) - Judasbaumblatt, Judasblatt CERCIDIPHYLLACEAE | | | | |
| **japonicum** (S. et Z.) **E, L** | | | | |
| Japan, raschwüchsiger, laubabwerfender Baum, meist mehrstämmig, Krone breitpyramidal. Bevorzugt in seiner Heimat **besonders feuchte und tiefgründige Böden** und ist **gegen Dürre sehr empfindlich.** Ein sehr interessantes, **schön belaubtes, rötlich austreibendes Gehölz** für Garten und Park. Herbstfärbung gelb. Blätter herzförmig, rotstielig, ähnlich wie bei Cercis. | 80—100 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| | 100—125 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 125—150 | 3,60 | 33,— | 300,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 125—150 | 5,— | 45,— | |
| | 150—175 | 5,60 | 52,50 | |
| | 175—200 | 6,75 | 60,— | |
| 80—125 cm breit | 200—250 | 11,50 | | |
| | 250—300 | 16,50 | | |
| | 300—350 | 22,50 | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Cercis** (L.) - Judasbaum - LEGUMINOSAE | | | | |
| **siliquastrum** (L.), **Gemeiner Judasbaum** **B, E, L, W** Südeuropa, Asien, bis 8 m hoher, sommergrüner, reichverästelter Baum. Blätter herznierenförmig, Blüten purpurrosa, in Büscheln zu 3—6, vor oder mit dem Blattaustrieb am alten Holz. **In Norddeutschland verlangt sie geschützte Lage und Frostschutz.** Aus 14-cm-Töpfen | 40—60 | 3,— | 27,— | |
| **Chaenomeles** (Ldl.) - Scheinquitte - ROSACEAE | | | | |
| **japonica** (Lindl.), (Ch. maulei, C. Sch.; Cyd. maulei, T. Moore) **B, F, H, R, St** Japan, bis 1 m hoher, dorniger Strauch, der bedeutend schwachwüchsiger als Ch. lagenaria ist. Blüten ziegelrot, bis 3 cm breit, außerordentlich reichblumig, März-April. Eine sehr schöne und wertvolle, halbhohe, **reichblühende Heckenpflanze, die noch auf leichtesten Böden gut gedeiht.** | 40—60<br>60—80 | 0,65<br>0,75 | 5,60<br>6,75 | 49,—<br>60,— |
| **lagenaria** (Koidz.), (Cyd. japonica, Pers.; Cyd. lagenaria, Loisel), **Japanische Scheinquitte** **B, F, H, R** Bis 2 m hoch werdend, Blätter oben glänzend, Blüten scharlachrot, März-April, **auch sehr gut für mittelhohe Hecken geeignet.** | 60—80<br>80—100 | 0,65<br>0,75 | 5,60<br>6,75 | 49,—<br>60,— |
| „ **Abricot** (Lem.) **B, R, St** Wuchs niedrig, Blüten halbgefüllt, orange. Mit Ballen | 40—60 | 2,60 | 24,— | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 250—300 cm breit | 125—150 | 37,50 | | |
| „ **Crimson and Gold, Neuere Sorte!** **B, R, St** Eine neue, niedrig bleibende, **sehr wertvolle Sorte,** mit großen, dunkelroten Blüten und goldgelben Antheren. Mit Ballen | 40—60 | 2,60 | 24,— | |
| „ **gaujardii** (Hort.), **Neuere Sorte!** **B, R, St** Sehr reichblühend, Blüten einfach, purpurn. Mit Ballen | 60—80 | 2,60 | 24,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 80—100<br>100—125 | 7,50<br>10,— | | |
| „ **moerloosii, Neuere Sorte!** **B, R, St** Wuchs hoch, Knospen karminrosa, aufgeblüht lachsrosa. Mit Ballen | 60—80 | 2,60 | 24,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100<br>100—125 | 7,50<br>10,— | | |
| „ **nivalis** **B, R, St** **Beste einfachblühende reinweiße Sorte.** . . . . | 60—80 | 1,25 | 11,50 | 100,— |
| „ **rubra grandiflora** **B, R, St** Blüten besonders groß, karmesinrot, sehr schwachwüchsig. . . . . | 60—80 | 1,25 | 11,50 | 100,— |
| „ **simonii** **B, R, St** Schöne, gefülltblühende Form mit intensiv scharlachroten Blüten. Mit Ballen | 40—60 | 2,60 | 24,— | |
| **maulei,** siehe C. japonica | | | | |
| **superba Andenken an Karl Ramcke** (Timm & Co.) **B, F, R** Bis 1 m hoch werdend, Blüten groß, leuchtend zinnoberrot, lange und reichblühend, glänzende Belaubung, Wuchs breit und gedrungen. Kann bis jetzt als **eine der wertvollsten Sorten** bezeichnet werden. Mit Ballen | 40—60 | 2,50 | 22,50 | |
| **superba atrosanguinea** (Krü.), (Cyd. m. atrosanguin., Froeb.) Blüten mennigscharlachrot. . . . . | 60—80 | 1,25 | 11,50 | 100,— |
| **Chionanthus** (L.) - Schneeflockenbaum, Schneeblume - OLEACEAE | | | | |
| **virginica** (L.) **E, R** Nordamerika, großer, bis 3 m hoher, **spät austreibender,** baumartiger Strauch. **Blüten weiß, in überhängenden, großen, lockeren, bis 20 cm langen Rispen** im Juni. Ein reichblühendes, wertvolles Gehölz zur Einzelstellung. Mit Ballen | 30—40<br>40—60 | 2,60<br>3,— | 24,—<br>27,— | |

**Clematis,** siehe unter Kletterpflanzen

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Clerodendron** (L.) - Losbaum - VERBENACEAE | | | | |
| **trichotonum fargesii** (Rehd.), (Cl. fargesii, Dode) **E, W** | | | | |
| China, sommergrüner, bis 2 m hoher Strauch, Blüten in endständigen, duftenden, zuerst grünen, später karminfarbenen Doldenrispen. **Schöner, auffälliger Spätsommerblüher zur Einzelstellung in Park und Garten. Liebt volle Sonne.** . . . . . | 80—125 | 1,70 | 15,— | |
| Solitär, mehrstämmig, 3 × verpflanzt. | 100—125 | 5,— | | |
| Mit Ballen. 60—80 cm breit | 125—150 | 5,80 | | |
| **Clethra** (L.) - Scheineller - CLETHRACEAE | | | | |
| **alnifolia** (L.) **R, S** | 40—60 | 2,25 | 20,— | |
| Nordamerika, bis 3 m hoher Strauch, blüht August-September in gelbweißen, aufrechten, duftenden Trauben. | 60—80 | 3,— | 27,— | |
| | 80—100 | 3,25 | | |
| Wertvoller, schattenverträglicher **Spätsommerblüher.** | 100—125 | 5,60 | | |
| **Colutea** (L.) - Blasenstrauch - LEGUMINOSAE | | | | |
| **arborescens** (L.) **B, F, R** | | | | |
| Südeuropa, bis 4 m hoher Strauch mit gefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai-Juli. Fruchthülse blasig aufgetrieben. **Verträgt trockenste und steinige Böden. Gute Wildfutterpflanze** . . . . . | 100—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **orientalis** (Mill.) **B, F, R** | | | | |
| Kaukasus, bis 2 m hoher Strauch, junge Zweige behaart, Blüten rötlichbraun, zu 2—5 in Trauben, Juni-September. | 100—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| Hat sonst die gleichen Eigenschaften wie C. arborescens. | 150—200 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Cornus** (L.) - Hartriegel - CORNACEAE | | | | |
| **alba** (L.) **F, L, R, S** | | | | |
| Nordasien, guter, über 2 m hoher Deckstrauch mit blutroten Zweigen, die sich später rotgrün färben. Auch noch | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| gut für **schattige und feuchte Lagen** zu gebrauchen. | 150—175 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **argenteomarginata** (Rehd.), (C. alba elegans, Hort.) **L** | 70—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| Die schönste, weißgerandete und gefleckte Form. | 125—150 | 1,40 | 12,— | 105,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 125—150 | 6,— | 54,— | |
| „ **elegans,** siehe C. alba argenteomarginata | | | | |
| „ **flaviramea** (Späth.), (C. stolonifera flaviramea, Rehd.) **S** | | | | |
| Ziert besonders im Winter durch seine **gelbe Rindenfarbe,** die sich gut zu den rotrindigen C. alba sibirica kontrastiert. . . . . | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **kesselringii** (E. Wolf) **L, S** | | | | |
| Ostasien, eine mittelstarkwachsende Sorte mit fast **schwarzrindigen Trieben** und dunkelbraungrünen Blättern. Blüten in weißen Doldenrispen im Mai. . . . | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **sibirica** (Loud.), (C. tatarica sibirica, Koehne) **F, R, S** | | | | |
| Wirkungsvoller Strauch mit **leuchtend scharlachroter** | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Rinde,** Blüte weiß, Mai, wird bis 3 m hoch . . . . | 140—160 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| „ **spaethii** (Wittm.) **L** | | | | |
| Blätter im Austrieb bronze, später breit goldgelb gerandet; leidet nicht durch Sonnenbrand. . . . . | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—125 cm breit | 100—125 | 5,— | 45,— | |
| | 125—150 | 6,— | 54,— | |
| **alternifolia** (L.) **E** | | | | |
| Nordamerika, **wertvoller,** baumartiger, **malerisch wachsender,** bis 6 m hoher Strauch für feuchte Lagen, Blüten weiß, Anfang Juli, in 8 cm breiten Scheindolden. **Gut für Einzelstellung geeignet. Kann sehr empfohlen werden!** | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 125—150 | 5,60 | | |
| | 150—200 | 6,75 | | |
| **bretschneideri** (Henry) **E, F** | | | | |
| Nordchina, bis 4 m hoher, laubabwerfender Strauch, junges Holz rötlichgelb, Blüten gelblichweiß, Früchte blauschwarz. . . . . | 80—100 | 1,15 | | |

| Cornus (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **florida** (L.), **Blumenhartriegel** **E, F, L** | | | | |
| Nordamerika, breitbuschiger, bis 5 m hoher, **einzigartiger Solitärstrauch** mit prächtig leuchtendroter bis violetter Herbstfärbung. Die schneeweißen bis hellrosa gefärbten Hüllblätter im Mai sind 4—5 cm lang. Frucht scharlachrot, eiförmig. Mit Ballen | 60—80 | 3,30 | 27,— | |
| | 80—100 | 4,20 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 80—100 | 5,— | | |
| | 100—125 | 6,75 | | |
| 125—150 cm breit | 175—200 | 22,50 | | |
| „ **rubra** (West.) **E, F, L** | | | | |
| Form mit rosa bis roten Hüllblättern (Brakteen) und **noch schönerer Herbstfärbung.** Mit Ballen | 60—80 | 3,30 | 27,— | |
| | 80—100 | 4,20 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 100—125 | 7,50 | | |
| **kousa** (Buerg) **E, F, L** | | | | |
| Japan, Korea, bis 7 m hoher, **malerisch wachsender** Strauch, Hochblätter der Blüten weiß, im Juni, 3—5 cm lang, Herbstfärbung scharlachrot. **Sehr wertvolles Einzelgehölz.** Mit Ballen | 60—80 | 3,30 | 27,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 10,— | | |
| „ **sinensis** (Osborn.), **Neueinführung!** **E, F, L** | | | | |
| Blätter größer und mehr behaart; Brakteen größer und weißer. Mit Ballen | 50—60 | 3,75 | | |
| **mas** (L.), **Kornelkirsche** **B, F, H, R, S** | | | | |
| Mitteleuropa, heimischer, bis 8 m hoher Strauch oder Baum. **Ein vorzüglicher Blüten-, Deck- u. Schattenstrauch,** dessen gelbe Blüten von Februar-April vor dem Austrieb erscheinen. Gleich gut für Hecken geeignet, ausgesprochen kalkliebend. | 60—80 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| | 80—100 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| | 100—125 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| | 125—150 | 2,25 | 20,— | 188,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 125—150 | 6,75 | 41,— | |
| 100—125 cm breit | 150—175 | 9,— | 81,— | |
| | 175—200 | 12,— | | |
| | 200—250 | 19,— | | |
| **sanguinea** (L.) **F, H, R, S** | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| Europa, sehr guter heimischer Hecken- und Deckstrauch für **trockene und schattige Lagen;** bis 4 m hoch werdend. | 80—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 125—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **stolonifera flaviramea,** siehe C. alba flaviramea | | | | |
| **tatarica sibirica,** siehe C. alba sibirica | | | | |

## Corylopsis (S. & Z.) - Scheinhasel - HAMAMELIDACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **pauciflora** (S. & Z.) **E, S, St, W** | | | | |
| Japan, bis 1,50 m hoher, feinzweigiger und breitbuschiger Strauch mit glockigen, 2—3 cm langen, primelgelben Blütenähren, womit der Strauch vor dem Blattaustrieb im März-April voll besetzt ist. Herbstfärbung gelb. Einer unserer **wertvollsten Frühjahrsblüher.** Mit Ballen | 40—50 | 3,75 | 34,— | |
| | 50—60 | 4,90 | 45,— | |
| | 60—70 | 6,75 | | |
| **spicata** (S. & Z.) **E, S, St, W** | | | | |
| Japan, bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch, Blüten hellgelb, im ganz zeitigen Frühjahr, zu 7—10 in 3—4 cm langen, überhängenden Ähren. **Wertvollster Frühjahrsblüher.** Mit Ballen | 40—60 | 3,40 | | |
| | 60—80 | 5,25 | | |
| | 80—100 | 6,75 | | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—100 cm breit | 80—100 | 10,— | | |
| | 100—125 | 15,— | | |

## Corylus (L.) - Haselnuß - CORYLACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **avellana** (L.), **Waldhasel** **B, H, R, S** | | | | |
| Europa, guter, bis 5 m hoch werdender, **heimischer Schattenstrauch** und guter Bodenbereiter, wichtigstes Wald- und Feldgehölz. Gleich gut geeignet für **Windschutzpflanzungen!** | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 80—100 | 1,20 | 11,— | 98,— |
| | 100—125 | 1,40 | 12,— | 105,— |
| | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 200—250 | 16,50 | | |
| 150—200 cm breit | 250—300 | 22,50 | | |
| 250—300 cm breit | 300—350 | 37,50 | | |
| „ **aurea** (C. Schn.), **Goldhasel** **L, S** | | | | |
| Blätter gelb, Triebe im Winter orange; Wuchs schwächer als die Art. Früchte klein. 3 × verpflanzt | 60—100 | 1,70 | 15,— | |

| Corylus (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **colurna** (L.), **Baumhasel** **E, R** | | | | |
| Osteuropa, Westasien, bis über 20 m hoher Baum mit korkiger, grauweißer Borke und regelmäßiger, pyramidaler Krone. Blätter groß, dunkelgrün. Gleich gut als **kleinkroniger Straßenbaum, wie als von unten beasteter freistehender Einzelbaum.** **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 10,50 | | |
| **maxima atropurpurea** (Bean.), (C. maxima purpurea, Rehd.), | | | | |
| **Echte Blut-Lambertshasel** **E, L, S** | | | | |
| Schöne große, **beständig schwarzrote Blätter;** starkwachsend, auch für Halbschatten. . . . . | 60—80 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—175 | 10,— | | |
| „ **purpurea,** siehe C. maxima atropurpurea | | | | |
| **Rotblättrige Zellernuß** **B, H, L, S** | | | | |
| Eine sehr starkwüchsige, rotblättrige Sorte, die auch wegen ihres reichen Fruchtertrages sehr zu empfehlen ist. | 100—150 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 10,— | | |

## Cotinus (Adans.) - Perückenstrauch - ANACARDIACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **coggygria** (Scop.), (Rhus cotinus, L.) **E, F, L** | | | | |
| Südeuropa, China, bis 3 m hoher, selten schöner Strauch, mit großen federigen, **perückenähnlichen Fruchtständen,** die schon im Sommer zur Geltung kommen. Mit Ballen | 80—100<br>100—125 | 3,—<br>3,60 | 27,—<br>33,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—100 cm breit | 80—100<br>100—125<br>125—150 | 3,75<br>5,—<br>6,40 | | |
| „ **rubrifolius** (Boom.), (Rhus. cotinus fol. purpureis, Hort.) **E, F, L** | | | | |
| Wie die Art, jedoch mit **prächtig dunkelroter Belaubung;** eine sehr interessante Form. Mit Ballen | 80—100<br>100—125 | 3,75<br>4,50 | 34,—<br>41,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—100 cm breit | 80—100<br>100—125<br>125—150 | 5,60<br>7,50<br>12,— | | |

## Cotoneaster (Med.) - Zwergmispel, Felsenmispel - ROSACEAE

vertragen sämtlich Halbschatten und sind gute Bienennährpflanzen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **acutifolia** (Turrcz.) **B, F, L, R** | | | | |
| Nordchina, breitbuschiger, bis 1,50 m hoher, wertvoller Heckenstrauch mit glänzenden Blättern und schwarzen Früchten. Diese **außergewöhnlich winterharte** Sorte kann auch gut im **ungeschnittenen Zustand** verwandt werden. Herbstfärbung leuchtend braunrot. | 60—80<br>80—100<br>100—125 | 0,75<br>0,90<br>1,15 | 6,75<br>8,25<br>10,— | 60,—<br>75,—<br>90,— |
| **adpressa** (Bois.) **B, e, F, R, St** | | | | |
| Westchina, kriechender, bis 25 cm hoher, schwachwüchsiger und reichfruchtender Strauch **für kleine Hecken** und Felspartien, **dessen Fruchtschmuck von besonders langer Dauer ist.** Mit Ballen. Breite | 15—20<br>20—30<br>30—40 | 1,15<br>1,30<br>1,70 | 10,—<br>12,—<br>15,— | 90,—<br>105,—<br>135,— |
| „ **praecox,** siehe C. praecox | | | | |
| **applanata,** siehe C. dielsiana | | | | |
| **bullata** (Bois.) **B, F, H, L** | | | | |
| Westchina, bis 2,50 m hoher, locker wachsender Strauch; sehr reichfruchtend. Früchte lebhaft rot. | 60—100<br>100—150 | 0,75<br>0,90 | 6,75<br>8,25 | 60,—<br>75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 150—200<br>200—250 | 5,60<br>9,— | | |
| **conspicua decora** (Russell), Neuheit! **F, I, R, S, St** | | | | |
| Westchina, immergrüner, zierlich belaubter, bis 1 m hoch werdender, reichblühender Strauch, der große Ähnlichkeit mit C. microph. thymifolia aufweist, jedoch winterhärter ist und etwas stärker wächst. Im Herbst ziert er durch seine runden orangeroten Früchte. Mit Ballen | 25—30<br>30—40 | 1,70<br>2,— | 15,—<br>19,— | |
| **dammeri** (Schneid.), (C. humifusa, Duthie) **e, F, I, R, S, St** | | | | |
| Mittelchina, niedriger, bis 20 cm hoher, **bodenbedeckender** Strauch mit dunkelgrünen, glänzenden Blättern und scharlachroten Beeren. Mit Ballen. Breite | 15—20<br>20—30<br>30—40 | 0,95<br>1,40<br>1,80 | 8,25<br>12,—<br>15,— | 75,—<br>108,—<br>135,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Cotoneaster dammeri** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **radicans** (C. Schneid.), **Neueinführung! e, F, I, R, S, St** | | | | |
| Westchina, sonst wie die Art, jedoch Blätter breiter, dunkler und mehr glänzend. Wächst stärker, ist sehr winterhart und stellt somit **eine hervorragende Bodenbegrünung** dar. Mit Ballen. Breite | 15—20 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 20—30 | 1,40 | 12,— | 108,— |
| | 30—40 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| **dielsiana** (Pritz.), (C. applanata, Duthie) **B, F, H, R** | | | | |
| Westchina, bis 2 m hoch werdender, harter Strauch mit bogig überhängenden Zweigen, die zum Herbst reich mit **scharlachroten Beeren behaftet sind und sich bis in den Winter hinein halten.** Hat besonderen Wert als **freiwachsende, ungeschnittene Hecke.** | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 60—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **divaricata** (Rehd. et Wils.) **B, E, F, H, R** | | | | |
| Westchina, bis 2 m hoher, harter Strauch mit breit abstehenden Zweigen und prächtigem, korallenrotem Fruchtbehang. Daneben ist noch das schöne, glänzende Blatt und die schöne Herbstfärbung hervorzuheben. Ist sowohl als **freiwachsende, ungeschnittene Hecke,** wie wegen seines malerischen Wuchses als Solitärstrauch zu empfehlen. | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 60—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 100—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 100—125 | 3,75 | 34,— | |
| | 125—150 | 4,50 | 41,— | |
| 100—125 cm breit | 100—125 | 5,— | 45,— | |
| | 125—150 | 6,— | 54,— | |
| 125—150 cm breit | 100—125 | 7,50 | 67,50 | |
| | 125—150 | 10,— | 90,— | |
| 150—200 cm breit | 125—150 | 22,50 | | |
| 250—300 cm breit | 150—200 | 37,50 | | |
| **franchetii** (Bois.) **F, H, St, W** | | | | |
| Westchina, halbimmergüner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit graziös überhängenden Zweigen. Die orangescharlachfarbenen Früchte haften lange am Zweig, junge Triebe und Blätter sind silbriggrau gefärbt. Verlangt in ungünstigen Lagen leichten Winterschutz. **Eine der schönsten und wertvollsten Arten für ungeschnittene Hecken.** Mit Ballen | 40—60 | 1,35 | 12,— | |
| | 60—80 | 1,90 | 16,50 | |
| | 80—100 | 2,50 | 22,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 80—100 | 5,— | | |
| | 100—125 | 6,60 | | |
| **frigida vicaryi** (Gibbs.), **Neueinführung! E, F, I, R** | | | | |
| Himalaja, wintergrüner, bis 3 m hoher, **malerisch wachsender Einzelstrauch** mit lebhaft grünen, lanzettlichen Blättern und großen, in Sträußen bis Weihnachten sitzenden, hellroten Beeren. Mit Ballen | 100—125 | 3,75 | 34,— | |
| | 125—150 | 5,25 | 47,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 125—150 | 7,50 | | |
| | 150—200 | 10,50 | | |
| 175—200 cm breit | 100—125 | 25,— | | |
| | 125—150 | 33,— | | |
| **hessei,** siehe C. praecox hessei | | | | |
| **horizontalis** (Dcne.) **B, F, L, R, S, St** | | | | |
| Westchina, kleiner, bekannter, flachwachsender Strauch mit reichem, scharlachrotem Beerenschmuck; **für Felspartien und Wandbekleidung.** Blätter fast kreisrund. Mit Ballen. Breite | 20—30 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 30—40 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| | 40—60 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 60—80 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. Breite 60—80 cm | 40—60 | 3,40 | 30,— | |
| 80—100 cm | | 5,— | 45,— | |
| 100—125 cm | | 6,60 | 60,— | |
| 125—150 cm | | 10,— | | |
| „ **fructo sanguineo** (Späth.), (C. hor. ascendens, Krüßm.) **B, F, L, R, S, St** | | | | |
| Unterscheidet sich vom Typ durch zurückgebogenen, mehr aufrechten Wuchs und frischgrüne Belaubung. Früchte länglich, blutrot. Mit Ballen. Breite | 30—40 | 1,20 | 11,— | 98,— |
| | 40—60 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| „ **prostrata** (Hort.), fälschlich C. prostrata **B, F, L, R, S, St** | | | | |
| Zeichnet sich C. horizontalis gegenüber durch einen dicht verzweigten Wuchs aus, wobei die Seitentriebe mehr nach oben gerichtet sind. Mit Ballen. Breite | 30—40 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| | 40—60 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **humifusa,** siehe C. dammeri | | | | |
| **hybrida pendula** (Grootend.), (C. frigida pendula, Hort.) **Neueinführung! E, F, I, R** | | | | |
| **Ein sehr dekorativer,** halbimmergrüner Strauch mit hängenden Zweigen, die sich **bis zum Boden niedersenken und überaus reich mit roten Beeren besetzt sind.** Eine sehr wertvolle Einzelpflanze. Mit Ballen | 60—80 | 3,40 | 30,— | |
| | 80—100 | 4,20 | 37,50 | |
| | 100—125 | 5,25 | | |
| | 125—150 | 7,50 | | |

| Cotoneaster (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **microphylla schneideri** (Schneid.) **F, I, St, W** | | | | |
| Etwa 40—50 cm hoch werdender, **immergrüner** Zwergstrauch. Blätter schwarzgrün, rundlich und klein. | 20—30 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| Früchte karminrot, in großer Zahl. Verlangt leichten | 30—40 | 2,25 | 20,— | 185,— |
| Frostschutz. Mit Ballen | 40—60 | 3,— | 27,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 40—50 | 7,50 | | |
| **multiflora** (Bunge) **B, E, F, H, R** | | | | |
| Westchina, bis 3 m hoher, reich fruchtender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen, der durch die Fülle der **vielblumigen**, weißen, lockeren Doldentrauben im Mai als die am schönsten blühende Art bezeichnet werden kann. Sehr gut für Einzelstellung und als **freiwachsende, ungeschnittene Blütenhecke!** . . . . . | 80—125 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt, mit Ballen, 80—100 cm breit | 150—200 | 5,— | 45,— | |
| 150—200 cm breit | 150—200 | 7,50 | 67,50 | |
| „ **calocarpa** (Rehd. & Wils.), **Neueinführung! B, E, F, H, R** | | | | |
| Westchina, diese Sorte zeichnet sich durch größere | 60—80 | 2,50 | 22,50 | |
| und schmälere Blätter und besonders durch **größere** | 80—100 | 3,30 | 30,— | |
| **Früchte** aus. Ist absolut hart und **außerordentlich** | 100—125 | 4,10 | 37,50 | |
| **reich fruchtend.** Sehr wertvoller Einzelstrauch. | 125—150 | 5,25 | 47,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 100—125 | 6,75 | | |
| | 125—150 | 10,— | | |
| **nanshuanica**, siehe C. adpressa praecox | | | | |
| **praecox** (Hort. Vilm.), (C. adpressa praecox, Bois et Berth; C. nanshuanica, Regel) **B, F, R, St** | | | | |
| Eines der besten Steingartengehölze. Blätter rund, **oberseits glänzend dunkelgrün.** Früchte groß und auffallend rot. | 20—30 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 30—40 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| Mit Ballen. Breite | 40—60 | 1,70 | 15,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 40—60 | 4,10 | 37,50 | |
| 80—100 cm breit | | 6,— | 54,— | |
| 100—125 cm breit | | 9,40 | 82,50 | |
| „ **hessei** (Hesse), (C. hessei, Hesse) **B, F, R, St** | 20—30 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| In allen Teilen kleiner und zierlicher bleibend als die | 30—40 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| Art. Mit Ballen. Breite | 40—50 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **prostrata**, siehe C. horizontalis prostrata | | | | |
| **rotundifolia** (Wall.), **Neueinführung! B, E, F, S, St** | | | | |
| Himalaja, halbimmergün, Blätter glänzend dunkelgrün, größer als bei C. horizontalis, Strauch bis 2 m breit und 1 m hoch werdend. Wuchs malerisch. Erhält noch erhöhte Bedeutung dadurch, daß sich die vielen korallenroten Beeren **auffallend lange am Strauch halten.** Mit Ballen. Breite | 40—60 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **salicifolia floccosa** (Rehd. et Wils.) **E, F, I, R, St** | | | | |
| Bis 2 m hoch werdender, **malerisch wachsender,** immergrüner Strauch mit sehr zierenden, hellroten Früchten, | 40—60 | 2,70 | 22,50 | 200,— |
| die sich bis Weihnachten am Zweig halten. Ein sehr | 60—80 | 4,15 | 33,— | 300,— |
| wertvoller Einzelstrauch. Mit Ballen | 80—100 | 4,20 | 34,— | 305,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 5,60 | 52,50 | |
| 80—100 cm breit | 100—125 | 7,50 | 67,50 | |
| | 125—150 | 10,— | 90,— | |
| 200—250 cm breit | 100—125 | 45,— | | |
| „ **pendula** (Hort.) **F, I, R, S, St** | | | | |
| Eine von uns gefundene Varietät mit größerer, hellgrüner Belaubung, sehr frühzeitig einsetzender, reichlicher Fruchtung und mit auf dem Boden fest aufliegender oder hängender Bezweigung. Färbung der | 20—30 | 1,40 | 12,— | 108,— |
| Früchte zinnoberrot. | 30—40 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| Liegende Pflanzen. Mit Ballen. Breite | 40—60 | 2,25 | 20,— | 190,— |
| Aufgebunden, Zweige niederhängend. Mit Ballen | 40—60 | 2,50 | 22,50 | |
| | 60—80 | 3,40 | 30,— | |
| | 80—100 | 4,50 | 41,— | |
| „ **rugosa** (Rehd. et Wils.), **Neueinführung! E, F, R, St** | | | | |
| Form mit breiteren, dunkelgrünen Blättern, Zweige und Blattunterseiten zottig behaart, Früchte korallen- | 40—60 | 2,70 | 22,50 | |
| rot, bis 4 m hoch werdend. Sehr wertvoller, **malerischer und reichfruchtender Strauch.** Mit Ballen | 60—80 | 4,20 | 33,— | |
| | 80—100 | 5,— | 45,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Cotoneaster** (Fortsetzung) | | | | |
| **simonsii** (Bak.) **B, F, H** Himalaja, bis 3 m hoher, halbimmergrüner Strauch mit aufrechtem Wuchs. Die erbsengroßen, scharlachroten Früchte werden nicht von Vögeln gefressen. Wegen seines Wuchses und seiner **schönen glänzenden Belaubung,** in nicht zu kalten Lagen eine wertvolle Heckenpflanze. | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **zabelii** (C. Schneid.) **F, H, St** Mittelchina, bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen und kleinen, unterseits weißfilzigen Blättern. Die zahlreichen Früchte sind hellrot gefärbt. | 60—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Crataegus** (L.) - Dorn -ROSACEAE | | | | |
| **carrierei** (Vauvel), (C. crus-galli x pubescens) **B, F, L, R** Bis 7 m hoher, winterharter, baumartiger, sparriger Strauch mit 5 cm langen Dornen. Blätter glänzend dunkelgrün. Die orangeroten Früchte halten sich lange am Baum. Kann wegen seiner **gesunden Belaubung, seiner schönen Herbstfärbung** und seiner Rußfestigkeit als einer unserer **wertvollsten, kleinkronigen Alleebäume** bezeichnet werden. Bevorzugt nährstoffreiche Böden. | 125—150 | 1,80 | 16,50 | 150,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und breiter seitlicher Bezweigung, **auch als Heckenpflanzen sehr gut zu verwenden.** | 150—200 | 1,95 | 18,— | 165,— |
| | 200—250 | 2,10 | 19,50 | 180,— |
| | 250—300 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| **Mehrstämmige Büsche** | 125—175 | 2,10 | 19,50 | |
| | 175—225 | 2,50 | 22,50 | |
| **Stammbüsche,** 60—80 cm breit und 250—300 cm hoch. Stammumfang | 7—8 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 8—10 | 3,60 | 33,— | 300,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 7—8 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| **coccinea** (L.), (C. intricata, Lge.), **Scharlachdorn B, F, H, L, R** Nordamerika, bis 7 m hoher, aufrecht wachsender, baumartiger Strauch mit bis 5 cm langen Dornen und großen scharlachroten Früchten. **Wertvolles Vogelschutzgehölz.** Sein größter Wert liegt jedoch in seiner hohen Frostresistenz und in seiner Eigenschaft, in Hecken auftretende Lücken schnell wieder zu schließen. **Besonders schöne scharlachrote Herbstfärbung.** | 60—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 100—150 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **intricata,** siehe coccinea | | | | |
| **monogyna** (Jacq.), **Eingriffliger Weißdorn B, F, H, R, S** Europa, Nordafrika. Wichtigstes, schönblühendes und schattenverträgliches Pionier- und Heckengehölz für etwas lehmige Böden. Blüte Mai-Juni. Sollte bei **Windschutzpflanzungen** Verwendung finden. | 40—60 | 0,50 | 4,10 | 37,50 |
| | 60—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 100—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 125—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **kermesina plena** (Hort.), **Gefüllter Rotdorn H, R Kleinkroniger Straßenbaum** . . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Breite Stammbüsche,** als **Heckenpflanzen** gut zu verwenden, mit geradem Mittelstamm | 175—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 200—250 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| | 250—300 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,25 | 20,— | 185,— |
| | 150—175 | 2,80 | 25,50 | 225,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 7—8 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 8—10 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | |
| **Hochstämme,** 3 × verpflanzt, Stammumfang | 8—10 | 6,— | | |
| | 10—12 | 7,— | | |
| **oxyacantha** (L.), **Zweigriffliger Dorn B, F, H, R, S** Bis 4 m hoher Strauch, der große Ähnlichkeit mit C. monogyna hat, jedoch etwas schwachtriebiger und dichter beästet ist. | 60—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 100—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **plena** (West.) **B, F, R** Mit reinweißen, gefüllten Blüten, die auch beim Verblühen weiß bleiben. . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | |
| **prunifolia** (Pers.) **B, F, H, L, R** Nordamerika, bis 6 m hoher, stark bedornter Strauch oder kleiner Baum mit glänzend dunkelgrüner, gesunder Belaubung, die sich zum Herbst flammend rot färbt. Frucht erbsengroß, scharlachrot. Sollte als **freiwachsende, ungeschnittene Hecke** weit häufiger verwendet werden. Liebt kräftigen Lehmboden. | 60—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 100—150 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **pyracantha,** siehe Pyracantha | | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Cydonia** (Mill.) - Quitte - ROSACEAE | | | | |
| siehe auch Chaenomeles und Formen | | | | |
| **oblonga** (Mill.), (C. vulgaris, Per.) **E, R** Mittelasien, baumartiger Strauch mit breitausladendem Wuchs, dessen junge Zweige filzig überzogen sind. Im Mai reich mit 4—5 cm breiten Blüten bedeckt. **Läßt sich gut als Einzelpflanze verwenden.** Früchte birnenförmig, gelb, duftend. | | | | |
| **Mehrstämmige Büsche,** 3 × verpflanzt, extra stark. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 3,40 | 30,— | |
| **Cytisus** (L.) - Ginster, Geißklee - LEGUMINOSAE | | | | |
| **capitatus,** siehe C. supinus | | | | |
| **decumbens** (Spach.) **B, St** Südeuropa, niederliegender, im April-Mai sehr reichblühender Strauch mit großen, leuchtendgelben Blüten. Wird etwa 20 cm hoch. Mit Topfballen, Breite | 25—35 | 1,70 | 15,— | |
| **kewensis** (Bean.), **Zwergelfenbeinginster** **B, St** Bis 50 cm hoch werdender, reichblühender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen und elfenbeinfarbigen Blüten im Mai. Mit Topfballen | 30—40 | 1,70 | 15,— | |
| **nigricans** (L.) **B, St** Mitteleuropa, bis 2 m hoher, aufrecht wachsender Strauch mit in endständigen Trauben im Juli-August blühenden gelben Blüten. Mit Topfballen | 50—70 | 0,85 | 7,50 | 67,50 |
| **praecox** (Bean.), (C. multiflorus x purgans), **Elfenbeinginster** **B, E, St** Kleiner, dichtverzweigter, kugelig wachsender Strauch. Die hellgrünen Zweige sind im Mai mit cremegelben Blüten voll besetzt. **Gut für Treiberei.** Mit Topfballen | 30—40 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 40—60 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| | 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 80—100 | 5,60 | | |
| | 100—125 | 7,50 | | |
| | 125—150 | 10,— | | |
| „ **albus** (Smith) **B, St** Wie C. praecox, nur mit weißen Blüten. Mit Topfballen | 40—60 | 1,30 | 12,— | |
| **purpureus** (Scop.) **B, St** Tirol-Norditalien, niedrigbleibender, bis 50 cm hoher Strauch mit purpurnen Blüten im Mai-Juni. Liebt kalkhaltigen Boden. **Gut für Treiberei.** Mit Topfballen | 25—40 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **ratisbonensis** (Schaeff.), **Neueinführung!** **B, St** Ungarn, bei uns bis 1,5 m hoch werdender Strauch mit leicht überhängenden Zweigen, die im Mai—Juni nach dem Elfenbeinginster außerordentlich reich mit buttergelben 2—3 cm großen Blüten besetzt sind. Mit Topfballen | 40—60 | 1,70 | 15,— | |
| **scoparius** (Link.), (Sarothamnus scop., Wimm.), **Besenginster** Heimischer Strauch, Blüten goldgelb, Mai-Juni. **B, St** | 20—40 | 0,60 | 5,25 | 45,— |
| Mit Topfballen | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **Hybriden in nachfolgenden besonders ausgewählten Sorten:** | | | | |
| **Andreanus splendens** (Hort.), Fahne gelb, Flügel gelb mit braunem Fleck. Eine sehr wertvolle großblumige und farbreine Sorte. | | | | |
| **burkwodii** (Burkw. & Skipw.), Fahnenaußenseite dunkelkarminrot, Innenseite karminrosa. Flügel braunrot mit kleinem goldgelbem Rand. | | | | |
| **Butterfly** (Hort.), Fahne sattgelb, Flügel gelb mit kleinen braunen Flecken. Wuchs gedrungen. | | | | |
| **C. E. Pearson** (Wats.), cremegelbe Fahnenvorderseite mit lila Rückseite. Flügel zart braunrot. | 40—60 | 2,25 | 20,— | 170,— |
| **Dallemorei,** Fahne lilarot, Flügel karminrot, lila durchscheinend. | | | | |
| **Dorothy Walpole** (Wats.), Fahnenaußenseite leicht karminrot, Innenseite rosa-weiß. Flügel braunrot. Sehr freudiger Wachser. | | | | |
| **Moonlight** (Hort.), sulphureus, Fahne schwefelgelb. Flügel schwefelgelb. Sehr großblumig. Mit Topfballen | | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Cytisus** (Fortsetzung) | | | | |
| **supinus** (L.), (C. capitatus, Scop.) **B, St** | | | | |
| Ostfrankreich bis Kaukasus, bis 1 m hoher, aufstrebender Strauch mit kopfständigen, tiefgelben Blüten. Reich und unermüdlich blühend von Juni-August. Mit Topfballen | 40—60 | 1,15 | 10,— | |
| **Daphne** (L.) - Seidelbast - THYMELAEACEAE | | | | |
| **cneorum** (L.), **Rosmarinseidelbast** **I, St** | | | | |
| Rußland bis Spanien, kleiner, immergrüner, niederliegender Strauch mit lebhaft rosa gefärbten, duftenden Blüten im Mai bis Juni. | 12—20 | 3,40 | 30,— | |
| Mit Ballen | 20—30 | 5,— | 45,— | |
| **mezereum rubrum** (L.) **B, F, R, S, St** | | | | |
| Europa, Kaukasus, bekannter, heimischer, stark duftender **Vorfrühjahrsblüher,** dessen rote Blüten vor dem Blattaustrieb erscheinen. Bevorzugt leichten Schatten und kalkhaltigen Boden. | 30—40 | 3,40 | 30,— | |
| | 40—50 | 3,75 | 34,— | |
| Mit Ballen | 50—60 | 4,10 | 37,50 | |
| **Davidia** (Baill.) - NYSSACEAE | | | | |
| **involucrata vilmoriniana** (Wangerin.) **E, L** | | | | |
| Westchina, in der Heimat bis 20 m hoher Baum mit 8 bis 14 cm langen, glänzenden Blättern und mit **bis 16 cm langen, ungleich großen, gelblichweißen Hochblättern im Mai-Juni.** Ein sehr interessanter und seltener Einzelbaum. Mit Ballen | 80—125 | 4,50 | | |
| **Decaisnea** (H. & T.) - Blauschote - LARDIZABALACEAE | | | | |
| **fargesii** (Franch.) **E, F** | | | | |
| Westchina, bis 5 m hoher, völlig winterharter Strauch, mit rötlichem Austrieb und bis 80 cm langen Fiederblättern, Blüten in hängenden, grünlichgelben Rispen im Juni. Dieser interessante Parkstrauch ziert besonders im Herbst durch seine **bohnenförmigen, blau bereiften Früchte.** | 80—100 | 3,30 | | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen . . . . . | 100—125 | 5,60 | | |
| | 125—150 | 6,75 | | |
| **Desmodium penduliflorum,** siehe Lespedeza formosa | | | | |
| **Deutzia** (Thunb.) - Deutzie, Maiblumenstrauch - SAXIFRAGACEAE | | | | |
| **A. Niedrig bleibende Sorten** (nicht über 1 m hoch werdend): **H, St** | | | | |
| **gracilis** (Sieb. et Zucc.) | | | | |
| Japan, 50 cm hoch werdender Strauch, der im Mai bis Juni in langen, reinweißen Rispen blüht, sehr geeignet zur **Frühtreiberei.** . . . . . | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **lemoinei** (Lemoine), (D. parviflora x gracilis) | | | | |
| Bis 1 m hoher, buschig bis aufrechtwachsender, sehr reichblühender Strauch mit im Juni erscheinenden 5 bis 8 cm langen weißen Blütenrispen. . . . . | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **Boule de neige** (Lem.) | | | | |
| Bis 1 m hoch, Blüten rahmweiß, im Juni. Auch gut für **Treiberei.** . . . . . | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **rosea** (Rehd.), (D. gracilis rosea, Lem.) | | | | |
| Niedrig bleibender, reichblühender Strauch mit zartrosa, glockenförmigen Blüten im Juni-Juli. . . . . | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **campanulata** (Rehd.) | | | | |
| Niedriger Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüten reinweiß, in dichten rundlichen Rispen, Juni-Juli. | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **exima** (Rehd.) | | | | |
| Blüten weiß, unterseits zartrosa. . . . . | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **B. Hochwachsende Sorten:** **H** | | | | |
| **crenata,** siehe D. scabra in Sorten | | | | |
| **discolor major** (Veitch.) | | | | |
| Mittelchina, bis 1,50 m hoch werdender Strauch mit abblätternden, rotbraunen Zweigen. Im Juni erscheinen in vielblumigen Doldentrauben die 3 cm breiten, rosaweißen Blüten. . . . . | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

| Deutzia (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **hybrida Mont Rose** (Hort. Lemoine) 2 m hoher Strauch mit großen, weit geöffneten rosa Blüten im Juni-Juli, die in waagerechten Rispen stehen. Eine auffallend schöne Sorte. . . . . | 70—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **magnifica** (Rehd.), (D. scabra x vilmorianae) Bis 2,50 m hoher Strauch mit außerordentlich großen, reinweiß gefüllten Blüten im Mai-Juni. Eine wertvolle und sehr zu empfehlende Sorte. . . . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **eburnea** (Rehd.) 2 m hoher, sehr reichblühender Strauch mit einfachen, weißen Blüten. Auch eine wertvolle, sehr zu empfehlende Sorte. . . . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 150—175 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **scabra candidissima** (Rehd.), (D. crenata candidissima plena, Froeb.), 2—3 m hoher, straff aufrecht wachsender Strauch mit reinweißen, dichtgefüllten Blüten im Juni-Juli. | 100—150 | 0,65 | 5,60 | 50,— |
| „ **rosea plena** (Hort.), (D. scabra plena, Rehd.; D. crenata plena, Hort.) Bis 2,50 m hoher Strauch, der im Juni-Juli überreich in rosa gefüllten Blütenrispen blüht. . . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 50,— |
| | 150—175 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

**Diervilla,** siehe Weigela

**Dimorphantus,** siehe Aralia

## **Dryas** (L.) - Silberwurz - ROSACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **suendermannii** (Kellerer), (D. octopetala x drummondii) **B, F, I, St** Immergrüner, kriechender Zwergstrauch mit gelblichweißen, leicht nickenden Blüten im Juni-August. Mit Topfballen | 15—20 | 1,20 | 11,— | |

## **Elaeagnus** (L.) - Ölweide - ELAEAGNACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **angustifolia** (L.) **B, F, H, R** Mittelmeergebiet bis Asien, bis 6 m hoher Strauch oder kleiner Baum mit 5—8 cm langen, lanzettlichen, weißfilzigen Blättern. Wertvollster Strauch für salzhaltige und stark trockene Böden. Daher auch **gutes Windschutzgehölz an der Nordseeküste.** . . . . . | 80—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 225—275 | 10,— | | |
| **argentea** (Pursh.), (E. commutata, Bernh.) **I, L, R** Nordamerika, Ausläufer treibender, dornloser, bis 2 m hoch werdender Strauch mit **braunschilfrigen** Trieben. Blüten trichterförmig, silbrig, innen gelb, sehr stark duftend, Mai—Juli. Wertvoller, **hitzebeständiger** Zierstrauch. | 60—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **commutata,** siehe E. argentea | | | | |
| **edulis,** siehe E. multiflora | | | | |
| **longipes,** siehe E. multiflora | | | | |
| **multiflora** (Thunb.), (E. edulis, Bernh.), E. longipes Gray) **I, L, R** China, Japan, bis 3 m hoher, dornloser Strauch mit **braunschilfrigen** Blättern. Früchte eßbar. Blüten hellgelb und duftend, im Mai. . . . . | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 100—125 | 5,80 | | |
| | 125—150 | 6,60 | | |

## **Enkianthus** (Lour.) - Prachtglocke - ERICACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **campanulatus** (Nichols.) **L, S, St** Japan, bis 3 m hoch werdender, reichblühender, sommergrüner Strauch mit in Doldentrauben hängenden, rötlichweißen Blüten im Mai und schöner, roter Herbstfärbung. Ein sehr wertvolles, **malerisch wachsendes,** schattenliebendes Einzelgehölz. Mit Ballen | 60—80 | 3,— | 27,— | |
| | 80—100 | 3,75 | 34,— | |
| | 100—125 | 4,50 | | |
| | 125—150 | 6,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Erica** (L.) - Heidekraut, Echte Heide - ERICACEAE | | | | |
| **carnea** (L.), (E. herbacea, Auct.), **Schneeheide** **B, e, I, St** Alpen, Apennin, niedriger, im Monat Februar bis April lebhaft rosa blühender Kleinstrauch für kalkhaltigen Gartenboden. | | | | |
| „ **alba** (Zab.), **Weißblühende Schneeheide.** | | | | |
| „ **atrorubra** (Hort.) Eine verhältnismäßig spät blühende, dunkelscharlachrote Sorte mit frischgrüner Belaubung. | | | | |
| „ **rubra** (Hort.) Unterscheidet sich von der vorigen Sorte durch einen etwas helleren Blütenton. | | | | |
| „ **Ruby Glow** Unterscheidet sich von E. vivellii mit ihrer grün bis bronzefarbenen Belaubung durch einen helleren Blütenfarbton. | | | | |
| „ **Springwood** (Hort.) Sie kann mit ihrer hellgrünen Belaubung und den besonders langen, dem Boden flach aufliegenden Zweigen zu den wertvollsten reinweißen Sorten gezählt werden. Blütenrispen sind auffallend lang. | 8—12 cm Durchm. | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| | 12—20 cm Durchm. | 0,55 | 4,50 | 40,— |
| „ **vivellii** (Hort.), Wuchs kräftig, Belaubung dunkel, im Herbst braunrot, Blütenfarbe prächtig leuchtend karminrot, von bester Farbwirkung, sehr wertvolle Sorte. | | | | |
| „ **Winter Beauty** (Hort.) Während E. carnea atrorubra als die spätblühendste Sorte bezeichnet werden kann, blüht diese Sorte **14 Tage vor allen übrigen Sorten.** Ihr Wuchs ist besonders kompakt und kurztriebig. **Eignet sich vorzüglich für niedrige Beeteinfassungen!** | | | | |
| **mediterranea** Mittelmeergebiet, lilarosa, ähnlich der Erica carnea, aber etwas lockerer und stärker wachsend. **Blüht von allen Sorten am spätesten.** Mit Ballen | | | | |
| **tetralix** (L.), **Glockenheide** **B, I, St** Heimisch, Blüten rosa, Juli-August, liebt sauren Boden. Mit Ballen | 12—20 cm Durchm. | 0,45 | 3,40 | 30,— |
| „ **alba** (Ait.) **B, I, St** Weißblühende Form der bekannten rosablühenden Glockenheide. Mit Ballen | 12—20 cm Durchm. | 0,55 | 4,50 | 40,— |
| **vagans Mrs. D. F. Maxwell** (M. & B.) **B, I, St, W** Die sehr großen, tief kirschrosa bis fast lachsroten Blüten erscheinen von August-September. In geschützten Lagen sehr wertvolle Sorte. Mit Ballen | 8—12 cm Durchm. | 0,70 | 6,— | 52,50 |
| | 12—20 cm Durchm. | 0,35 | 7,50 | 67,50 |
| „ **St. Keverne,** Blüten sehr groß, reinrosa, August-September. In geschützten Lagen sehr wertvolle Sorte. Mit Ballen | 8—12 cm Durchm. | 0,70 | 6,— | 52,50 |
| | 12—20 cm Durchm. | 0,85 | 7,50 | 67,50 |
| **Escallonia** (Mutis.) - SAXIFRAGACEAE | | | | |
| **hybrida Donard Seedling** (Donard), **Neueinführung!** **I, L, St, W** wintergrüner, reichblühender, niedriger Strauch mit überhängendem Wuchs und rosaweißen Blüten im Juni bis Oktober. Mit Ballen | 40—60 | 1,35 | 11,50 | 100,— |
| | 60—80 | 1,90 | 15,— | 135,— |
| **Evodia** (Forst.) - RUTACEAE | | | | |
| **hupehensis** (Dode.) **E, R** China, ein dem Phellodendron ähnlicher, laubabwerfender Baum mit stark riechendem Laub und gefiederten, bis fast 30 cm langen, glänzendgrünen Einzelblättern. . . | 80—125 | 3,40 | 30,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 6,60 | | |
| **Evonymus** (L.) - Spindelbaum, Pfaffenhütchen - CELASTRACEAE **(zweihäusig)** | | | | |
| **alata** (Reg.), **Geflügelter Spindelbaum** **E, F, L, St** Bis 4 m hoher, regelmäßig breit und sparrig wachsender Strauch mit **leuchtend karminroter Herbstfärbung.** Die Zweige sind von breiten flügelartigen Korkleisten bedeckt. **Eines unserer schönsten, frühaustreibenden Einzelgehölze für kalkhaltige Böden.** . . . . . | 40—60 | 2,50 | 22,50 | 200,— |

| Evonymus alata (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 60—80 | 6,— | | |
| | 80—100 | 7,50 | | |
| | 100—125 | 10,— | | |
| 80—100 cm breit | 80—100 | 9,— | | |
| | 100—125 | 13,50 | | |
| 100—125 cm breit | 100—125 | 15,— | | |
| | 125—150 | 22,50 | | |
| **europaea** (L.), **Pfaffenhütchen** **F, H, L, R, S** | | | | |
| Europa bis Asien, bis 6 m hoher, aufrecht wachsender, heimischer Strauch mit orangeroten Beeren. Dieser schattenliebende Strauch fällt im Herbst durch seine dunkelblutrote bis gelbe Herbstfärbung auf. Gut für **Windschutzpflanzungen** geeignet. | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 80—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| 2 × verpflanzt, extra stark, aus doppeltweitem Stand | 100—125 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| | 125—150 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 150—175 | 3,30 | 30,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 125—150 | 4,50 | 41,— | |
| | 150—175 | 5,80 | 52,50 | |
| | 175—200 | 6,60 | 60,— | |
| | 200—250 | 10,— | | |
| **fortunei-Formen,** siehe unter E. radicans-Formen | | | | |
| **nana koopmannii** (Beiss.), (E. nana turkestanica, Dieck.) **L, R, S, St** | | | | |
| Feinverzweigter, bis 70 cm hoch werdender Busch, Blätter schmal, tiefgrün, bis ins Frühjahr haftend, liebt Halbschatten. Mit Ballen | 30—40 | 1,— | 9,— | 82,50 |
| | 40—60 | 1,35 | 12,— | 105,— |
| „ **turkestanica,** siehe E. nana koopmannii | | | | |
| **planipes** (Koehne.), (E. sachalinensis, Maxim.) **E, F** | | | | |
| Japan, bis 4 m hoher, **sehr früh austreibender,** aufrecht wachsender Baum mit 8—12 cm großen zugespitzten, fein gesägten, dunkelgrünen Blättern. **Von besonderer Zierde sind die vielen langgestielten karminroten bis orangefarbigen 2 cm breiten Früchte. Ein selten schöner Einzelstrauch.** | 60—80 | 6,75 | | |
| | 80—100 | 9,— | | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 100—125 | 12,— | | |
| **radicans** (Sieb.), (E. fortunei radicans, Rehd.) **e, I, S, St** | | | | |
| Liegender oder leicht kletternder Kleinstrauch, der sich besonders als **schattenverträgliche Bodenbedeckungspflanze** und daneben auch für Einfassungen eignet. | 20—30 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| Mit Ballen. Breite | 30—40 | 0,85 | 7,50 | 67,50 |
| „ **acuta** (Rehd.), (E. fortunei, Hand.-Mazz.) **I, R, S, St** | | | | |
| China, immergrüner, auf dem Boden wurzelnder und mit Haftwurzeln kletternder, mittelstarkwachsender Strauch mit 3—6 cm langen, breitkeilig gesägten Blättern. Mit Ballen. Breite | 40—60 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| | 60—80 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 80—100 | 3,75 | 34,— | |
| | 100—125 | 5,— | 45,— | |
| „ **argenteo variegata** (Hort.), (E. fortunei reticulata, Rehd.) **e, I, S, St** | | | | |
| Weißbunte Form. Mit Ballen. Breite | 15—20 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 20—30 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **minima** (Simon-Louis), (E. fortunei minima, Rehd.; E. kewensis, Bean.) **I, S, St** | | | | |
| Zwergform mit sich eng an den Boden anschmiegenden Trieben, Blätter klein, oval, dunkelgrün. Eine ebenfalls wertvolle **schattenverträgliche Bodenbedekkungspflanze.** Mit Ballen. Breite | 15—20 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 20—30 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 30—40 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| „ **vegeta** (Rehd.), (E. fortunei vegeta, Rehd.) **I, S, St** | | | | |
| Immergrüner, breitbuschig wachsender Kleinstrauch mit dunkelgrünen und glänzenden Blättern, der sich sowohl als schattenliebendes Steingartengehölz, wie zur Wand- und Felsbekleidung eignet. Die weiblichen Pflanzen sind im Herbst voll mit **leuchtendroten Früchten bedeckt.** Auf Wunsch können männliche und weibliche Pflanzen geliefert werden. Mit Ballen. Breite | 30—40 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| | 40—60 | 2,40 | 20,— | 180,— |
| | 60—80 | 2,80 | 25,— | 225,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 40—60 | 5,— | 45,— | |
| 80—100 cm breit | 40—60 | 6,40 | 60,— | |
| 100—125 cm breit | 40—60 | 8,25 | | |
| | 60—100 | 10,— | | |
| **sachalinense,** siehe E. planipes | | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Exochorda** (Ldl.) - Prunkspiere - ROSACEAE | | | | |
| **albertii,** siehe E. korolkowii | | | | |
| **grandiflora,** siehe E. racemosa | | | | |
| **korolkowii** (Lav.), (E. albertii, Regel) **B, E** | | | | |
| Turkestan, bis 4 m hoher Baum mit rotbraunen Zweigen, Blüten etwa 3 cm breit, reinweiß, in bis 8 cm langer Traube. **Eines unserer edelsten Blütengehölze zur Einzelstellung.** Blütezeit April-Mai. Mit Ballen | 60—80 | 2,60 | 22,50 | |
| | 80—100 | 3,— | 27,— | |
| **racemosa** (Rehd.), (E. grandiflora, Hock.) **B, E** | | | | |
| Ostchina, sparrig wachsender, bis 4 m hoher, schöner Zierstrauch mit schneeweißen Blütenähren im Mai. Mit Ballen | 60—80 | 2,60 | 22,50 | |
| | 80—100 | 3,— | 27,— | |
| | 100—125 | 3,75 | 34,— | |
| **Fagus** (L.) - Buche - FAGACEAE | | | | |
| **silvatica** (L.), **Rotbuche** **H, R, S** | | | | |
| Europa bis Kaukasus, bis 40 m hoch werdender Baum mit gewölbter Krone. Bekanntes Forst-, Park- und Hekkengehölz. Die Buche verträgt sowohl starken Schatten, als auch volle Sonne; ist jedoch gegen plötzliches Freistellen sehr empfindlich, besonders wenn der Stamm nicht beastet ist. Ist nicht unbedingt an Kalk gebunden, sondern nur kalkhold. Bester Böschungsbefestiger, der neu aufgeschüttete Böschungen schnell quer durchwurzelt. **Wichtiges Windschutzgehölz!** Da Rotbuchen nach Johanni einen ungewöhnlich hohen Wasserbedarf haben, muß im ersten Jahr nach der Pflanzung unbedingt zusätzlich gewässert werden, um Ausfälle zu vermeiden. | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—100 | 1,— | 9,— | 82,50 |
| **Heckenpflanzen,** aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt und regelmäßig geschnitten. Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Material verpackt geliefert. Mit Ballen + 25 %, mindestens DM 0,25 je Stück. | 100—125 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| | 125—150 | 2,— | 18,— | 148,— |
| | 150—175 | 2,25 | 20,— | 188,— |
| | 175—200 | 2,80 | 25,— | 225,— |
| | 200—225 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Heckenpflanzen,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand mit besonders vollkommener Garnierung. Mit Ballen | 150—175 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| | 175—200 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 200—225 | 5,60 | 51,— | 465,— |
| | 225—250 | 6,75 | 60,— | 760,— |
| | 250—275 | 7,50 | 67,50 | 640,— |
| **Heister,** im Spitzentrieb nicht zurückgeschnittene Pflanzen mit natürlicher seitlicher Bezweigung. Mit Ballen + 25 %. | 100—125 | 1,35 | 12,— | 112,— |
| | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 200—250 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Stammbüsche,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit, 250—300 cm hoch, Stammumfang | 8—10 | 10,50 | 94,— | |
| | 10—12 | 12,— | 112,— | |
| 80—100 cm breit, 300—400 cm hoch. Stammumfang | 12—14 | 16,50 | 150,— | |
| | 14—16 | 21,— | | |
| | 16—18 | 26,— | | |
| | 18—20 | 34,— | | |
| | 20—25 | 45,— | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt. Mit Ballen. Stammumfang | 8—10 | 10,50 | 94,— | |
| | 10—12 | 12,— | 112,— | |
| | 12—14 | 16,50 | 150,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpfl. Stammhöhe 180—225 cm. Kronendurchm. 200—350 cm, Kronenhöhe 250—350 cm. Mit Ballen. Stammumfang | 25—30 | 60,— | | |
| | 30—35 | 75,— | | |
| | 40—45 | 190,— | | |
| | 45—50 | 300,— | | |
| „ **atropurpurea macrophylla** (Hort.), und F. silv. **Swat Magret** (G. Frahm) **E, L, R** | | | | |
| Diese beiden veredelten Blutbuchen stellen die besten Varietäten mit schwärzlicher Belaubung dar. F. silv. **Swat Magret** zeichnet sich durch den **um 8—10 Tage früheren Austrieb** und die sich im Herbst länger haltende dunkelrote Färbung aus. Im ersten Jahr nach der Pflanzung muß nach Johanni unbedingt zusätzlich gewässert werden. | 100—125 | 4,50 | 41,— | |
| | 125—150 | 6,— | 54,— | |
| | 150—200 | 9,— | 81,— | |
| | 200—250 | 15,— | | |
| | 250—300 | 22,50 | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand. Mit Ballen. Stammumfang | 8—10 | 22,50 | 200,— | |
| | 10—12 | 27,— | | |
| | 16—18 | 60,— | | |
| | 20—25 | 90,— | | |
| | 25—30 | 120,— | | |
| „ „ **pendula** (Hort.), **Trauerblutbuche** **E, L, R** | | | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand. Mit Ballen. Stammumfang | 7—8 | 18,— | 170,— | |
| | 8—10 | 22,50 | 200,— | |
| | 10—12 | 27,— | | |
| | 12—14 | 34,— | | |

| | | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fagus silvatica** (Fortsetzung) | | | | | |
| „ **pendula** (Lodd.) | **E, R** | 125—150 | 6,— | | |
| Grünblättrige Trauerbuche mit gleichmäßig von unten garniertem Stamm, entwickelt sich im Alter zu **herrlichen Charakterformen.** | Mit Ballen | 150—200 | 9,— | | |
| | | 200—250 | 15,— | | |
| | | 250—300 | 22,50 | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt, mit 2jährigen Kronen. Mit Ballen. | | 8—10 | 22,50 | | |
| | Stammumfang | 10—12 | 27,— | | |
| „ **purpurea** (Ait.) | **H, L, R** | 60—80 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| Blutbuche aus Samen, von dunkel- und großblättrigen Samenträgern. | 3 × verpflanzt, mit Ballen | 80—100 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | | 100—125 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | | 125—150 | 6,— | 54,— | 490,— |
| | | 150—175 | 9,— | 82,50 | 750,— |
| | | 175—200 | 12,— | 108,— | |
| | | 200—225 | 15,— | 135,— | |
| | | 225—250 | 18,— | | |
| | | 250—300 | 22,50 | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt. Mit Ballen. | Stammumfang | 8—10 | 9,— | 81,— | |

## Forsythia (Vahl.) - Forsythie, Goldglöckchen - OLEACEAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **intermedia** (Zbl.) | **B, H, R** | | | | |
| Bastard zwischen F. suspensa und viridissima. Wuchs aufrecht bis sparrig und überhängend. Blüten meist einzeln, lebhaft gelb, April-Mai. Liefert schöne blühende Hecken. . . . . | | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **densiflora** (Koehne) | **B, H, R** | | | | |
| Wuchs sparrig, ausgebreitet und überhängend, Blüten sehr groß, hellgelb, mit flachen, leicht zurückgebogenen Zipfeln. Schönste hellgelbe Form. . . . . | | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **spectabilis** (Späth.) | **B, H, R** | | | | |
| Blüten sehr groß, dottergelb, kurzgestielt, Blätter tiefgrün und neben F. viridissima die einzige Sorte, die glänzendes Laub hat. Blüht früher als var. densiflora und kann als eine der wertvollsten Sorten bezeichnet werden. . . . . | | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| 2 × verpflanzt, **extra stark,** aus doppeltweitem Stand | | 140—180 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | | 150—200 | 6,— | | |
| | **Halbstämme,** Stammhöhe | 100—120 | 2,80 | 25,— | |
| „ **vitellina** (Koehne) | **B, H, R** | | | | |
| Sie hat viel Ähnlichkeit mit F. densiflora von der sie sich durch etwas kleinere und zahlreichere Blüten unterscheidet. . . . . | | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **suspensa fortunei** (Rehd.) | **B, H, R** | | | | |
| Aufrecht wachsende Sorte mit bogig überhängenden Zweigen. Blüten tiefgelb und weit geöffnet. April-Mai. Sehr wertvoll! . . . . . | | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |

## Fraxinus (L.) - Esche - OLEACEAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **americana** (L.), (F. alba Marsh.), **Weißesche** | **R** | | | | |
| Amerika, sonst wie F. excelsior. Von der deutschen Esche (Fraxinus excelsior) unterscheidet sie sich durch **drei Vorzüge:** sie verträgt lange Sommerüberschwemmungen, treibt meist später als Fraxinus excelsior aus, ist dadurch weniger frostgefährdet und übertrifft Vorgenannte in der Wuchsleistung. | | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | | 200—250 | 1,15 | 10,— | |
| | | 250—300 | 1,40 | 12,50 | |
| **excelsior** (L.), **Gemeine Esche** | **R** | | | | |
| Europa, Kleinasien, bis 40 m hoher, starkwüchsiger Baum mit geschlossener Krone. Bester, einheimischer, lichtbedürftiger Baum **für feuchte, windgefährdete Niederungen,** der jedoch keine stauende Nässe verträgt. Als Alleebaum ergibt er ein gutes Straßenbild, ein guter **Böschungsbefestiger** und für tiefgründige, frische Böden ein sehr wertvolles **Windschutzgehölz.** | | 125—150 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | | 200—250 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| | | 300—350 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | | 14—16 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | | 16—18 | 8,25 | 75,— | 675,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Fraxinus excelsior** (Fortsetzung) | | | | |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 10—12 | 6,20 | 56,— | |
| | 12—14 | 7,50 | 67,50 | |
| | 14—16 | 9,— | 82,50 | |
| | 16—18 | 10,50 | 94,— | |
| | 18—20 | 12,50 | | |
| | 20—25 | 18,50 | | |
| „ **aurea** (Willd.) **E, L** Bis 30 m hoher, breitkroniger Baum mit intensiv gelben Trieben und grünen Blättern, die sich im Herbst jedoch wunderschön lindgelb färben. **In großräumigen Anlagen lassen sich mit dieser Sorte sehr schöne Wirkungen erzielen. Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 50,— | |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | |
| „ **diversifolia,** siehe F. exc. monophylla | | | | |
| „ **globosa** (Hort.), (F. excels. nana, Hayne), **Kugelesche R** Krone dicht geschlossen, kugelig, ausgezeichneter, **sehr gesunder, kleinkroniger Alleebaum für das Industriegebiet.** | | | | |
| **Hochstämme** mit 2jährigen Kronen. Stammhöhe 225—250 cm. Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| „ **monophylla** (Desf.), (F. excelsior diversifolia, Ait.), **Einblattesche,** schmalkronig. | | | | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 225—250 cm, Kronendurchm. 250—300 cm, Kronenhöhe 400—500 cm. Auf Wunsch mit Ballen. Preis auf Anfrage. Stammumfang | 30—35 | 45,— | | |
| „ **nana,** siehe F. exc. globosa | | | | |
| „ **pendula** (Ait.), **Trauerische** Oft zum Beschatten von Sitzplätzen verwendet. **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 5,50 | 50,— | |
| | 10—12 | 6,40 | 60,— | |
| | 12—14 | 8,25 | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 20—25 | 25,— | | |
| **ornus** (L.), **Blumenesche, Mannaesche** Südeuropa, Westasien, bis 15 m hoch werdender, **rundkroniger** Baum **für trockene und sonnige Lagen** mit großen, weißen, endständigen und wohlriechenden Blütenrispen, Mai—Juni. | 10—12 | 8,25 | | |
| | 12—14 | 10,50 | | |
| | 14—16 | 13,50 | | |
| | 16—18 | 15,— | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 18—20 | 19,— | | |
| | 20—25 | 25,— | | |

**Funkia,** siehe Stauden

## Gaultheria (L.) - Scheinbeere - ERICACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **procumbens** (L.), **Niederliegende Scheinbeere F, I, S, St** Nordamerika, kleiner, Ausläufer treibender, bis 30 cm hoher, bodenbedeckender Strauch mit roten Beeren, der sich sehr gut zur **Unterpflanzung** eignet. Mit Ballen | 8—12 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 12—20 | 0,95 | 8,25 | 75,— |

## Genista (L.) - Ginster - LEGUMINOSAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **hispanica** (L.) **St** Dichtverzweigter, stark dorniger Strauch, ähnlich Ulex, Blüten gelb, Juni-Juli, wird bis 30 cm hoch. Mit Topfballen | 20—30 | 1,15 | 10,— | |
| **radiata** (Scop.), **Strahlenginster St** Südeuropa, bis 50 cm hoch werdend, Blätter lineal, graugrün, Blüten im Juni, lebhaft gelb. Mit Topfballen | 15—20 | 1,70 | 13,50 | |
| | 20—30 | 2,— | 17,— | |
| **sagittalis** (L.), **Pfeilginster St** Italien, Südeuropa, schönes, kriechendes, bis 20 cm hohes Steingartengehölz mit aufrechten, kopfförmigen, gelben Blütentrauben im Mai-Juni. Mit Topfballen | 20—30 | 2,— | 17,— | |
| **tinctoria** (L.) **B, St** Europa, Westasien, bis meterhoher, **spät- und reichblühender** Strauch, Blüte tiefgelb, Juni-August, auch für leichte Böden. Mit Topfballen | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **plena** (Rehd.) **St** Bis 30 cm hoch, Blüte Juni - Juli, goldgelb, für Steingärten sehr zu empfehlen. Mit Topfballen | 15—20 | 1,90 | 15,— | |
| | 20—30 | 2,— | 17,— | |

*Castanea vesca*

Solitär 3 × v.
Höhe 200/250 — Breite 125/150

*Evonymus alata*

Solitär 3 × v. Höhe 125/150 — Breite 100/125

*Clematis Nelly Moser*

*Kolkwitzia amabilis*

Solitär 3 × v. Höhe 125/150 — Breite 125/150

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Ginkgo,** siehe unter Koniferen | | | | |
| **Gleditsia** (L.) - Gleditschie, Christusdorn, Lederhülsenbaum - LEGUMINOSAE | | | | |
| **triacanthos** (L.) **F, H, R** | | | | |
| Amerika, bis über 30 m hoher, stark bedornter Baum mit breiter, **lockerer, schirmförmiger Krone,** Blätter bis 20 cm lang, einfach oder doppelt gefiedert. Herbstfärbung gelb. Für leichte und sandige Böden geeignet. Da er gut den Schnitt verträgt, auch für hohe dornige Hecken zu empfehlen. | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpfl. Mit Ballen. 100-125 cm breit | 200—250 | 6,75 | 60,— | |
| | 250—300 | 10,— | 90,— | |
| **Glycine** (Wistaria), siehe unter Kletterpflanzen | | | | |
| **Gymnocladus** (L.) - Geweihbaum - LEGUMINOSAE | | | | |
| **canadensis,** siehe G. dioicus | | | | |
| **dioicus** (K. Koch), (G. canadensis, Lam.) **E, L** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, **bizarr wachsender,** bis 30 m hoher, spät austreibender Baum, mit doppelt gefiederten, bis 80 cm langen Blättern; **zeichnet sich durch seine schöne Belaubung und im Winter durch seine dicken, blau-bereiften Triebe aus.** | 80—100 | 10,— | | |
| | 100—125 | 13,50 | | |
| **Ältere Pflanzen,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen . . . | 125—150 | 20,— | | |
| **Halesia** (Ellis) - Schneeglöckchenbaum - Silberglocke - STYRACACEAE | | | | |
| **carolina** (L.), (H. tetraptera, Ellis) **E, L** | | | | |
| Amerika, bis 5 m hoher Baum oder Strauch, für leicht saure Böden, mit überhängender Bezweigung und rahmweißen, glockigen, 2 cm langen Blüten, die kurz vor den Blättern erscheinen, April—Mai. Härteste Art. Herbstfärbung gelb. **Edelstes Blütengehölz für Einzelstellung.** | 60—80 | 2,50 | 22,50 | |
| Mit Ballen | 80—100 | 3,30 | 30,— | |
| **tetraptera,** siehe H. carolina | | | | |
| **Halimodendron** (Fisch.) - Salzstrauch - LEGUMINOSAE | | | | |
| **halodendron** (Voss.), (H. argenteum, Fisch.) | | | | |
| Transkaukasien, bis 3 m hoch werdender trockenheitsresistenter, sommergrüner Strauch mit hellgraugrüner, wechselständiger Belaubung und weiß bis hellvioletten Blüten im Juni bis Juli. . . . . | 60—80 | 2,50 | 22,50 | |
| **Hamamelis** (L.) -Zaubernuß - HAMAMELIDACEAE | | | | |
| **japonica** (Sieb. et Zucc.) **E, L, R** | | | | |
| Japan, mehrere Meter hoch werdender, bizarr wachsender Winterblüher mit frostwiderstandsfähigen, leuchtend gelben Blüten, die vor dem Austrieb erscheinen. Januar-März. **Wertvolles Einzelgehölz.** | 60—80 | 7,50 | | |
| Mit Ballen | 80—100 | 9,— | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Höhe oder Breite | 125—150 | 22,50 | | |
| | 150—175 | 30,— | | |
| | 175—200 | 36,— | | |
| | 200—225 | 45,— | | |
| „ **flavopurpurascens** (Rehd.), (H. jap. rubra, Kache) **E, L, R** | 100—125 | 16,50 | | |
| Petalen ganz oder am Grunde gerötet. Sepalen innen purpurn. | 125—150 | 22,50 | | |
| | 150—175 | 30,— | | |
| | 175—200 | 36,— | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Höhe oder Breite | 200—225 | 45,— | | |
| „ **rubra,** siehe H. jap. flavopurpurascens | | | | |
| „ **zuccariniana** (Gumbleton) **E, L, R** | | | | |
| Wuchs mehr fächerförmig aufrecht. Blüten hellzitronengelb ab Februar. Blätter glänzend dunkelgrün und gerippt. Ein etwas späterer und sehr dankbarer Blüher. **Wertvolles Einzelgehölz.** | 100—125 | 13,50 | | |
| | 125—150 | 18,— | | |
| | 150—175 | 25,— | | |
| | 175—200 | 30,— | | |
| | 200—225 | 37,50 | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen . . . . . | 225—250 | 45,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Hamamelis** (Fortsetzung) | | | | |
| **mollis** (Oliv.) **E, L, R** | | | | |
| Mittelchina, hier bis 4 m hoch werdender, baumartiger Strauch mit stark silbrig behaarten Zweigen und Blättern. Die duftenden, goldgelben Blüten sind größer als bei allen anderen Arten, Januar-März. **Wertvolles Einzelgehölz.** | 60—80 | 10,50 | | |
| Mit Ballen | 80—100 | 13,50 | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Höhe oder Breite | 125—150 | 30,— | | |
| | 150—175 | 36,— | | |
| | 175—200 | 45,— | | |
| **vernalis carnea** (Rehd.) **E, R** | | | | |
| Petalen und Sepalen innen fleischrosa, Blüten klein, von Januar-März. Der Strauch wird bis 2 m hoch, Ausläufer treibend. | 100—125 | 13,50 | | |
| | 125—150 | 18,— | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Höhe oder Breite | 150—175 | 25,— | | |
| **virginiana** (L.) **E, R** | | | | |
| Nordamerika, bis 5 m hoch werdender Baum mit breitem und lockerem Wuchs. Blüten hellgelb, Okt.-Nov. | 150—175 | 13,50 | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. Höhe oder Breite | 225—250 | 22,50 | | |
| **Hedera** (L.) - Efeu - ARALIACEAE | | | | |
| **Nicht kletternde Varietäten:** | | | | |
| **helix arborescens** (Loud.) **I, R, S, St** | | | | |
| Eine sehr schöne und wertvolle Altersform des Typs für frostgeschützte Lagen. | 50—60 | 4,10 | | |
| 40—50 cm breit. 3 × verpflanzt. Mit Ballen . . . . | 60—70 | 5,60 | | |
| „ **conglomerata** (Nichols.), **Felsenefeu** **I, R, S, St** | | | | |
| Langsam wachsende Zwergform, kleine 3-lappige Blätter, am Rande gewellt, dicht den Boden bedeckend. Hervorragend für **schattige Unterpflanzungen** und für den Steingarten. Mit Topfballen | 10—15 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| „ **minima** (Hibb.), (H. helix donerailensis, Nichols.) **I, R, S, St** | 15—20 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| Eine straff aufrecht wachsende Form mit kleinen, 3 bis 5-lappigen, sehr dicht gestellt. Blättern. Mit Ballen | 20—30 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 30—40 | 1,05 | 9,75 | 90,— |
| **Kletternde Varietäten.** siehe unter Kletterpflanzen | | | | |
| **Helianthemum** (Adams.) - Sonnenröschen - CISTACEAE **e, I, St** | | | | |
| Immergrüne oder halbimmergrüne zwergige Halbsträucher, für vollsonnige, leicht sandige Böden, die in den Monaten Juni bis August unermüdlich blühen. | | | | |
| **amabile plenum Rubin,** sehr reich blühend, gefüllt, dunkelrot. Mit Topfballen | 12—20 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| **hybridum Ben Hekla,** orange mit dunkler Mitte. Mit Topfballen | 12—20 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| „ **Golden Queen,** zitronengelb. Mit Topfballen | 12—20 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| **polifolium roseum** (H. appeninum roseum) | | | | |
| Bis 30 cm hoch werdend, Blüten einfach, rosa. Eine außerordentlich widerstandsfähige Sorte. Mit Topfballen | 12—20 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| „ **mutabile atrosanguineum** | | | | |
| Laub silbrig, Blüten einfach, blutrot, Ende Mai. Mit Topfballen | 12—20 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| **Hibiscus** (L.) - Eibisch - MALVACEAE **St, W** | | | | |
| **syriacus Hybriden** | | | | |
| Sommergrüne, reichblühende Sträucher, die von Juli bis Herbst in den schönsten Farben blühen. Benötigen in den ersten Jahren leichten Winterschutz. | | | | |
| **Einfach blühende:** | | | | |
| **coelestis,** blauviolett, frühblühend | | | | |
| **Rubin** (Rubis), dunkelrot, frühblühend | | | | |
| **Souv. de Charles Breton,** violett | | | | |
| **totus albus,** trichterförmig, reinweiß, frühblühend | | | | |
| **Woodbridge, Neuheit!** rubinrot, sehr großblumig, frühblühend, sehr wertvoll | | | | |
| **Gefüllt blühende:** | 30—40 | 2,25 | 19,— | 170,— |
| **ardens plena,** violettrosa | 40—60 | 2,60 | 21,— | 188,— |
| **Comte de Flandre,** dunkelrot | | | | |
| **Duc de Brabant,** dunkelrot | | | | |
| **elegantissimus** (Lady Stanley), weiß und rosa | | | | |
| **Jeanne d' Arc,** reinweiß | | | | |
| **pulcherrimus,** rosa und weiß | | | | |
| **puniceus plenus,** dunkelrosa Mit Ballen | Neuheiten + 20 % | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Hippophae** (L.) - Sanddorn - ELAEAGNACEAE | | | | |
| **rhamnoides** (L.) **F, R** | | | | |
| Europa, China, bis 6 m hoher, Ausläufer treibender, baumartiger, kalkliebender Strauch mit silberschilfrigen Blättern und orangegelben Beeren. Ausgezeichneter salzfester Sandbinder, auch für Dünen an der Meeresküste. Daneben zur Bepflanzung von Halden, sowie von Kies- und Schotterflächen geeignet. Desgleichen **ein prachtvoller zweihäusiger Fruchtstrauch für Garten und Park. Auch gutes Windschutzgehölz.** | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 125—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| 3 × verpflanzt, mit Ballen | 175—200 | 4,50 | 40,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. | 80—100 cm breit 200—250 | 6,60 | 60,— | |
| **Holodiscus** (Maxim.) - Scheinspiere - ROSACEAE | | | | |
| **discolor ariaefolius** (Aschers et Graebn.), (Spiraea ariif., SM.) | | | | |
| Amerika, **wertvoller Spätsommerblüher mit überhängenden Zweigen** und rahmweißen Blütenrispen im Juli. Ein sehr dekorativer Einzelstrauch. . . . . | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Hydrangea** (L.) - Hortensie - SAXIFRAGACEAE | | | | |
| **arborescens grandiflora** (Rehd.) **R, S** | | | | |
| Nordamerika, bis 1,50 m hoher, buschiger Strauch mit weißen, kugelförmigen Doldenrispen von Juni-September. Ein schattenverträglicher, harter Strauch für **nährstoffreiche Böden.** . . . . . | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Starke Büsche,** 3 × verpfl. Mit Ballen. | 50—60 cm breit 80—100 | 2,50 | 22,50 | |
| **aspera** (Don.), **Neueinführung!** | | | | |
| Westchina. Mittelstark wachsender Strauch, der mit seinen großen, bis 23 cm langen, rauhborstigen Blättern an H. sargentiana erinnert. Er fällt im hohen Maße durch seine an langen Stielen sitzenden, großen, blaufilzigen Blütenknospen auf, aus denen sich große prachtvolle, porzellanblaue, flachangeordnete Blütendolden bilden. . . . . | 50—60 | 4,50 | 36,— | |
| **cinerea sterilis** (Rehd.) **R** | | | | |
| Blüten sämtlich steril, in grünlichweißen, 8—15 cm breiten Doldentrauben, Juni-August. . . . . | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Starke Büsche,** 3 × verpfl. Mit Ballen. | Höhe u. Breite 80—100 | 2,50 | | |
| **japonica Impératrice Eugénie** (Hort.) **R** | | | | |
| Bis 1,50 m hoch werdender Strauch mit **flachen Blütendolden,** deren Randblüten rosa und fertile Innenblüten lila-blau gefärbt sind. Eine sehr zu empfehlende Sorte. Mit Ballen | 40—60 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **macrophylla excelsior** (Hort.), **Neuheit!** **R** | | | | |
| Wird bis 2 m hoch, Triebe gut verholzend. Blüten in halbkugelförmigen, sterilen Dolden, kräftig rosa. Mit Ballen | 40—60 | 1,30 | 12,— | |
| **opuloides acuminata,** siehe H. serr. acuminata | | | | |
| **paniculata grandiflora** (Sieb.), **Rispenhortensie** **R** | | | | |
| Bis über 2 m hoher, reichblühender, winterharter Strauch mit großen, weißen Blütenrispen von Juli-September. | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 80—100 | 3,75 | 34,— | |
| | 100—120 | 4,50 | 40,— | |
| **petiolaris,** siehe unter Schlingpflanzen | | | | |
| **scandens,** siehe unter H. petiolaris | | | | |
| **serrata acuminata** (Wil.), (H. opuloides acuminata, Dipp.) **R** | | | | |
| Bis 1,50 m hoher Strauch mit **flachen Blütendolden,** deren Randblüten rosa und fertile Innenblüten lila-blau gefärbt sind. Mit Ballen | 40—60 | 1,30 | 12,— | |
| **„ Blue Bird** (Hort.), **Neuheit!** **R** | | | | |
| Bis 1 m hoher Strauch, Blüten violett, äußerer Rand steril, mit großen, lilaroten Petalen. Mit Ballen | 40—60 | 1,30 | 12,— | |
| **Hypericum** (L.) - Johanniskraut, Hartheu - GUTTIFERAE | | | | |
| **calycinum** (L.) **I, S, St, W** | | | | |
| Kleinasien, wintergrüner, Ausläufer treibender, bis 30 cm hoher Halbstrauch mit 4—5 cm breiten, goldgelben Blüten, Juli bis August. Wertvolle schattenliebende **Bodenbedeckungspflanze.** Mit Ballen | 10—15 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| | 15—20 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 20—30 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 30—40 | 1,15 | 10,— | 90,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Hypericum** (Fortsetzung) | | | | |
| **hybr. Sonnengold, Neuheit!** **I, S, St, W** | | | | |
| Bis 90 cm hoch und 60 cm breit werdender, winterharter Strauch, der sich H. pat. henryi gegenüber **durch größere Blüten und durch höhere Blühwilligkeit auszeichnet.** Mit Ballen | 20—30 | 1,30 | 12,— | |
| | 30—40 | 1,70 | 15,— | |
| **moserianum** (André), (H. calycinum x patulum) **I, S, St, W** | | | | |
| Bis 40 cm hoch werdender Halbstrauch mit bis zu fünf vereinten, goldgelben Blüten, Juli bis August. **Wertvolle, schattenliebende Bodenbedeckungspflanze.** Mit Ballen | 30—40 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **patulum henryi** (Bean.) **S** | | | | |
| Himalaja, bis 1,50 m hoher, reich verzweigter, rundlich wachsender Strauch mit zahlreichen 5 cm breiten, gelben Trugdolden im Juli-September. Mit Ballen | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Iberis,** siehe unter Stauden | | | | |
| **Ilex** (L.) - Hülse, Stechpalme - AQUIFOLIACEAE **(meist zweihäusig)** | | | | |
| **aquifolium** (L.) **B, F, I, R, S** | | | | |
| Europa, Persien, China, bis 10 m hoher, heimischer, baumartiger, immergrüner und regelmäßig pyramidal wachsender Strauch mit glänzenden, dunkelgrünen Blättern, die am Rand dornig gezähnt sind. Frucht leuchtendrot. **Liebt kräftigen Boden und Schatten.** Mit Ballen 40—60 cm breit | 40—60 | 3,90 | 33,— | 300,— |
| | 60—80 | 6,— | 50,— | 450,— |
| | 80—100 | 7,50 | 66,— | 600,— |
| 65—100 cm breit | 100—125 | 11,50 | 90,— | 825,— |
| | 125—150 | 16,50 | 135,— | 1200,— |
| | 150—175 | 21,— | 188,— | |
| | 175—200 | 25,50 | 225,— | |
| | 200—225 | 30,— | 270,— | |
| „ **angustifolia** (Moore) **I, R, S** | | | | |
| Schwach und pyramidal wachsender Strauch mit kleinen, schmalen, lanzettlichen, tief dunkelgrünen Blättern. Mit Ballen 50—70 cm breit | 60—80 | 6,— | 50,— | |
| | 80—100 | 7,50 | 66,— | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| „ **J. C. van Tol** (Hort.), (I. aquif. polycarpa, Hendr.) **E, H, I, R, S** | | | | |
| Fast stachelloses, glänzend dunkelgrünes Blatt. Gleich wertvoll für Solitär- und Heckenpflanzen. Mit Ballen. 40—60 cm breit | 60—80 | 6,— | 50,— | 450,— |
| | 80—100 | 7,50 | 66,— | 600,— |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | 825,— |
| 50—70 cm breit | 125—150 | 16,50 | 135,— | |
| | 150—175 | 21,— | 188,— | |
| | 175—200 | 25,50 | 225,— | |
| „ **Golden Queen** **I, L, R, S** | | | | |
| Eine buntblättrige Sorte, die sich besonders durch ihre gesunde und farbfeste goldgelbe Färbung auszeichnet. **Gut für Dekorationszwecke!** Mit Ballen | 60—80 | 6,75 | | |
| | 80—100 | 9,— | | |
| „ **pyramidalis** (Dipp.) **E, F, I, R, S** | | | | |
| Form von pyramidalem Wuchs mit meist ganzrandigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. **Zeichnet sich durch besonders starken Fruchtansatz aus.** Mit Ballen | 80—100 | 7,50 | 66,— | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 16,50 | 135,— | |
| „ **White Queen** **I, L, R, S** | | | | |
| Eine wüchsige Sorte mit glänzenden, gesunden, weißlich-bunten Blättern. **Gut für Dekorationszwecke!** Mit Ballen | 60—80 | 6,75 | | |
| | 80—100 | 9,— | | |
| **crenata** (Thunb.) **E, H, I, R, S** | | | | |
| Japan, bis 2 m hoher, frostharter, immergrüner und dichtblättriger Strauch mit kleinen, dunkelgrünen, buxusähnlichen Blättern und schwarzen Früchten. **Eine wertvolle, aparte und zierliche Heckenpflanze.** Mit Ballen | 40—60 | 3,20 | 26,— | |
| | 60—80 | 4,30 | 36,— | |
| | 80—100 | 6,50 | 54,— | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 80—100 | 18,— | | |
| | 100—125 | 22,50 | | |
| 100—125 cm breit | 80—100 | 22,50 | | |
| | 100—125 | 27,— | | |
| **fargesii** (Franch.) **E, I, R, S** | | | | |
| Westchina, bis 6 m hoher, aufrecht wachsender, immergrüner Strauch mit lanzettlichen, 6—12 cm langen, gesägten, oben stumpfgrünen Blättern. Frucht in roten Büscheln. Ein sehr wertvolles und **absolut frosthartes, dekoratives Solitärgehölz.** Mit Ballen | 100—125 | 10,— | | |
| | 125—150 | 15,— | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 350—400 | 60,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Ilex** (Fortsetzung) | | | | |
| **glabra** (Gray.), (Prinus glaber, L.) **E, I, S** | | | | |
| Östliche Vereinigte Staaten, bis 1,50 m hoch werdender, feinzweigiger, dicht und buschig wachsender, halbimmergrüner Strauch mit im Sommer heller und im Winter dunkelgrüner Belaubung. **Ist in Verbindung mit Andromeda besonders in schattigen Lagen sehr zu empfehlen.** Mit Ballen. Breite und Höhe | 80—100 | 7,50 | | |
| **pernyi** (Franch.) **E, I, R, S** | | | | |
| Mittel- und Westchina, bei uns nur schwach und kompakt wachsender, immergrüner, frostharter Strauch mit kleinen, 2 bis 3 cm langen, glänzenden, stachelspitzigen Blättern. Durch seine **frische und interessante Belaubung** | 60—80 | 6,— | 50,— | |
| **ein wertvolles Schattengehölz.** Mit Ballen | 80—100 | 7,50 | 66,— | |
| **Indigofera** (L.) - Indigostrauch - LEGUMINOSAE | | | | |
| **gerardiana** (Wall.), (I. dosua, Ld.) **St, W** | | | | |
| Himalaja, bis 1 m hoher Halbstrauch mit zierlicher Belaubung und mit im Juli-September blühenden, purpurrosafarbenen, bis 15 cm langen, aufrecht. Blütentrauben. | 40—60 | 2,25 | | |
| **Jasminum** (L.) - Echter Jasmin - OLEACEAE | | | | |
| **beesianum** (Forrest & Diels.) **W** | | | | |
| Westchina, bis 1,50 m hoher, leicht schlingender, ausläufertreibender Strauch mit leuchtend karminroten, duftenden Blüten im Mai. Mit Ballen | 40—60 | 1,50 | 13,50 | |
| **nudiflorum** (Ldl.) **R** | | | | |
| China, bis 5 m hoch werdender, frühblühender Strauch mit schlanken, überhängenden, **grünen Zweigen.** Die goldgelben, achselständigen Blüten erscheinen je nach Witterung im Februar bis April. **Wertvollster Vorfrühjahrsblüher,** besonders zur Wandbekleidung in geschützter | 40—60 | 1,70 | 15,— | |
| Lage. Mit Ballen | 60—80 | 2,50 | 22,50 | |
| **Juglans** (L.) - Walnuß - JUGLANDACEAE | | | | |
| **cordiformis,** siehe J. sieboldiana cordiformis | | | | |
| **mandschurica** (Maxim.) | | | | |
| Mandschurei, in der Heimat bis 20 m hoher, breit- bis rundkroniger, außerordentlich schattenverträglicher Baum für beste Bodenverhältnisse, der sich bei uns jedoch nur | 125—150 | 2,50 | 22,50 | |
| bis zu einem strauchartigen Halbbaum entwickelt. | 150—200 | 3,30 | 30,— | |
| **Heister,** mit natürlicher seitlicher Bezweigung . . | 200—250 | 4,10 | 37,50 | |
| **nigra** (L.), **Schwarznuß** | | | | |
| Nordamerika, bis über 40 m hoher Baum, mit großer, breitrunder Krone. Blätter bis 50 cm lang und gefiedert. **Wundervoller Parkbaum für genügend tiefgründige u. feuchte** | 125—150 | 2,50 | 22,50 | |
| **Lagen und einer unserer wertvollsten Hartholzlieferanten.** | 150—200 | 3,30 | 30,— | |
| **Heister,** mit natürlicher seitlicher Bezweigung . . | 200—250 | 4,10 | 37,50 | |
| 3 × verpflanzt, auf Wunsch mit Ballen + 25 % | 300—350 | 10,— | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. Stammumfang | 12—14 | 12,50 | | |
| **regia** (L.), **Walnuß.** Siehe auch Obstbäume Seite 7 | | | | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Mit vollem Wurzelwerk, feucht verpackt. Auf Wunsch mit Ballen + 25 %. Stammhöhe 175 cm. Kronendurchmesser 200 cm, Kronenhöhe 250—300 cm. Stammumfang | 18—20 | 33,— | | |
| **sieboldiana cordiformis** (Maxim.), (J. cordiformis, Maxim.) | | | | |
| Japan, bis 15 m hoher Baum, mit bräunlich behaarten Zweigen. Nuß stark zusammengedrückt, herzförmig, scharf zugespitzt. | | | | |
| **Heister,** mit natürlicher seitlicher Bezweigung . . | 80—125 | 1,50 | 13,50 | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 225-275 cm, | 20—25 | 50,— | | |
| Kronendurchm. 250—300 cm, Kronenhöhe 250—300 cm. | 25—30 | 60,— | | |
| Stammumfang | 30—35 | 82,50 | | |
| | 35—40 | 112,— | | |
| **Kalmia** (L.) - Lorbeerrose, Kalmie - ERICACEAE | | | | |
| **angustifolia rubra** (Lodd.), **Neueinführung!** **I, S, St** | | | | |
| Nordamerika, bis 1 m hoher, immergrüner Strauch mit frischgrünen, lanzettlichen, 2—6 cm langen Blättern und zahlreichen, breitglockigen, dunkelroten Blüten im Juni- | 30—40 | 3,— | | |
| Juli. Mit Ballen | 40—50 | 3,75 | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Kalmia** (Fortsetzung) | | | | |
| **latifolia** (L.) **E, I, S, St** | | | | |
| Nordamerika, bis 2 m hoher, immergrüner Strauch mit glänzenden, 5—10 cm langen, dunkelgrünen Blättern. Die zahlreichen und besonders schönen endständigen, breitglockigen Doldentrauben im Mai-Juni sind karminrosa gefärbt. Bekannteste und **wertvollste Art für Einzelstellung in schattigen Lagen.** Mit Ballen | 30—40 | 3,75 | 30,— | |
| | 40—50 | 4,50 | 37,50 | |
| | 50—60 | 6,— | 50,— | |
| **Kerria** (DC.) - Kerrie, Ranunkelstrauch - ROSACEAE | | | | |
| **japonica** (DC.) **S** | | | | |
| China, sommergrüner, bis 2 m hoch werdender, schattenverträglicher Strauch mit einfach gelben, endständigen Blüten für **nährstoffreiche** Böden. Blütezeit Mai-Juni. | 40—60 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| „ **pleniflora** (Witte.) **S** | | | | |
| Blüten gefüllt; Wuchs aufrecht und kräftiger als beim Typ. . . . . | 60—80 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—120 | 4,50 | | |
| **Koelreuteria** (Laxm.) - Blasenbaum, Koelreuteria - SAPINDACEAE | | | | |
| **paniculata** (Laxm.) **E** | | | | |
| China, Korea, Japan, bis 10 m hoher Baum mit meist doppelt gefiederten, 35 cm langen, tiefgrünen Blättern. **Baum ist häufig schiefstämmig und zeigt eine fächerförmige, ausgebreitete Krone.** Blüten gelb in lockeren, bis 30 cm langen Rispen im Juli-August. Frucht in aufgeblasenen Kapseln. . . . . | 80—100 | 2,50 | 22,50 | |
| | 100—125 | 3,— | | |
| **Kolkwitzia** (Graebn.) - Kolkwitzie - CAPRIFOLIACEAE | | | | |
| **amabilis** (Graebn.), **Neueinführung!** **E, S** | | | | |
| China, reichverzweigter, locker wachsender, bis 2 m hoch werdender, völlig winterharter und schattenverträglicher Blütenstrauch mit der Tracht einer Weigelie, jedoch noch **viel zierlicher.** Zur Blütezeit Mai-Juni ist der ganze Strauch von glockigen, rosafarbenen Doldentrauben bedeckt. Dieser leider noch zu wenig bekannte Strauch kann als einer unserer **wertvollsten Gehölzneuheiten** bezeichnet werden und ist vorzüglich zur Einzelstellung. Um eine möglichst reiche und volle Blüte zu erreichen, empfiehlt es sich, diese nicht auf allzu nährstoffreichen Boden zu pflanzen. | 60—80 | 2,— | 18,— | 160,— |
| | 80—100 | 2,60 | 24,— | 220,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—125 cm breit | 100—125 | 5,— | 45,— | |
| | 125—150 | 5,60 | 52,50 | |
| **Laburnum** (Med.) - Goldregen - LEGUMINOSAE | | | | |
| **alpinum** (B. & P.), **Alpengoldregen** **B, R, S** | | | | |
| Südfrankreich bis Siebenbürgen, bis 10 m hoher, baumartiger, besonders frostharter Strauch für **nährstoffreiche,** kalkhaltige Böden. **Wuchs wie bei L. vulgare; jedoch zwei Wochen später in der Blüte,** die auch etwas mehr dunkelgelb gefärbt ist. Gut geeignet **für Treibereizwecke** 3—4 Triebe | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 80—100 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| | 100—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,25 | 20,— | |
| 5—8 Triebe | 80—100 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| | 125—150 | 2,50 | 22,50 | |
| | 150—200 | 3,— | 27,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 10,— | | |
| | 200—250 | 12,— | | |
| „ **pendulum** (Loud.) | | | | |
| Eine sehr frostresistente, wüchsige Hängeform. **Halbstämme,** Stammhöhe | 100—120 | 6,40 | 60,— | |
| **anagyroides,** siehe L. vulgare | | | | |
| **vulgare** (B. & P.), (L. anagyroides, Med.) **B, R, S** | | | | |
| **Gemeiner Goldregen** | | | | |
| Südeuropa, bekannter, 5—6 m hoch werdender Strauch. Blüten in hängenden, bis über 20 cm langen Trauben im Mai-Juni. 3—4 Triebe | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 125—175 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 175—225 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| 5—8 Triebe | 80—125 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| | 125—175 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 175—225 | 2,— | 18,50 | 170,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Laburnum** (Fortsetzung) | | | | |
| **watereri** (Dipp.), (L. anagyroides x alpinum) **B, R, S** | | | | |
| Triebe kahl; Blätter schwächer behaart als bei L. vulgare. Blüten hellgoldgelb, Mai-Juni. **Blütentrauben oft über 40 cm lang.** | 80—100 | 2,50 | 22,50 | |
| 2—4 Triebe | 100—150 | 3,— | 27,— | |
| 5—8 Triebe | 80—100 | 3,— | 27,— | |
| | 100—150 | 3,75 | 34,— | |
| „ **vossii** (Boom.) **B, E, R, S** | | | | |
| Zeichnet sich durch besonderen Blütenreichtum und durch die **40—50 cm lang werdenden Blütentrauben** aus. Mai-Juni. Triebe sind etwas behaart. 2—4 Triebe | 80—125 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 125—175 | 3,— | 27,— | |
| 5—8 Triebe | 80—125 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 125—175 | 3,75 | 34,— | |
| **Lavandula officinalis,** siehe unter Stauden | | | | |
| **Ledum** (L.) - Sumpfporst - ERICACEAE | | | | |
| **palustre** (L.) **S, St** | | | | |
| Nordeuropa, Nordasien, bis 100 cm hoch werdender, aufrecht wachsender Strauch mit in dichten Büscheln stehenden, weißen Blüten, Mai bis Juni. Liebt anmoorige Lagen. | 20—30 | 1,90 | | |
| | 30—40 | 2,25 | | |
| Mit Ballen | 40—60 | 3,— | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 6,60 | | |
| **Lespedeza** (Mchx.) - Buschklee - LEGUMINOSAE | | | | |
| **bicolor** (Turcz.) **St** | | | | |
| Nordchina, Japan, Halbstrauch, bis 3 m hoch, aufrecht wachsend, Blüten purpurrosa, in 4—8 cm langen, achselständigen Trauben, zu großen, endständigen Rispen vereint, Juli-September. . . . . | | 1,90 | 17,— | |
| **formosa** (Koehne), (L. thunb., Nakai.; Desmodium penduliflorum, Ouden) **St, W** | | | | |
| Nordchina, Japan, bis 2 m hoher, lang überhängender, sehr wertvoller **Spätsommerblüher** mit bis 20 cm langen, überhängenden, purpurrosa Blütentrauben. . . . . | | 1,90 | 17,— | |
| **Leucothoe** - Lorbeerkrüglein - ERICACEAE | | | | |
| **axillaris** (D. Don.), (Andromeda axillaris, Lam.) **I, L, R, S** | | | | |
| Südöstl. Ver.-Staat., immergrüner, bis 2 m hoher Strauch mit glänzend grüner Belaubung. Blüten in 2—7 cm langen, weißen Trauben; Ende April-Juni, **unterscheidet sich von L. catesbaei durch graziöseren und langsameren Wuchs.** Mit Ballen | 30—40 | 2,25 | 19,— | |
| **catesbaei** (Grey.), (Andromeda catesbaei, Walt.) **I, L, R, S** | | | | |
| Südöstliche Vereinigte Staaten, Strauch mit glänzend dunkelgrüner, im Winter braunroter, lorbeerartiger Belaubung. **Ein sehr guter Schattenstrauch,** der 1—2 m hoch wird. Zweige ergeben wertvolles **Bindematerial.** Blüte weiß, Mai-Juni. | 40—60 | 3,40 | 28,— | |
| Mit Ballen | 60—80 | 5,50 | 46,— | |
| **Ligustrum** (L.) - Rainweide, Liguster - OLEACEAE | | | | |
| **lodense** (Hort.), (L. vulgare nanum, Rehd.) **e, H, R** | | | | |
| Sommergrüner, niedrigbleibender und reichverzweigter Strauch, der besonders für **niedrige Hecken** geeignet ist, Belaubung graugrün. | 30—40 | 0,50 | 4,10 | 37,50 |
| | 40—50 | 0,65 | 5,25 | 49,— |
| | 50—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **obtusifolium regelianum** (Koehne) **E, R** | | | | |
| Japan, bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit horizontal abstehenden, lebhaft grünen Zweigen und dichten weißen Blütenrispen im Juni-Juli, Herbstfärbung stahlblau; läßt sich auch als **ungeschnittene Heckenpflanze sehr gut verwenden.** | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **ovalifolium** (Hassk.) **H, I, R, S** | | | | |
| Japan, wintergrüner Strauch, Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün, vorzügliche schattenverträgliche Heckenpflanze. | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 100 St. DM | 1000 St. DM |
| 3jährig bew. Steckl. 5—8 Triebe | 50—80 | 0,25 | 16,50 | 150,— |
| 5—8 Triebe | 80—100 | 0,30 | 20,— | 188,— |
| verpflanzte Büsche 3—4 Triebe | 40—60 | 0,15 | 10,— | 90,— |
| 3—4 Triebe | 60—80 | 0,20 | 12,50 | 112,— |
| verpflanzte Büsche 5—8 Triebe | 40—60 | 0,30 | 19,— | 165,— |
| 5—8 Triebe | 60—80 | 0,35 | 22,50 | 200,— |
| 5—8 Triebe | 80—100 | 0,40 | 25,— | 225,— |
| verpflanzte Büsche 8—12 Triebe | 60—80 | 0,40 | 27,— | 250,— |
| 8—12 Triebe | 80—100 | 0,40 | 30,— | 270,— |
| 8—12 Triebe | 100—125 | 0,45 | 37,50 | 330,— |

**Ligustrum** (Fortsetzung)

| | | | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **vulgare** (L.), **Gemeine Rainweide** | | **H, R, S** | | | | |
| Europa, Nordafrika, ebenso gut als Heckenpflanze, wie zur Bepflanzung von sonnigen und schattigen Böschungen. | | | | | | |
| 3jährig bew. Steckl. | 5—8 | Triebe | 50—80 | 0,25 | 16,50 | 150,— |
| | 5—8 | Triebe | 80—100 | 0,30 | 20,— | 188,— |
| verpflanzte Büsche | 3—4 | Triebe | 40—60 | 0,15 | 10,— | 90,— |
| | 3—4 | Triebe | 60—80 | 0,20 | 12,50 | 112,— |
| verpflanzte Büsche | 5—8 | Triebe | 40—60 | 0,30 | 18,50 | 165,— |
| | 5—8 | Triebe | 60—80 | 0,35 | 22,50 | 200,— |
| | 5—8 | Triebe | 80—100 | 0,40 | 25,— | 225,— |
| verpflanzte Büsche | 8—12 | Triebe | 60—80 | 0,40 | 27,— | 250,— |
| | 8—12 | Triebe | 80—100 | 0,40 | 30,— | 270,— |
| | 8—12 | Triebe | 100—125 | 0,45 | 37,50 | 330,— |
| „ **atrovirens** (Hort.) | | **H, R, S** | | | | |
| Völlig winterharter, wintergrüner Heckenstrauch mit dunkelgrüner Belaubung. | | | | | | |
| 3jährig bew. Steckl. | 5—8 | Triebe | 30—50 | 0,25 | 18,50 | 165,— |
| | 5—8 | Triebe | 50—80 | 0,30 | 20,— | 188,— |
| | 5—8 | Triebe | 80—100 | 0,35 | 25,— | 225,— |
| verpflanzte Büsche | 3—4 | Triebe | 40—60 | 0,20 | 12,50 | 112,— |
| | 3—4 | Triebe | 60—80 | 0,25 | 17,— | 150,— |
| verpflanzte Büsche | 5—8 | Triebe | 40—60 | 0,35 | 25,— | 225,— |
| | 5—8 | Triebe | 60—80 | 0,40 | 28,50 | 255,— |
| | 5—8 | Triebe | 80—100 | 0,40 | 31,50 | 285,— |
| verpflanzte Büsche | 8—12 | Triebe | 40—60 | 0,40 | 31,50 | 285,— |
| | 8—12 | Triebe | 60—80 | 0,45 | 34,50 | 315,— |
| | 8—12 | Triebe | 80—100 | 0,50 | 41,— | 360,— |
| „ **glaucum** (Mouil.) | | **H, R, S** | | | | |
| Wuchs straff aufrecht. Belaubung blaugrün. | | | | | | |
| 3jährig bew. Steckl. | 5—8 | Triebe | 50—80 | 0,25 | 16,50 | 150,— |
| | 5—8 | Triebe | 80—100 | 0,30 | 20,— | 188,— |
| verpflanzte Büsche | 3—4 | Triebe | 40—60 | 0,15 | 10,— | 90,— |
| | 3—4 | Triebe | 60—80 | 0,20 | 12,50 | 112,— |
| | 3—4 | Triebe | 80—100 | 0,25 | 16,50 | 150,— |
| verpflanzte Büsche | 5—8 | Triebe | 60—80 | 0,35 | 22,50 | 200,— |
| | 5—8 | Triebe | 80—100 | 0.40 | 25,— | 225,— |
| verpflanzte Büsche | 8—12 | Triebe | 60—80 | 0,40 | 27,— | 250,— |
| | 8—12 | Triebe | 80—100 | 0,40 | 30,— | 270,— |
| | 8—12 | Triebe | 100—125 | 0,45 | 37,50 | 330,— |
| „ **nanum**, siehe L. lodense | | | | | | |

## Liquidambar (L.) - Amberbaum - HAMAMELIDACEAE

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **styraciflua** (L.) **E, L** | | | | |
| Nordamerika, bis 45 m hoher, lichtbedürftiger Baum mit **rotbraunen, korkigen Zweigen** und herzförmig gelappten, dunkelgrünen Blättern, die sich im Herbst durch ihre herrliche, **langanhaltende purpur-violette Färbung besonders hervorheben.** Sehr wertvoller Einzelbaum **für besonders feuchte und nährstoffhaltige Böden.** Mit Ballen | 40—60 | 3,40 | 30,— | |
| | 60—80 | 4,20 | 37,50 | |
| | 80—100 | 5,60 | 52,50 | |
| | 100—125 | 7,50 | 67,50 | |
| | 125—150 | 9,40 | | |
| | 150—175 | 12,— | | |

## Liriodendron (L.) - Tulpenbaum - MAGNOLIACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **tulipifera** (L.) **E, R** | | | | |
| Nordamerika, bis 25 m hoher, gradstämmiger Baum mit lockerer Krone und langgestielten, eckig gelappten, großen Blättern, die sich zum Herbst schön goldgelb färben. Blüten tulpenähnlich, gelblichgrün, Juni-Juli. **Einer unserer schönsten und interessantesten Parkbäume** für tiefgründige, nährstoffhaltige Böden. Mit Ballen | 60—80 | 3,40 | 30,— | |
| | 80—100 | 4,20 | 37,50 | |
| | 100—125 | 5,60 | 52,50 | |
| | 125—150 | 7,50 | | |
| | 150—175 | 11,— | | |
| | 175—200 | 13,— | | |

## Lonicera (L.) - Heckenkirsche - CAPRIFOLIACEAE

**Schlingende Sorten,** siehe unter Schlingpflanzen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **alpigena** (L.) **F** | | | | |
| Berge Mittel- und Südeuropas, bis 2 m hoher Strauch, Blüten bräunlich, im Mai, Früchte glänzend dunkelrot. | 30—50 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **coerulea** (L.) **B, H, R, S** | | | | |
| Europa bis Japan, bis 1,50 m hoher, schattenverträglicher Strauch mit gelblichweißen Blüten, April-Mai, und straffem, aufrechtem Wuchs. Frucht dunkelblau bereift. . . | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **involucrata** (Banks.) **B, R, S** | | | | |
| Westliches Nordamerika, aufrecht wachsender, bis 2 m hoher Busch mit leicht kantigen Zweigen und frischgrüner Belaubung. Im Mai bis Juni erscheinen die sehr dekorativen, 1½ cm langen, röhrenförmigen, gelben Blüten. Frucht kaum erbsengroß, glänzend schwarzrot . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Lonicera** (Fortsetzung) | | | | |
| **korolkowii floribunda** (Nichols.) **B, E, R** Turkestan, bis 3 m hoher, breit aufrecht wachsender Strauch mit **leicht überhängenden Zweigen.** Blätter sind silbriggraugrün gefärbt. Blüten rosa, Mai-Juni. Wertvoller Einzelstrauch. | 80—125 | 0,75 | 6,75 | |
| **ledebourii** (Esch.) **B, R, S** Kalifornien, breit aufrechtwachsender, bis 2 m hoch werdender, wertvoller Strauch mit tiefgelben, braunrot überlaufenen, röhrigen Blüten im Mai bis Juni, Früchte schwärzlichrot. **Schönes Solitärgehölz.** | 80—125 | 0,90 | 8,25 | |
| **maackii** (Maxim.) **B, E, F, R** Korea, Mandschurei, bis 5 m hoch werdender, breit und aufrecht wachsender Strauch mit schirmförmig, leicht nach unten geneigten Zweigen, die Ende Mai-Juni überreich mit wohlriechenden, gelblichweißen Blüten besetzt sind. Dieser **malerisch wachsende Strauch** zeigt sich jedoch erst zum Herbst in seiner vollen Pracht, wenn die Zweige dicht mit glänzend leuchtendroten Beeren besetzt sind. **Dieser leider noch viel zu wenig bekannte Strauch** verdient auch als billiger Einzelstrauch verwandt zu werden. | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **morrowii** (A. Gray) **B, E, F, R** Japan, bis 2 m hoch werdender Strauch mit weit ausladenden, weich behaarten Zweigen, die mit gelblichweißen Blüten im Mai-Juni besetzt sind. Früchte blutrot. Wertvoller Einzelstrauch. | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **nigra** (L.) **B, R, S** Korea, aufrecht wachsender, schattenliebender Strauch mit trübrosa Blüten im Mai-Juni und schwärzlichblauen Früchten. Liebt feuchte Standorte | 80—125 | 0,90 | 8,25 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 125—150<br>150—200 | 5,—<br>5,60 | | |
| **nitida** (Wils.) **e, H, I, R, S, St** Mittelchina, niedriger, bis 1,50 m hoch werdender, schattenliebender, immergrüner Strauch mit kleiner, myrtenartiger Belaubung und rahmweißen Blüten. Früchte purpurblau. | 30—40 | 1,15 | 9,50 | 82,50 |
| Mit Ballen | 40—60 | 1,35 | 11,50 | 100,— |
| **pileata** (Oliv.) **e, H, I, R, S, St** Mittelchina, immergrüner, niedrig und ausgebreitet wachsender, schattenliebender Strauch mit violetten Beeren. | 30—40 | 1,15 | 9,50 | 82,50 |
| Mit Ballen | 40—60 | 1,35 | 11,50 | 100,— |
| „ **yunnanensis** (Rehd.), (L. nitida x pileata) **e, H, I, R, S, St** Immergrüne, mehr hoch und breit wachsende Form, die sich auf Grund ihrer Schattenverträglichkeit sehr zu **Unterpflanzungen** eignet. | 20—30 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 30—40 | 1,15 | 9,50 | 82,50 |
| | 40—60 | 1,35 | 11,50 | 100,— |
| Mit Ballen | 60—80 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **spinosa albertii** (Rehd.) **E** Turkestan, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen und blaugrünen, länglichen Blättern. Die duftenden, lilarosa Blüten erscheinen im Mai-Juni. | 60—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **tatarica** (L.) **B, H, R, S** Südrußland, Asien, aufrechtwachsender, bis 3 m hoch werdender, früh austreibender Deck- und Schattenstrauch mit weißlich bis roten Blüten, Mai-Juni. | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 150—175 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **pulcherrima** (Regel.) **B, H, R, S** Karminrote Blüten mit hellem Rand. | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **xylosteum** (L.) **B, H, R, S** Europa bis Altai, heimischer, **anspruchsloser Schatten- und Deckstrauch** mit gelblichweißen Blüten im Mai-Juni, der sich auch gut für einfache Hecken eignet. | 70—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **Lycium** (L.) - Bocksdorn - SOLANACEAE | | | | |
| **chinense ovatum** (G. Schneid.), (L. rhombifolium, Dipp.) **B, F, H, R, S** China, Zweige wenig dornig, rutenförmig überhängend, Blätter eirhombisch, Blüten hellpurpurn, Mai-Oktober, Beeren korallenrot. Hervorragend zur **Böschungs- und Trümmerbegrünung geeignet.** | 100—150 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **halimifolium** (Mill.) (L. vulgare, Dun.) **B, F, H, R, S** Osteuropa, Ostasien, vielfach als L. europaeum bezeichnet, die hier nicht hart ist. Bis 3 m hoch werdend. Zweige schlank, bogenförmig überhängend, Blüten purpurlila von Mai-Oktober, Früchte korallenrot. **Hervorragend für Heckenpflanzung, Dünenbefestigung und zur Böschungs- und Trümmerbegrünung geeignet.** | 100—150 | 0,65 | 5,60 | 49,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Maackia** (Rups. & Maxim) - LEGUMINOSAE | | | | |
| **amurensis** (Rupr.), (Cladrastis amurensis, K. Koch) **E** | | | | |
| Mandschurei, bis 15 m hoher, **malerisch wachsender, schattenverträglicher Baum** mit breit abstehenden, weit überhängenden Zweigen und 30 cm langen, gefiederten, lebhaft grünen, hübsch silberweiß austreibenden Blättern und bis 20 cm langen, traubigen, grünlichweißen Blüten im Juli-August. . . . . | 80—100 | 2,50 | 22,50 | |
| | 100—125 | 3,— | | |
| **Magnolia** (L.) - Magnolie - MAGNOLIACEAE | | | | |
| **kobus** (Thunb.) **E, R** | | | | |
| Bis 10 m hoher Baum mit bis 10 cm breiten Blüten. Ist in der Jugend sehr wüchsig und gesund. Setzt erst als ältere Pflanze stark mit dem Blühen ein. Mit Ballen | 60—80 | 3,— | 27,— | |
| | 80—100 | 3,75 | 34,— | |
| | 100—125 | 4,50 | 40,— | |
| „ **borealis** (Sarg.) **E, R** | | | | |
| Bis 25 m hoher, pyramidal wachsender Baum mit bis 12 cm breiten, rein gelblichweißen Blüten im Mai-Juni. **Sie blüht schon als jüngere Pflanze sehr reich.** Mit Ballen | 100—125 | 9,50 | | |
| **parviflora** (S. & Z.) (M. sieboldii, K. Koch) **E, R** | | | | |
| Japan, Korea, mittelstark und breit wachsende Sorte für leicht sauren Boden mit frisch grünlichgelber, unten bläulich bereifter Belaubung. Überrascht vom **Frühsommer bis zum Herbst mit zahlreichen, schneeweißen Blütenblättern, wovon sich die rosa Staubgefäße schön abheben.** Mit Ballen | 60—80 | 6,— | 54,— | |
| | 80—100 | 9,— | 75,— | |
| | 100—125 | 12,— | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 150—200 cm breit | 150—175 | 24,— | | |
| | 175—200 | 30,— | | |
| | 200—225 | 37,50 | | |
| **sieboldii,** siehe M. parviflora | | | | |
| **soulangeana** (Soul.), (M. denudata x liliflora) **E, R** | | | | |
| Die großen, weißlichrosa gefärbten Blüten sind glockenförmig gestaltet und mit rötlichen Streifen versehen. Blütezeit April-Mai. Mit Ballen | 60—80 | 9,— | | |
| | 80—100 | 11,50 | | |
| | 100—125 | 15,— | | |
| | 125—150 | 22,50 | | |
| „ **alba superba** (Graebn.) **E, R** | | | | |
| Eine reinweiße, sehr frühblühende Verbesserung von M. soulangeana alba mit 3 Petalen. Mit Ballen | 60—80 | 9,— | | |
| | 80—100 | 11,50 | | |
| | 100—125 | 15,— | | |
| | 125—150 | 22,50 | | |
| „ **lennei** (Rehd.) **E, R** | | | | |
| Blumen umgekehrt glockig, außen purpurrosa, innen weiß, Petalen verkehrt-eiförmig, fleischig. Mit Ballen | 80—100 | 15,— | | |
| | 100—125 | 20,— | | |
| „ **nigra** (Nichols.) **E, R** | | | | |
| Wuchs aufrecht, Blüten schmal, lang, tief purpurrosa, ziemlich spät blühend, dunkelste von allen. Mit Ballen | 60—80 | 9,— | | |
| | 80—100 | 11,50 | | |
| | 100—125 | 15,— | | |
| **Extra starke Pflanzen.** Mit Ballen. 80 cm breit . . | 100—125 | 22,50 | | |
| „ **rubra** (Rehd.) **E, R** | | | | |
| Unterscheidet sich von M. lennei durch eine etwas hellere, mehr ins Rosa übergehende Blütenfarbe. Mit Ballen | 60—80 | 9,— | | |
| **stellata** (Maxim.), **sternblütige Magnolie** **E, R** | | | | |
| Japan, **langsamwachsender und dicht verzweigter Strauch,** der im März-April überreich blüht und sich im hohen Alter vereinzelt zu 6—8 m hohen Halbbäumen auswachsen kann. Mit Ballen | 40—60 | 9,— | | |
| | 60—80 | 11,50 | | |
| | 80—100 | 15,— | | |
| **Mahonia** (Nutt.) - Mahonie, Fiederberberitze - BERBERIDACEAE | | | | |
| **aquifolium** (Nutt.), (Berberis aquifol., Pursh) **B, H, I, R, S, St** | | | | |
| Nordamerika, bekannter, immergrüner Strauch mit glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben. Ist außerordentlich schattenverträglich und verträgt schweren Tropfenfall. Blüten in gelben, büscheligen Trauben im April- Mai. | 20—30 | 0,40 | 3,— | 26,— |
| **Leichte Büsche,** aus halbweitem Stand | 30—40 | 0,45 | 3,75 | 36,— |
| **Verpflanzte Büsche,** aus weitem Stand | 20—30 | 0,60 | 5,25 | 45,— |
| | 30—40 | 0,70 | 6,— | 52,50 |
| | 40—50 | 0,90 | 7,50 | 60,— |
| **Büsche,** mit Ballen | 20—30 | 0,95 | 7,50 | 67,50 |
| | 30—40 | 1,— | 9,— | 82,50 |
| | 40—50 | 1,15 | 10,50 | 94,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Mahonia aquifolium** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **atropurpurea** (Boom.), Neueinführung! **B, H, I, R, S, St** | | | | |
| Diese **gesunde Sorte** zeichnet sich im Herbst durch ihr purpurrotes Laub aus und wird daher gern von den Bindereien verwendet. **Büsche,** mit Ballen | 30—40<br>40—50 | 2,25<br>2,60 | 20,—<br>22,50 | |

**Malus** (Mill.) - Zierapfel, Kirschapfel - ROSACEAE

**B, E, F**

**Wohl kaum eine andere Gehölzgattung, außer Zierkirschen, gestattet in bezug auf Blütenreichtum, Wuchscharakter und Zierfrüchte eine so reiche Auswahl.** Die Früchte der Kirschäpfel können auch zu Gelee verarbeitet werden. Hochstämme liefern einen herrlichen, **kleinkronigen Alleebaum.**

## A. Zieräpfel mit schönem Blütenschmuck

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **arnoldiana** (Sarg.), (M. floribunda arnoldiana, Rehd.), (M. floribunda x baccata)<br>**Wuchs:** breit.<br>**Blüte:** April-Mai, größer als bei floribunda, einfach blaßrosa.<br>**Früchte:** gelb, 1 cm dick . . . . . | 100—125 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **atrosanguinea** (C. Schneid.), (M. floribunda atrosanguinea, Hort.), (M. halliana x rivularis)<br>**Wuchs:** bis 10 m hoher, baumartiger Strauch, mit zierlicher, überhängender, breitgewölbter Krone.<br>**Blüte:** Mai, karmesinrot, 2—3 cm breit, sehr reichblühend, Knospe scharlachrot. | 80—125 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Früchte:** eiförmig, 1 cm breit, rötlich-grün. | 125—175 | 2,25 | 20,— | 188,— |
| **communis** (DC.), **Wildapfel.** . . . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **coronaria charlottae** (Rehd.), Neuheit!<br>**Wuchs:** mittelstarkwüchsig.<br>**Blüte:** Mai-Juni. Zeichnet sich durch große, halbgefüllte, zartrosa, nach Veilchen duftende Blüten aus, **einer unserer schönsten Spätblüher; orangerote Herbstfärbung.** | 80—125 | 3,40 | 30,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **coronaria nieuwlandiana** (Slavin.), Neuheit!<br>**Wuchs:** bis 3 m hoch und breit.<br>**Blüte:** Die 3—4 cm breiten, intensiv rosa farbigen, gefüllten Blüten erscheinen sehr spät in großen hängenden Büscheln.<br>**Früchte:** Diese 1930 in Amerika wild aufgefundene Sorte trägt 4—5 cm breite, grüne Früchte. . . . . | 125—175 | 3,40 | 30,— | |
| **Dartmouth,** siehe unter **B.,** M. pumila Dartmouth | | | | |
| **floribunda** (Sieb.)<br>**Wuchs:** bis 10 m hoher, baumartiger Strauch, mit zierlich überhängender, breitgewölbter Krone.<br>**Blüte:** Mai, Blumen außen rosa, innen weiß, Knospe dunkelkarmin. . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 150—200 cm breit | 175—200 | 6,— | | |
| | 200—250 | 9,— | | |
| 250—300 cm breit | 200—250 | 34,— | | |
| „ **arnoldiana,** siehe M. arnoldiana | | | | |
| „ **atrosanguinea,** siehe M. atrosanguinea | | | | |
| „ **purpurea,** siehe M. purpurea | | | | |
| **hartwigii** (Koehne), (M. halliana x baccata)<br>**Wuchs:** Die dunkelbraunen Zweige zeigen einen breiten, aufrechten, säulenförmigen Wuchs, daher **gut als Straßenbaum zu verwenden.**<br>**Blüte:** Mai, die leicht gefüllten, langstieligen, rosa Blüten sind 4 cm breit.<br>**Früchte:** grünlich-orange, die Früchte hängen an 4 cm langen Stengeln. | | | | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |

| Malus (Zieräpfel mit schönem Blütenschmuck) (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **hillieri** (floribunda - Hybride), **Neuheit!** | | | | |
| **Wuchs:** wie floribunda, **stellt wegen ihres gesunden Laubes den besten Ersatz für Malus scheideckeri dar.** Eine unserer **wertvollsten Neuzüchtungen.** | | | | |
| **Blüte:** Der überreiche Blütenflor setzt im Mai-Juni ein, wobei sich die halbgefüllten, hellrosa Blüten von den dunkleren Knospen abheben. Zum Treiben gut geeignet. | 100—125 | 3,40 | 30,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **John Downing,** siehe unter **B.,** M. pumila John Downie | | | | |
| **kaido** (M. micromalus, Mak.) | | | | |
| **Wuchs:** kleiner, aufrecht wachsender Baum mit dunkelbraunen Zweigen. | | | | |
| **Blüte:** Die im April-Mai erscheinenden, bis 4 cm breiten, rosa Blüten stehen im schönen Kontrast zu den karmesinroten Knospen. | | | | |
| **Früchte:** kugelig, 1—1½ cm breit, rot. | | | | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **micromalus,** siehe M. kaido | | | | |
| **moerlandsii Profusion** (Hort.), (M. lemoinei x M. sieboldii), **Neuheit!** | | | | |
| **Wuchs:** breit, aufrecht. | | | | |
| **Blüte:** weinrot, etwas später als lemoinei. Ein früher reicher Blütenflor zeichnet diese Sorte besonders aus. | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 175—225 | 6,— | | |
| 150—200 cm breit | 250—300 | 9,— | | |
| **niedzwetzkyana,** siehe unter **B.,** M. pumila niedzwetzkyana | | | | |
| **purpurea** (Rehd.), (M. florib. purpurea, Barbier), (M. pumila niedzwetzkyana x M. atrosanguinea) | | | | |
| **Wuchs:** zeigt mit seinen langen, schwarzroten Zweigen einen sehr kräftigen Wuchs. | | | | |
| **Blüte:** Mai, 2,5 bis 3 cm, karminrot. | | | | |
| **Früchte:** langgestielt, blutrot, kirschengroß. . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 175—225 | 6,— | | |
| „ **aldenhamensis** (Rehd.) | | | | |
| **Wuchs:** als ältere Pflanze sehr schwach, Blätter beim Austrieb schwarzrot. | | | | |
| **Blüte:** etwa 10 Tage nach eleyi, halbgefüllt, purpurrosa, 3,5—4 cm breit, Knospen stark dunkelrot. | | | | |
| **Früchte:** rundlich, 1—2 cm breit, dunkelrot. . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| „ **lemoinei** (Rehd.) | | | | |
| **Wuchs:** breit, aufrecht, Belaubung dunkel-braunrot. | | | | |
| **Blüte:** Mai. Die sehr großen, lebhaft karminroten Blüten stehen in Büscheln. | | | | |
| **Früchte:** klein, dunkel purpurn. . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 175—225 | 6,— | | |
| 150—200 cm breit | 200—250 | 9,— | | |
| | 250—300 | 15,— | | |
| **sargentii** (Rehd.), **Neueinführung!** | | | | |
| **Wuchs:** Dieser sehr wertvolle, malerisch wachsende, oft dornige Strauch fällt durch seine dichte Zweigstellung und seine zierliche Belaubung auf, **läßt sich vorzüglich für undurchdringliche Hecken verwenden.** | | | | |
| **Blüte:** Die unregelmäßig herausragenden Zweigpartien sind überreich mit kleinen, weißlichgelben Blüten bedeckt. | | | | |
| **Früchte:** klein, gelblich-rot. . . . . | 80—125 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| 2 × verpflanzt, **extra stark,** aus doppeltweitem Stand. | 125—150 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| Auf Wunsch mit Ballen + 25 %. 80—100 cm breit | 150—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 5,25 | | |
| **scheideckeri** (Rehd.). Diese Sorte haben wir durch **M. hillieri** ersetzt, welche in vieler Beziehung wertvoller ist. | | | | |

| Malus (Zieräpfel mit schönem Blütenschmuck) (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **sieboldii Wintergold** (Rehd.), Neuheit! | | | | |
| **Wuchs:** Der bis 4 m hohe Strauch hat abstehende, leicht überhängende Äste. | | | | |
| **Blüte:** Die im Mai überreich erscheinenden, blaßrosa Blüten heben sich gut von den dunkelrosa Knospen ab. | | | | |
| **Früchte:** Die sich in großer Menge bildenden, goldgelben Früchte haften bis Dezember. . . . . | 125—175 | 3,40 | 30,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 150—175 | 3,30 | 30,— | |
| | 180—200 | 3,75 | 34,— | |

## B. Ausgewählte schönfrüchtige Kirschäpfel

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **prunifolia hybrida** (Hort., Timm & Co.). **Sehr wertvoll!** | | | | |
| **Wuchs:** aufrecht wachsender, kleiner Baum, bis 8 m hoch werdend, anspruchslos an jeden Boden, Belaubung mattgrün, sehr gesund. | | | | |
| **Blüte:** reinweiß, 3 cm Durchmesser. | | | | |
| **Früchte: im Herbst ist der Baum über und über mit 2,5 cm großen, gelborangeroten, wohlschmeckenden Früchten bedeckt.** Eignet sich vorzüglich zur Marmeladenbereitung. . . . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| Solitär, 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 175—250 cm breit | 175—200 | 15,— | | |
| | 200—250 | 20,— | | |
| 250—300 cm breit | 200—250 | 25,— | | |
| **pumila Dartmouth,** Neuheit! | | | | |
| Eine vorzügliche, noch wenig bekannte Sorte mit fast pflaumenförmig aussehenden, 4 cm langen, dunkelroten, bläulich bereiften Früchten. . . . . | 125—175 | 3,40 | 30,— | |
| „ **John Downie** | | | | |
| Diese überreich tragende Sorte zeigt 3 cm breite, orange bis rot gefärbte Früchte. . . . . | 125—150 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| „ **niedzwetzkyana** (Schneid.), (M. niedzwetzkyana, Dieck.) | | | | |
| Südwestsibirien, Turkestan. | | | | |
| **Wuchs:** Klein und sparrig mit braunroter Belaubung. | | | | |
| **Blüte:** April-Mai, bis 5 cm breit, dunkel- bis hellorangerot. | | | | |
| **Früchte:** Die 5—6 cm dicken, dunkelroten Früchte zeigen ein süßliches, stark rot durchzogenes Fleisch. . . | 125—175 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Sibirischer Wachs** | | | | |
| **Früchte:** groß, gelblich. . . . . | 125—150 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **zumi calocarpa** (Rehd.), (M. bacc. mandschurica x sieboldii), Neuheit! Japan. | | | | |
| **Wuchs:** Kleiner, aufrechtwachsender Baum. | | | | |
| **Blüte:** Die 2—3 cm großen, weißen Blüten heben sich schön von den rosa Knospen ab. | | | | |
| **Früchte:** Im Spätherbst ist der ganze Busch mit 1—1½ cm breiten, kugeligen, in dichten Büscheln sitzenden, roten Früchten übersät, die sich bis Dezember am Strauch halten. . . . . | 100—150 | 2,50 | 22,50 | |

### Mespilus (L.) - Mispel - ROSACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **germanica** (L.) | | | | |
| Südosteuropa, **breitausladender,** baumartiger Strauch, mit zottig-filzigen Zweigen, der im Mai durch seine schönen, bis zu 5 cm breiten, reinweißen Blüten auffällt und dessen Blätter sich im Herbst dunkelgelb bis braunrot färben; **läßt sich auch sehr gut als freistehender Strauch verwenden.** . . . . . | 80—125 | 2,60 | 24,— | |

### Morus (L.) - Maulbeerbaum - MORACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **alba** (L.) **H, S** | | | | |
| China, bis 15 m hoch werdender Baum mit hellgrünen Blättern und süßlichen, weißen, eßbaren Beeren. Die Blätter liefern das beste Futter für die Seidenraupen. | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

### Neillia (D. Don.) - Traubenspiere - ROSACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **affinis** (Hemsl.) **H, S** | | | | |
| Westchina, bis 2 m hoher, schattenverträglicher Strauch mit dichten, 2—8 cm langen, hängenden Blütentrauben im | 70—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| Mai-Juni, **vorzüglich für kleine Hecken geeignet.** . . . | 125—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Nepeta,** siehe unter Stauden | | | | |
| **Nothofagus** (Bl.) - Scheinbuche - FAGACEAE | | | | |
| **antarctica** (Oerst.) **L, R** | | | | |
| Chile, bis 3 m hoher Baum, der sich durch seine dunkelgrüne, kleine, unregelmäßig gewellte und gekerbte Belaubung und durch seinen **bizarren, malerischen Wuchs auszeichnet.** Ist als einzeln stehendes Gehölz von ganz besonderer Wirkung. Mit Ballen | 60—80 | 3,75 | | |
| | 80—100 | 5,25 | | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 100—125 | 7,50 | | |
| | 125—150 | 10,— | | |
| **Osmanthus** (Lour.) - Duftblüte - OLEACEAE | | | | |
| **illicifolius** (Mouill.) **E, I, R, W** | | | | |
| Japan, bis 6 m hoch werdender, straff aufrecht wachsender Strauch mit dornig gezähnten, glänzend dunkelgrünen Blättern und duftenden, weißen Blüten im Juni-Juli, liebt schattige Lage und verlangt Winterschutz. Mit Ballen | 40—50 | 3,75 | | |
| **Pachysandra,** siehe unter Stauden | | | | |
| **Paeonia** (L.) - Strauchpäonie, Pfingstrose - RANUNCULACEAE | | | | |
| **arborea** (Don.), (P. suffruticosa, Andr.; P. moutan, Sims.) **E, St** | | | | |
| Nordwestchina, **die hieraus entstandenen Züchtungen gehören mit zu den schönsten Frühjahrsblühern** und sollten in keinem Garten fehlen. Werden bis 2 m hoch, blühen Mai bis Juni und verlangen einen nährstoffhaltigen, warmen Boden. Sehr empfindlich gegen Spätfrost. | | | | |
| **Baronne d' Alès,** leuchtend rosa, gegen die Mitte dunkelrosa, Wuchs gedrungen. | | | | |
| **Beauté de Twickel,** karmesin mit dunkler Mitte. | | | | |
| **Blanche de His,** weiß-zartrosa. | | | | |
| **Mme. Stuart Low,** Blume sehr groß, leuchtend rosa. | | | | |
| **Souvenir de Ducher,** starker Wuchs, dunkelkarmesinrot. | | | | |
| 1jährige Vg. | | 4,20 | 37,50 | |
| 2jährige Vg. | | 6,— | | |
| **Parrotia** (C. A. M.) - Parrotie - HAMAMELIDACEAE | | | | |
| **persica** (A. M.) **E, L** | | | | |
| Nordpersien, bis 5 m hoher, **malerisch wachsender,** baumartiger Strauch für leicht sauren Boden, mit platanenartig abblätternder Rinde. Zweige aufrecht. **Laub im Herbst prächtig goldgelb bis scharlachrot. Wertvoller Einzelbaum.** | 60—80 | 5,25 | 47,50 | |
| Aus Ablegern gezogene Pflanzen. 3 × verpflanzt. | 80—100 | 6,— | 54,— | |
| Mit Ballen | 100—125 | 8,25 | | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 70—90 cm breit | 125—150 | 12,— | | |
| **Parthenocissus** (Ampelopsis), s. unter Kletterpflanzen | | | | |
| **Paulownia** (S. & Z.) - Blauglockenbaum - SCROPHULARIACEAE | | | | |
| **tomentosa** (Steud.), (P. imperialis, S. & Z.) **B, E, W** | | | | |
| Mittelchina, bis 15 m hoher, dickästiger Baum mit gegenständigen, bis 25 cm langen und breiten Blättern. Die violettgefärbten, innen gelb gestreiften, 5—6 cm langen Blüten sitzen an 10—15 cm langen, aufrechten, endständigen Rispen. Blüten erscheinen im April-Mai vor dem Blattaustrieb. **Ein edles und vielbewundertes Glanzstück in geschützter Lage im Park.** | 60—80 | 2,60 | | |
| | 80—100 | 3,40 | | |
| Aus 14-cm-Töpfen, mit Topfballen | 100—125 | 4,10 | | |
| Mit Ballen | 125—150 | 6,— | | |
| | 150—175 | 7,50 | | |
| **Pavia rubra,** siehe Aesculus pavia | | | | |
| **Pernettya** (Gaud.) - Torfmyrte - ERICACEAE | | | | |
| **mucronata alba** (Voss.) **F, I, St, W** | | | | |
| Chile, niedriger, bis 50 cm hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen, stachelspitzigen, glänzendgrünen Blättern. Besonders zierend sind die bis 12 mm dicken, weißen Früchte. Mit Ballen | 20—30 | 3,40 | 30,— | |
| | 30—40 | 3,75 | 34,— | |
| | 40—50 | 4,50 | 41,— | |
| Ohne Beeren. Mit Ballen | 30—40 | 2,50 | 22,50 | |

| | | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pernettya mucronata** (Fortsetzung) | | | | | |
| „ **purpurea** (Voss.) | **F, I, St, W** | 20—30 | 3,40 | 30,— | |
| Unterscheidet sich von P. mucr. alba durch die purpurvioletten Früchte. | Mit Ballen | 30—40 | 3,75 | 34,— | |
| | | 40—50 | 4,50 | 41,— | |
| | Ohne Beeren. Mit Ballen | 30—40 | 2,50 | 22,50 | |

## Phellodendron (Rupr.) - Korkbaum - RUTACEAE

**amurense** (Rupr.) **E, L**
Nordchina, Mandschurei, laubabwerfender, **zweihäusiger, malerischer, oft mehrstämmiger Parkbaum mit flachem Kronendach,** gefiederten Blättern und grauer, korkiger Rinde. Dieser spät austreibende Baum zeichnet sich durch eine sehr gesunde Belaubung aus. Herbstfärbung goldgelb. **Wertvoller Charakterbaum, bevorzugt freie und sonnige Lagen.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100—125 | 2,25 | 20,— | |
| 125—150 | 3,— | 27,— | |

## Philadelphus (L.) - Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin - SAXIFRAGACEAE

### A. Hochwachsende Sorten:

**coronarius** (L.) **B, H, R, S**
Italien bis Kaukasus, wertvoller, mittelstark wachsender Strauch für Hecken und schattige Lagen, Blüte rahmweiß, Mai-Juni. . . . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |

**grandiflorus** (Willd.), (P. inodorus grandiflor., Gray.) **H, R, S**
Südliche Vereinigte Staaten, starkwüchsiger und reichblühender Deck- und Schattenstrauch. Blüte im Juni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| 150—200 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

**inodorus grandiflorus,** siehe Ph. grandiflorus

**lemoinei virginal,** siehe Ph. virginalis

**pubescens** (Loisel.) **B, H, R, S**
Nordamerika, bis 3 m hoch werdender, reichblumiger, und wohlriechender Deck- und Schattenstrauch mit unterseits behaarten Blättern. Blüte Juni-Juli.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| 150—200 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

**virginalis** (Rehd.), (Ph. lem. virginal, Hort.) **H, R, S**
Bis 2 m hoch werdender, außerordentlich reichblühender Strauch mit gefüllten, später halbgefüllten, reinweißen, bis 5 cm großen Blüten, Ende Juni-Juli. Sehr wertvoll. . . . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

**zeyheri** (Schrad.) **H, R, S**
Bis 3—4 m hoch werdender, sehr reichblühender Strauch mit dunkelbrauner, abblätternder Rinde. Blütezeit Anfang bis Mitte Juni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| 150—200 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

### B. Niedrig bleibende Sorten:

**coronarius aureus** (Rehd.) **L**
Mittelhoher Strauch mit schöner grünlichgoldgelber Belaubung, womit sich sehr schöne Farbkontraste erzielen lassen. . . . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

**lemoinei Bouquet blanc** (Hort.) **H, R, S**
Bis 1,50 m hoch werdender, außerordentlich reichblühender Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen und reinweißen, stark gefüllten Blüten im Juni-Juli . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

„ **Dame blanche** (Hort.) **H, R, S**
Bis 1 m hoch werdender, reichblühender Strauch mit einfachen, blendend reinweißen Blüten im Juni-Juli.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50—70 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

„ **erectus** (Hort.) **B, H, R, S**
Bis 1,50 m hoher, aufrecht wachsender Strauch mit einfachen, reinweißen und wohlriechenden Blüten im Juni-Juli. Eignet sich auf Grund seines Wuchses **vorzüglich für kleine Hecken** . . . . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |

„ **Girandole** (Hort.) **H, R, S**
Schon in der Jugend sehr blühwillige Sorte mit dicht gefüllten, prachtvoll milchweißen, 10 cm langen Blütenständen im Juni-Juli. . . . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

„ **Manteau d' hermine** (Hort.) **H, R, S, St**
Bis 1 m hoch werdender, reichblühender Strauch mit gelblich-weiß- gefüllten Blüten im Juni-Juli. . . .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Phillyrea** (L.) - Steinlinde - OLEACEAE | | | | |
| **decora** (B. & B.), (P. vilmoriniana, B. & B.) **E, I** | | | | |
| Westasien, bis 3 m hoher, immergrüner Strauch mit aufrechten und etwas abstehenden Zweigen. Sehr dekorativ wirken die gegenständigen, glänzend dunkelgrünen und zugespitzten Blätter, die unterseits gelblichgrün gefärbt sind. Frucht 1,5 cm lang und rot. | | | | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 175—200 cm breit | 125—150 | 60,— | | |
| **Physocarpus** (Maxim.) - Blasenspiere - ROSACEAE | | | | |
| **opulifolius** (Maxim.), (Spiraea opulifolia, L.) **H, S** | | | | |
| Nordamerika, 3 m hoch werdender Blüten- und Deckstrauch, der auch **stagnierende Nässe verträgt.** Blüten weiß bis rötlich in vielblütigen Doldentrauben im Juni bis Juli. . . . . | 150—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **luteus** (Zabel.) **H, S** | | | | |
| Im Austrieb goldgelbe Form, die sich später grünlichgelb färbt und etwas schwachwüchsiger als die Art ist. | 100—150 | 0,65 | 5,60 | |
| **Pieris,** siehe Andromeda | | | | |
| **Pirus** (L.) - Birne - ROSACEAE | | | | |
| **communis** (L.), **Wildbirne** **H** | | | | |
| Europa, Westasien. . . . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **pashia** (Buch.-Ham.), (P. variolosa, Wall.) | | | | |
| Westchina, Himalaja, in seiner Heimat bis 12 m hoher, stark dornig bewehrter Baum mit anfangs weiß-filzigen, länglich zugespitzten Blättern und 2—3 cm breiten, weißen, kurzgestielten Blüten. **Besonders für hohe, dornige Anpflanzungen geeignet.** | | | | |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. | 150—200 | 6,— | | |
| 125—175 cm breit | 200—250 | 7,50 | | |
| **Platanus** (L.) - Platane - PLATANACEAE | | | | |
| **acerifolia** (Wild.), (P. occidentalis x orientalis) **E, F, L, R** | | | | |
| Dieser Bastard hat sich klimafester gezeigt als seine Eltern. Bis 30 m hoher, breitausladender Baum mit in großen Platten sich ablösender Rinde. Außerordentlich widerstandsfähig gegen Kohlenstaub, schweflige Säure, trokkene Luft und mechanische Beschädigungen. **Ein unübertrefflicher Promenadenbaum der Großstädte.** Freistehend senken sich seine dichtbelaubten, überhängenden Äste bis zum Boden. | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 200—250 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 250—300 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 14—16 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 16—18 | 10,— | 90,— | |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 10—12 | 7,10 | 60,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 67,50 | |
| | 14—16 | 11,— | 90,— | |
| | 16—18 | 12,50 | | |
| **Polygonum,** siehe unter Schlingpflanzen | | | | |
| **Populus** (L.) - Pappel - SALICACEAE | | | | |
| **alba bolleana,** siehe P. alba pyramidalis | | | | |
| „ **nivea** (Ait.) **L, R** | | | | |
| Diese Jugendform bildet bis 35 m hohe Bäume mit breitrundlicher Krone. Blätter unterseits schneeweißfilzig. Ist wegen ihrer **Windfestigkeit für Dünen- und Uferbefestigung geeignet.** | 125—150 | 1,15 | 10,— | 94.— |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112.— |
| | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Mehrstämmige Büsche** mit 5—8 Grundtrieben . . . | 125—150 | 1,90 | 17,— | |
| | 150—200 | 2,60 | 22,50 | |
| „ **pyramidalis** (Bunge), (P. alba bolleana, Lauche) **L, R** | | | | |
| Schön pyramidal wachsende Form aus Vorderasien. Blätter größer und tiefer gelappt. Holztriebe grün. | 150—200 | 2,25 | 20,— | |
| **Pyramiden** aus extra weitem Stand | 200—250 | 3,— | 27,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Populus** (Fortsetzung) | | | | |
| **angulata cordata robusta**, siehe P. robusta | | | | |
| **bachelieri**, siehe unter **„Pappeln aus anerkannt. Beständen"** | | | | |
| **berolinensis** (Dipp.), **Berliner Lorbeerpyramidenpappel B, R** (P. laurifolia x nigra italica). Gesunder, gegen Krankheiten sehr widerstandsfähiger Baum mit hellgrüner Belaubung. **Für Sicht- und Windschutzpflanzungen, wie als Straßenbaum von Bedeutung.** Hat wegen seiner Starkwüchsigkeit auch forstlichen Wert. | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 200—250 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 250—300 | 1,45 | 13,— | 112,— |
| **Pyramiden**, aus weitem Stand, für Einzelstellung gezogen | 150—200 | 1,20 | 11,— | 98,— |
| | 200—250 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 250—300 | 2,55 | 20,— | 188,— |
| | 300—350 | 3,— | 27,— | 240,— |
| | 350—400 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 400—450 | 5,25 | 47,— | 420,— |
| | 450—500 | 6,— | 54,— | 490,— |
| | 500—600 | 7,50 | 67,50 | 600,— |
| **Alleebäume**, Stammumfang | 8—10 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 10—12 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 12—14 | 4,10 | 37,50 | 340,— |
| | 14—16 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 16—18 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 18—20 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 20—25 | 8,25 | 75,— | |
| **canescens**, siehe unter **„Pappeln aus anerkannt. Beständen"** | | | | |
| **deltoides missouriensis** (Henry) **L, R** Blätter breiteiförmig, 9—14 cm lang, Austrieb sehr früh, rotbraun, Wuchs gerade, aufrecht, stammt aus den USA. Sehr wertvoller Baum für die Holzindustrie. | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung . . . . . | 250—300 | 1,45 | 13,— | 112,— |
| **Alleebäume**, Stammumfang | 8—10 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 10—12 | 3,— | 27,— | 248,— |
| | 16—18 | 5,40 | 50,— | |
| | 18—20 | 6,40 | 58,— | |
| | 20—25 | 8,25 | 75,— | |
| | 25—30 | 10,— | | |
| | 30—35 | 13,— | | |
| **Solitärbäume**, 3 × verpflanzt. Stammhöhe 250-300 cm. Kronendurchm. 300—400 cm, Kronenhöhe 500—700 cm | 40—50 | 67,50 | | |
| Stammumfang | 50—60 | 100,— | | |
| | 60—70 | 150,— | | |
| **gelrica**, siehe unter **„Pappeln aus anerkannten Beständen"** | | | | |
| **koreana** (Rehd.) **B, E, L, R** Korea, bis 25 m hoch werdender Baum mit **sehr früh austreibender**, glänzendgrüner Belaubung und auffallender roter Mittelrippe. | | | | |
| **Solitärbäume**, 3 × verpflanzt. Stammhöhe 200 cm, Kronendurchm. 250—300 cm, Kronenhöhe 350—400 cm | 20—25 | 18,50 | | |
| Stammumfang | 25—30 | 25,— | | |
| **nigra** (L.), **Echte Schwarzpappel R** Wird im Gegensatz zur Kanadapappel nicht trockenastig und ist mit ihrer hellgrünen Belaubung gut als Allee- und Straßenbaum in tiefgründigen und nährstoffreichen Böden zu empfehlen. | | | | |
| **Hochstämme**, im fertigen Zustande zum 3. × verpfl., mit großen, locker gewachsenen Kronen | 18—20 | 10,50 | | |
| Stammumfang | 20—25 | 12,50 | | |
| „ **italica**, siehe P. nigra pyramidalis | | | | |
| „ **pyramidalis** (Spach.), (P. nigra italica, Dur.; P. nigra fastigiata, Desf.), **Italienische Pyramidenpappel H, R** Liefert unter günstigen Bodenbedingungen durch ihren ganz schlanken Wuchscharakter einen sehr schönen Straßen- und Einzelbaum. Daneben gleich gut als Sicht- und Windschutzpflanzung geeignet. | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 200—250 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 250—300 | 1,45 | 13,— | 112,— |
| **Pyramiden**, aus weitem Stand, für Einzelstellung gezogen | 150—200 | 1,20 | 11,— | 98,— |
| | 200—250 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 250—300 | 2,55 | 20,— | 188,— |
| | 300—350 | 3,— | 27,— | 240,— |
| | 350—400 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 400—450 | 6,— | 54,— | |
| | 450—500 | 7,50 | 67,50 | |
| | 500—600 | 10,— | 90,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Populus nigra pyramidalis** (Fortsetzung) | | | | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | |
| | 16—18 | 8,25 | 75,— | |
| **robusta** (C. Schneid.), (P. angul. x nigra plantierensis) **B, R** | | | | |
| Hoher, aufrechtwachsender und sehr schnellwüchsiger Baum mit dunkelgrüner Belaubung. Die jungen Triebspitzen sind etwas rötlich-braun. In guten Herkünften **eine sehr wertvolle Hochleistungspappel** für die Papierindustrie. | 16—18 | 5,40 | 50,— | |
| **Stämme,** bis unten beästet. Höhe ca. 600 cm, Breite ca. 150 cm Stammumfang | 18—20 | 6,40 | 58,— | |
| | 20—25 | 8,25 | 75,— | |
| **serotina erecta,** siehe unter **„Pappeln aus anerk. Beständen"** | | | | |
| **simonii** (Carr.) **B, R** | | | | |
| Nordchina, schmalkroniger, bis 14 m hoher, frühaustreibender Baum, dessen junge Äste ähnlich einer Birke leicht überhängen; **hat sich als Straßenbaum auch im Industriegebiet gut bewährt.** **Pyramiden,** aus weitem Stand | 200—250 | 1,70 | 15,— | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 12—14 | 5,40 | 50,— | |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | |
| **„ fastigiata** (C. Schn.) **R** | 150—200 | 1,35 | 12,50 | |
| Wuchs fast säulenförmig, sonst wie die Art. | 200—250 | 1,70 | 15,— | |
| **Pyramiden** | 250—300 | 2,— | 18,50 | |
| **tremula** (L.), **Zitterpappel, Espe** **B, R** | | | | |
| Europa bis Sibirien, bei uns meist strauchig oder bis 10 m hoher, Ausläufer treibender Baum. In Verbindung mit Roterlen besonders zur Haldenbepflanzung geeignet. Desgleichen gut für feuchte Lagen und **Uferbepflanzungen. Wichtiges Windschutzgehölz.** | 125—150 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Bezweigung . . | 200—250 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | |
| **vernirubens,** siehe unter **„Pappeln aus anerk. Beständen"** | | | | |

# Pappeln aus anerkannten Beständen

**Hierbei handelt es sich um im Quartier anerkannte und mit dem Deutschen Markenetikett e. V. ausgezeichnete Hochzuchtpappeln.** Nach den hierfür festliegenden Vorschriften sind nachfolgende Mindestwuchsräume erforderlich:

für einjährige Pappeln nicht unter 2000 qcm je Pflanze,
für zweijährige Pappeln nicht unter 3200 qcm je Pflanze,
für dreijährige Pappeln nicht unter 4800 qcm je Pflanze.

Etikettfähige Pappelpflanzen müssen folgende Mindestmaße aufweisen:

| **Alter:** | **Höhe:** | **Umfang:** |
|---|---|---|
| einjährig | 120 cm | 30 mm in 100 cm üb. d. Bod. |
| zweijährig | 200 cm | 50 mm in 100 cm üb. d. Bod. |
| dreijährig | 300 cm | 70 mm in 100 cm üb. d. Bod. |
| zweijähr. Rückschnittspfl. | 175 cm | 35 mm in 100 cm üb. d. Bod. |
| dreijähr. Rückschnittspfl. | 275 cm | 55 mm in 100 cm üb. d. Bod. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **bachelieri,** Kreuzung von Bachelier, Metz. | | | | |
| Ein hochgezüchteter, geradschäftiger, männlicher Robusta-Typ mit ganz hervorragenden Wuchsleistungen und Holzeigenschaften **2jährig** | 200—250 | 1,10 | 10,— | 90,— |
| **3jährig** | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| | 300—350 | 1,60 | 14,50 | 135,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 10—12 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 12—14 | 4,10 | 37,50 | 340,— |
| **canescens** (Sm.) | | | | |
| Dieser Bastard zwischen alba und tremula kann als einer der besten Hölzer der europäischen Pappeln bezeichnet werden und ist von hohem waldbaulichem Wert. Daneben ist sie sehr **windbeständig** **1jährig** | 120—150 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **2jährig** | 150—200 | 2,40 | 22,— | 200,— |
| | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| | 250—300 | 3,85 | 35,— | 320,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | |
| **gelrica** | | | | |
| Eine in Geldern entstandene Sortengruppe, die vermutlich marilandica als Mutter und serotina als Vater hat. Zeichnet sich durch helle Rinde, geraden Schaft, Schnellwüchsigkeit, Windfestigkeit und Gesundheit aus. Ist die zur Zeit in Holland am meisten verwandte Pappel. **2jährig** | 200—250 | 1,10 | 10,— | 90,— |
| **3jährig** | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| | 300—350 | 1,60 | 14,50 | 135,— |

| | | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pappeln aus anerkannten Beständen** (Fortsetzung) | | | | | |
| **Goedestorfer Robustapappel** . . . . . | 1jährig | 120—150 | 0,70 | 6,30 | 54,— |
| | | 150—200 | 0,80 | 7,— | 60,— |
| **Grafhorster-Pappel,** robusta-ähnlich . . . . . | 1jährig | 120—150 | 0,70 | 6,30 | 54,— |
| | | 150—200 | 0,80 | 7,— | 60,— |
| | 2jährig | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | | 10—12 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | | 12—14 | 4,10 | 37,50 | 340,— |
| **Jacometti-Pappel,** robusta-ähnlich . . . . . | 1jährig | 120—150 | 0,70 | 6,30 | 54,— |
| | | 150—200 | 0,80 | 7,— | 60,— |
| **Lampertheimer-Robustapappel** . . . . . | 1jährig | 120—150 | 0,70 | 6,30 | 54,— |
| | | 150—200 | 0,80 | 7,— | 60,— |
| | 2jährig | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | | 10—12 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | | 12—14 | 4,10 | 37,50 | 340,— |
| **Oxford-Pappel,** Balsamifera-Kreuzung . . . . | 1jährig | 120—150 | 0,70 | 6,30 | 54,— |
| | | 150—200 | 0,80 | 7,— | 60,— |
| **serotina erecta** (Henry), **Schmalkronige Spätpappel** Diese aus Frankreich stammende Sorte zeichnet sich durch einen geraden Stamm, weiße, glatte Rinde und außerordentliche Schnellwüchsigkeit aus. | 2jährig | 200—250 | 1,10 | 10,— | 90,— |
| | 2jährig | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| | 3jährig | 300—350 | 1,60 | 14,50 | 135,— |
| **vernirubens** (Henry) Hat im großen und ganzen die gleichen guten Eigenschaften wie P. bachelieri. Der einzige Unterschied ist der, daß sie einige Tage vorher austreibt und auf trokkenen Böden bessere Wuchsleistungen zeigt. | 2jährig | 200—250 | 1,10 | 10,— | 90,— |
| | 2jährig | 250—300 | 1,40 | 12,50 | 112,— |
| | 3jährig | 300—350 | 1,60 | 14,50 | 135,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | | 8—10 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | | 10—12 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | | 12—14 | 4,10 | 37,50 | 340,— |
| **Potentilla** (L.) - Fingerkraut, Fünffingerstrauch - ROSACEAE | | | | | |
| **arbuscula** (Don.) **B, H, St** Mittelhoher Strauch mit gelben Blüten im Sommer. | | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **farreri,** siehe P. fruticosa farreri | | | | | |
| **fruticosa** (L.) **B, H, St** Nördl. Halbkugel, bis 1,50 m hoher, aufrecht wachsender, dichtbuschiger Strauch mit leuchtendgelben Blüten, Mai-August. . . . . | | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **farreri** (Besant) **B, H, St** **Kleinbleibender,** bis 1 m hoch werdender, kleinblättriger und dichtbuschiger Strauch mit lebhaft goldgelben Blüten, die den ganzen Sommer über blühen. | | 30—50 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen, ca. 60 cm breit | | 60—80 | 3,75 | | |
| | | 80—100 | 5,— | | |
| „ „ **prostrata** (Hort.) **B, St** Zwergartig wachsender Strauch, Blüten goldgelb, blüht ununterbrochen von Juni bis in den Spätherbst. Mit Ballen | | 30—40 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **mandschurica** (Maxim.) **B, St** Kleiner, niedrig bleibender, bis 50 cm hoch werdender, reichblühender Strauch mit beiderseits dicht seidig behaarten Blättern und schneeweißen Blüten. **Eine sehr wertvolle Steingartenpflanze.** . . . . . | | 20—30 | 1,15 | 10,— | |
| „ **veitchii** (Bean.) **B, H, St** Bis 1 m hoch werdender Strauch mit reinweißen, 2 cm breiten Blüten und geschlossenem Wuchs. . . . . | | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **hybrida sulfurea** (Hort.) **B, H, St** Strauch mit kleiner, graublauer Belaubung und schwefelgelben Blüten, die während des ganzen Sommers blühen. . . . . | | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

**Prunus** (L.) - Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Mandel - ROSACEAE

## A. Japanische Blütenkirschen

**Wie bei den Zieräpfeln, so bieten sich auch bei den Blütenkirschen als wahre Edelsteine unter den Gehölzen, im Hinblick auf Wuchscharakter, Blütenform und -farbe so mannigfaltige Variationen, daß ihrer Verwendung in Garten und Park die größten Möglichkeiten gegeben sind.**

**affinis,** siehe P. jonioi

## Japanische Blütenkirschen (Fortsetzung)

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **albo rosea** (serrulata), (Wils.), (P. serrulata albirosea, Wils. P. Shirofugen) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** Starkwachsend, in der Heimat bis 9 m hoch werdender Baum mit **breit überhängenden Zweigen. Blüte:** sehr spät und von langer Dauer, in langstieligen, **gefüllten,** 4—5 cm großen, weißen Blütendolden, die sich später wie die Knospen **purpurrosa färben.** Der überreiche Blütenflor bildet zu den dunklen, bräunlichrot austreibenden Blättern einen wundervollen Kontrast. Was Wuchs und Blüte anbelangt, so möchten wir sie als **eine der wertvollsten Sorten** bezeichnen. | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | 225,— |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 125—175 | 9,— | | |
| 100—150 cm breit | 175—225 | 13,50 | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 250—300 cm breit | 350—400 | 34,— | | |
| **Amanogawa** (serr.), (P. serr. erecta, Miyoshi) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** straff säulenförmig. **Blüte:** hellrosa, mitunter etwas gefüllt, leicht duftend, ziemlich spät. **Laub:** im Austrieb gelblichbraun. | | | | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Gozanomanioi** (lann.), (P. takinioi) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** straff aufrecht. **Blüte:** mittelfrüh, **einfach,** reinweiß, 3—4 cm ∅, **sehr wohlriechend.** Die weißen Blüten stehen im schönen Kontrast zu der kupferroten Belaubung. | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 150—200 | 6,— | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 250—300 cm breit | 350—400 | 34,— | | |
| **Hisakura** (serrulata), (P. Kanzan) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** straff aufrecht. **Blüte:** mittelfrüh, **halbgefüllt,** sehr reichblühend. Blüten zu 2—5 in karminrosa gefärbten, bis 5 cm großen Büscheln. **Kleinkron. Alleebaum.** | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | 225,— |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl., | 8—10 | 6,— | 54,— | |
| mit starker 3jähriger Krone. Stammhöhe ca. 180 cm. | 10—12 | 7,— | 64,— | |
| Stammumfang | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 175—200 | 9,— | | |
| | 200—250 | 13,50 | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 150—200 cm breit | 250—300 | 22,50 | | |
| **incisa moerheimii** (Hort.) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** breitet sich im Alter weit aus und läßt die dünnen Zweige elegant überhängen. **Blüte:** sehr früh im April und überaus reich, einfach, rosa. **Eine der wertvollsten Sorten.** | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3.75 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 150—200 | 13,50 | | |
| 150—200 cm breit | 200—250 | 22,50 | | |
| **jonioi** (lann.), (P. lann. affinis) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** mittelgroß, breit. **Blüte:** mittelfrüh, **halbgefüllt** bis einfach, weißlichrosa. Sehr reichblühend. Blätter beim Austrieb bräunlichrot und wohlriechend. | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 150—200 | 7,50 | | |
| | 200—250 | 13,50 | | |

**Kanzan,** siehe P. Hisakura

**Kiku-shidare-sakura,** siehe P. Shidare Sakura

## Japanische Blütenkirschen (Fortsetzung)

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Kirigaya** (lann.) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** aufrecht. **Blüte:** mittelfrüh. Die **einfachen,** blaßrosafarbenen, 5—6 cm großen, trichterförmigen Einzelblüten sitzen zu 3—7 in Büscheln zusammen. Austrieb und Blüte kommen gleichzeitig. **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 200—250 | 13,50 | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—250 cm breit | 300—350 | 34,— | | |
| **Kokesimidsu** (lann.) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** in der Heimat bis 6 m hoch werdender Baum mit **breit überhängenden Zweigen. Blüte:** spät nach dem Blattaustrieb in gefüllten, weißlich rosa gefärbten Blütendolden. Eine sehr wertvolle Sorte. | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 150—200 | 7,50 | | |
| | 200—250 | 13,50 | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 150—200 cm breit | 250—300 | 22,50 | | |
| **Mount Fuji** (serr.), (P. Shirotae; P. serr. kojima) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** breit, leicht überhängend. **Blüte:** mittelfrüh, halbgefüllt, reinweiß, Einzelblüten 4—5 cm groß. Blüten meist zu 3 an 2 cm langen Stielen, **Laub** hellgrün, Austrieb und Blüte gleichzeitig. **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Solitär,** 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 300—350 cm breit | 350—400 | 45,— | | |
| **Ochichima** (lann.), (serr. Ochichima, Hort.) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** aufrecht. **Blüte:** sehr früh, **einfach, bis halbgefüllt,** reinweiß, in der Knospe etwas rosa. Die 3—4 cm breiten Blüten sitzen an 1—2 cm langen Stielen. Austrieb und Blüte gleichzeitig. | | | | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 150—200 | 7,50 | | |
| **Sekuyama** (serr.) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** breit bis aufrecht. **Blüte:** früh, **einfach bis halbgefüllt.** Diese Sorte zeichnet sich durch einen **außerordentlich reichen** und kräftigen, rosalilafarbigen Blütenflor aus. Blüten zu 3—5 an 2—3 cm langen Stielen. Kann als eine der **wertvollsten Sorten** bezeichnet werden. **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 150—200 | 7,50 | | |
| **Shidare Sakura** (serr.), (P. Kiku-shidare-sakura), **Japanische Nelkenkirsche B, E** | | | | |
| **Wuchs:** stark hängend. **Blüte:** mittelfrüh, dicht halbkugelig **gefüllt,** zartrosa, etwa 3 cm breit, zu 4—6 in dichten Büscheln. **Eine der wertvollsten stark hängenden Sorten.** | 100—125 | 3,40 | 30,— | |
| **Pyramiden** | 125—150 | 4,10 | 37,50 | |
| **Solitärpyramiden,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen . . . | 150—175 | 7,50 | | |
| | 175—200 | 11,50 | | |
| | 200—225 | 15,— | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—125 cm breit | 300—350 | 34,— | | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl., mit starken 3—4jährigen Kronen | 8—10 | 6,— | | |
| Stammumfang | 10—12 | 7,— | | |
| **Shirofugen,** siehe P. albo rosea | | | | |
| **Shirotae,** siehe P. Mount Fuji | | | | |
| **subhirtella** (Miq.) **B, E** | | | | |
| Japan, **Wuchs:** Bis 10 m hoher, dicht aufrecht wachsender Baum. **Blüte:** einfach, sehr früh, rötlichweiß, 2 cm breit, zu 2—5. Da sie am frühesten und ungeheuer reich blüht, ist sie von **sehr hohem Wert.** Auch gut **zum Treiben** geeignet. **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |

| Japanische Blütenkirschen (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus subhirtella** (Fortsetzung) | | | | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 150—200 | 7,50 | | |
| | 200—250 | 13,50 | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—250 cm breit | 250—300 | 22,50 | | |
| „ **autumnalis** (Mak.) **Wuchs:** Ein bis 5 m hoch werdender Baum mit leicht hängenden Zweigen. **Blüte:** Die halbgefüllten, weißlichen Blüten erscheinen zum Teil im Spätherbst wie im Frühjahr. | | | | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl., mit 3jährigen starken Kronen Stammumfang | 8—10 | 6,— | | |
| | 10—12 | 7,50 | | |
| **takinioi,** siehe P. Gozanomanioi | | | | |
| **Wasinowo** (lann.) **B, E** **Wuchs:** breit bis aufrecht. **Blüte:** mittelfrüh, sehr große, **gefüllte,** lilarosafarbene, kurzstielige Blüten, bis 5 cm ∅, die durch den hellen Austrieb der Blätter voll zur Wirkung kommen. Ist wegen seines großen Blütenreichtums von hohem Wert. **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | 100—125 | 3,30 | 30,— | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 150—200 | 7,50 | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—250 cm breit | 250—300 | 22,50 | | |

## B. Alle übrigen Prunus-Arten und -Varietäten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **avium** (L), **Vogelkirsche** **B, F, R** Heimischer, bis 20 m hoher, aufrechtwachsender Baum für kalkhaltige Böden, der sich gut zur Haldenbepflanzung eignet. | 125—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 200—250 | 1,65 | 15,— | 135,— |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Bezweigung | 250—300 | 2,25 | 20,— | 188,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 7—8 | 2,60 | 24,— | 210,— |
| | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,10 | 37,50 | 340,— |
| | 12—14 | 5,— | 45,— | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpfl. Stammhöhe 175—225 cm, Kronendurchm. 300—350 cm, Kronenhöhe 300—350 cm Stammumfang | 20—25 | 22,50 | | |
| | 25—30 | 30,— | | |
| | 30—35 | 41,— | | |
| „ **plena** (C. Schneid.), **gefüllt blühende Süßkirsche** **B, E** Der reiche Flor schneeweißer, kleinen Röschen gleichenden Blüten, wirkt außerordentlich zierend. Bildet rundliche Kronen. Auch sehr als **kleinkroniger, blühender Alleebaum** zu empfehlen. **Büsche,** 3—5 Triebe | 100—125 | 2,— | 18,50 | |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 100—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. Stammumfang | 8—10 | 6,— | | |
| | 10—12 | 7,— | | |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 175—225 | 9,— | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—250 cm breit | 350—400 | 34,— | | |
| **blireana** (André), (P. cerasifera x mume) **B, E, L** **Wuchs:** breitaufrecht. **Blüte:** sehr früh, **halbgefüllt,** zartrosa, 3,5 cm breit. **Belaubung: purpurrot.** In geschützten Lagen ein wertvoller Blütenstrauch, der mit P. subhirtella im April zur gleichen Zeit blüht. . . . . | 80—125 | 2,80 | 25,50 | |
| **cerasifera** (Ehrh.), (P. myrobalana, Loisel), **Kirschpflaume** **B, F, H, R** Westasien, Kaukasus, dorniger, bis 8 m hoher, baumartiger Strauch mit weißen Blüten. Dieser sparrig wachsende, robuste Strauch eignet sich vorzüglich als Hekken-, Vogel- und **Windschutzgehölz,** das sogar nach etwa 8 bis 10 Jahren große Mengen von mirabellenartig schön gefärbten Früchten liefert. . . . . | 100—175 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **nigra,** siehe P. cerasifera pissardii nigra | | | | |

| Alle übrigen Prunus-Arten u. -Varietäten (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus cerasifera** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **pissardii nigra** (Hort.), (P. cerasifera nigra, Bailey) **B, E, H, L** | | | | |
| **Wuchs:** aufrecht, baum- oder strauchartig. **Blüte:** einzeln, April-Mai, rosa getönt, 2,5 cm breit. **Belaubung:** dunkelbraunrot mit Metallglanz. . . . . | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 150—175 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 7—8 | 3,75 | 34,— | |
| | 8—10 | 4,10 | 37,50 | |
| **Hochstämme,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. Stammumfang | 8—10 | 5,60 | 52,50 | |
| | 10—12 | 6,75 | 60,— | |
| **cerasus rhexii** (Voss.) **B, E** | | | | |
| **Wuchs:** aufrecht, leicht überhängend. **Blüte:** schön weiß gefüllt, im Mai. **Halbstämme,** Stammhöhe | 125—150 | 2,70 | 25,— | |
| **Hochstämme,** Stammhöhe | 180—200 | 3,75 | 34,— | |
| **fenzliana** (Fritsch.) **B, E** | | | | |
| Kaukasus. **Wuchs:** buschig, breit. **Blüte:** sehr früh, einfach, weißlichrosa, 2,5 cm breit. In wärmeren Lagen eine sehr wertvolle Art. . . . . | 125—175 | 3,40 | 30,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 175—225 | 7,50 | | |
| **glandulosa albiplena** (Koehne), (P. jap. albiplena, Hort.) **St** | | | | |
| **Wuchs:** bis 1,50 m hoher, geschlossen wachsender, feinzweigiger Strauch. **Blüte:** früh, reinweiß, **gefüllt,** 2,5 cm breit, im Mai. Dieser dicht mit Blüten besetzte Kleinstrauch eignet sich auch gut zum Treiben. **Büsche,** 3—5 Triebe | 40—60 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | 40—60 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **japonica albiplena,** siehe P. glandulosa albiplena | | | | |
| **laurocerasus fiesserana** (Schwer.) **I, R, S, St** | | | | |
| Eine wertvolle, breitpyramidal wachsende Sorte mit schöner mattgrüner Belaubung. Zur Blütezeit im Mai fällt diese Sorte durch ihre dekorativen, bis 15 cm langen, vielblütigen, weißen Blütentrauben auf. **Büsche,** mit Ballen | 40—60 | 2,80 | 23,50 | 210,— |
| | 60—80 | 4,50 | 37,50 | 340,— |
| | 80—100 | 7,20 | 60,— | 540,— |
| „ **herbergii** (Hort.) **I, R, S, St** | | | | |
| Schlank aufrecht wachsender Strauch mit dunkelgrünen, lorbeerartigen, lanzettlichen Blättern. **Sehr winterharter Lorbeerersatz.** | 40—60 | 3,20 | 27,— | 240,— |
| **Büsche,** mit Ballen. 40—60 cm breit | 60—80 | 5,— | 41,— | 375,— |
| 60—80 cm breit | 80—100 | 8,— | 66,— | 600,— |
| 80—100 cm breit | | 10,— | 82,50 | |
| 100—125 cm breit | | 12,— | | |
| 60—80 cm breit | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| 80—100 cm breit | | 12,— | 97,50 | |
| 100—125 cm breit | | 15,— | | |
| 125—150 cm breit | | 22,50 | | |
| 60—80 cm breit | 125—150 | 10,— | 82,50 | |
| 80—100 cm breit | | 15,— | | |
| 100—125 cm breit | | 22,50 | | |
| 125—150 cm breit | | 30,— | | |
| „ **reynvaanii** (Hort.) **I, R, S, St** | 40—60 | 2,80 | 24,— | |
| Eine geschlossene und aufrecht wachsende Varietät mit gesunden, leicht faltigen Blättern. | 60—80 | 4,50 | 37,50 | |
| | 80—100 | 7,20 | 60,— | |
| **Büsche,** mit Ballen | 100—125 | 9,— | 75,— | |
| „ **schipkaensis** (Zbl.) **I, R, S, St** | 40—60 | 3,20 | 27,— | 240,— |
| Bulgarien, mehr breitwachsender, reichblühender und winterharter Strauch mit lanzettförmigen Blättern. | 60—80 | 5,— | 41,— | 375,— |
| | 80—100 | 8,— | 66,— | 600,— |
| **Büsche,** mit Ballen. Breite | 100—125 | 10,— | 82,50 | |
| „ „ **macrophylla** (Hort.) **I, R, S, St** | 40—60 | 3,20 | 27,— | 240,— |
| Eine kräftig, mehr breitwachsende Varietät, die sich durch glänzend dunkelgrünes Blatt und hohe Frosthärte auszeichnet. **Büsche,** mit Ballen. Breite | 60—80 | 5,— | 41,— | 375,— |
| | 80—100 | 8,— | 66,— | 600,— |
| | 100—125 | 10,— | 82,50 | |
| „ **zabeliana** (Späth) **I, R, S, St** | | | | |
| Diese frosthärteste Varietät zeichnet sich durch ihren fast **horizontalen, leicht überhängenden Wuchs** und durch ihre gesunde Belaubung aus. **Sehr wertvoll.** | 40—60 | 3,20 | 27,— | 250,— |
| | 60—80 | 5,— | 41,— | 375,— |
| **Büsche,** mit Ballen. Breite | 80—100 | 8,— | 66,— | |

| Alle übrigen Prunus-Arten u. -Varietäten (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **mahaleb** (L.), **Steinweichsel** **B, H, S** | | | | |
| Europa, Westasien, bis 10 m hoher Baum mit lockerer, breitausladender Krone. Die glänzend hellgrüne Belaubung ist sehr widerstandsfähig. Eignet sich gut als **Heckenstrauch** und zur **Bahndammbepflanzung** in **trockenen, sandigen bis steinigen Lagen.** . . . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **myrobalana**, siehe P. cerasifera | | | | |
| **padus** (L.), **Traubenkirsche** **B, F, H, S** | | | | |
| Europa. Asien, Japan, Korea, heimischer bis 10 m hoher, dichtkroniger, leicht überhängender Baum mit stark duftenden, weißen, locker hängenden, 15—20 blütigen Trauben im April-Mai. Geeignet für schattige und feuchte Standorte und als wichtiges Knick- und **Windschutzgehölz.** | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 100—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 150—200 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **Solitärbüsche**, mehrstämmig, 3 × verpfl. Mit Ballen 80—100 cm breit | 200—250 | 7,50 | | |
| 100—150 cm breit | 250—300 | 11,50 | | |
| | 300—350 | 15,— | | |
| **Solitärstammbüsche** und **Hochstämme**, 3 × verpfl. Mit Ballen. 80—100 cm breit und 300—350 cm hoch. Stammumfang | 8—10 | 8,— | | |
| | 10—12 | 9,— | | |
| 150—200 cm breit u. 300—400 cm hoch. Stammumfang | 10—12 | 18,— | | |
| | 12—14 | 22,50 | | |
| | 14—16 | 28,50 | | |
| | 16—18 | 33,— | | |
| **Solitärbäume**, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. Stammhöhe 225—250 cm, Kronendurchm. 200 cm, Kronenhöhe 300 cm Stammumfang | 18—20 | 45,— | | |
| **persica Clara Mayer** | | | | |
| **Zierpfirsich** mit gut gefüllten, rosaroten Blüten. . . . | 80—125 | 5,60 | | |
| **serotina** (Ehrh.), **Späte Traubenkirsche** **B, F, H, S** | | | | |
| Nordamerika, schattenverträglicher, bis 30 m hoher Baum mit verhältnismäßig schmaler Krone und glänzend dunkelgrüner Belaubung. Blüten weiß, Ende Mai-Juni, in 15 cm langen, aufrechtstehenden oder abstehenden Trauben. **Gedeiht noch gut auf steinigen und sandigen Böden.** | 80—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 150—200 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 200—250 | 2,70 | 25,— | |
| **spinosa** (L.), **Schlehe, Schwarzdorn** **B, F, H, R** | | | | |
| Europa, Westasien, dornig verzweigter, bis 4 m hoher, heimischer Strauch, der vor dem Blattaustrieb überreich mit kleinen weißen Blüten bedeckt ist. **Für alle kalkreichen Böden ein unentbehrliches Pioniergehölz.** Daneben ein gutes Hecken-, Vogel- und **Windschutzgehölz.** Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos an den Wurzeln verpackt geliefert. | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **triloba multiplex**, siehe P. triloba plena | | | | |
| „ **plena** (Hort.), (Pr. triloba multiplex, Rehd.) **Mandelblüte** **St** | | | | |
| **Wuchs:** Bis 1,50 m hoch werdender, breitbuschiger und engverzweigter Strauch. **Blüte: mittelfrüh,** rosa, dicht gefüllt, sehr reichblumig. Blüten erscheinen vor Austrieb der Blätter. **Bester Treibstrauch.** | | | | |
| **Büsche**, 3—5 Triebe | | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **Büsche**, 5—8 Triebe | | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Büsche**, 8—12 Triebe | | 1,90 | 17,— | 158,— |
| **Büsche**, 12—15 Triebe | | 2,25 | 20,— | 188,— |
| **Solitär**, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—100 cm breit | 80—100 | 4,— | | |
| | 100—125 | 5,— | | |
| **Stämme**, Stammhöhe | 60—80 | 2,60 | 24,— | |
| | 80—100 | 3,— | 27,— | |
| | 100—120 | 3,60 | 31,50 | |
| | 120—140 | 4,10 | 37,50 | |
| | 140—160 | 5,— | | |
| **virginiana** (L.), **Virginische Traubenkirsche** **B, F, H, R, S** | | | | |
| Nordamerika, bis 10 m hoher, Ausläufer treibender, baumartiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits blaugrüner Belaubung und weißen, bis 12 cm langen Blütentrauben, die später als P. padus blühen. Mai-Juni. Wertvolles Vogel- und **Windschutzgehölz.** | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 125—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| 2 × verpfl., **extra stark,** aus doppeltweitem Stand | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |

*Hippophae rhamnoides*

Weibliches Solitär mit Früchten
Höhe 200/250



*Rosa omeiensis pteracantha*

Solitär 3 × v.
Höhe und Breite 125/150

| Quercus pedunculata (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Solitärbäume,** zum Teil mit beästeten Stämmen, 4 × verpflanzt. Mit Ballen. | | | | |
| Kronendurchmesser 200—400 cm, 400—550 cm hoch, Stammumfang | 25—30 | 67,50 | | |
| Kronendurchmesser 200—400 cm, 550—750 cm hoch, Stammumfang | 30—35 | 82,50 | | |
| Kronendurchmesser 200—450 cm, 450—1000 cm hoch, Stammumfang | 35—40 | 112,— | | |
| 500—1000 cm hoch, Stammumfang | 40—45 | 170,— | | |
| | 45—50 | 200,— | | |
| 600—1000 cm hoch, Stammumfang | 50—55 | 260,— | | |
| Kronendurchmesser 250—500 cm, 600—1000 cm hoch, Stammumfang | 55—60 | 300,— | | |
| Kronendurchmesser 400—550 cm, 800—1000 cm hoch, Stammumfang | 60—70 | 450,— | | |
| Kronendurchmesser 400—450 cm, 900—1000 cm hoch, Stammumfang | 70—80 | 600,— | | |
| „ **fastigiata** (Loud.), (Q. robur fastigiata, Schwarz.), **Pyramideneiche** **E, L** Die von uns gezogene Form zeichnet sich durch besonders schönen, straff aufstrebenden Wuchs aus. Die Blätter bekommen im Winter eine glänzend braune Färbung und fallen nicht vor Mai ab. | 125—150 | 6,— | 48,— | |
| | 150—175 | 7,50 | 60,— | |
| | 175—200 | 10,50 | 92,50 | |
| | 200—250 | 15,— | | |
| | 250—300 | 21,— | | |
| **Pyramiden,** mit Ballen | 300—350 | 30,— | | |
| **robur,** siehe Q. pedunculata | | | | |
| „ **fastigiata,** siehe Q. pedunculata fastigiata | | | | |
| **rubra** (Duroi), (Q. borealis maxima, Sarg.), **Amerikanische oder Roteiche** **B, F, L, R** Nordamerika, 25 bis 50 m hoher, breitkroniger Baum mit dunkelgrüner, spitzgelappter Belaubung, die sich im Herbst scharlach- bis braunrot färbt. Gehört zu den widerstandsfähigsten Bäumen im Ruhrkohlengebiet und kann ohne Schaden direkt neben Industrieanlagen gepflanzt werden. Sie ist **erheblich genügsamer und gesunder als die deutsche Eiche. Ein ausgezeichneter, flottwüchsiger Allee- und Straßenbaum.** | 100—125 | 1,15 | 10,— | 94,— |
| | 125—150 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 150—200 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 200—250 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Bezweigung | 250—300 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 6—8 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | 825,— |
| | 14—16 | 13,— | 116,— | |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 10—12 | 7,50 | | |
| | 12—14 | 10,— | | |
| | 14—16 | 13,— | | |
| | 16—18 | 14,50 | | |
| | 18—20 | 19,— | | |

## **Rhamnus** (L.) - Faulbaum, Kreuzdorn, Wegdorn - RHAMNACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **cathartica** (L.), **Kreuzdorn** **B, F, H, R, S** Westasien, 3—8 m hoher, dorniger, oft baumartiger Strauch. Sehr anspruchslos, gedeiht ebenso auf sonnigen, trockenen Hängen, wie als Unterholz schattig und feucht. | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **frangula** (L.), **Faulbaum, Pulverholz** **B, F, H, R, S** Europa, Westasien, Nordafrika, 3—7 m hoher, oft baumartiger Strauch, Früchte anfangs grün, dann rot, zuletzt schwarz-violett. Wertvolles Schattengehölz für feuchte Lagen. Ebenso wertvoller Pionierstrauch auf trockenen Moorböden. . . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **imeretina** (Booth.) **B, E, R** Kaukasus, Westasien, bis 3 m hoher, breitwachsender Strauch mit bis 25 cm großen, glänzend sattgrünen Blättern. Interessanter Einzelstrauch. . . . . | 60—100 | 1,90 | | |

## Rhododendron (L.) - Alpenrose - ERICACEAE

Siehe auch unter Azalea!

**In immergrünen, großblumigen und bewährten frostharten Standardsorten:**

| Preisgruppe | | Blütezeit: | Wuchs: | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **weiß:** | | | | | | |
| 2 | **Album novum** | spät | stark | | | | |
| 1 | **Cunninghams White** | früh | mittelstark | | | | |
| 2 | **Gomer Waterer** | mittelfrüh | stark | | | | |
| 2 | **Mme. Carvalho** | spät | mittelstark | | | | |
| 2 | **Mme. Masson** | spät | mittelstark | | | | |
| | **violett:** | | | | | | |
| 2 | **Alfred** | spät | schwach | | | | |
| 2 | **Lees dark Purple** | spät | stark | | | | |
| | **purpurviolett:** | | | | | | |
| 2 | **Mrs. P. den Ouden** | mittelfrüh | stark | | | | |
| 2 | **Purpureum elegans** | spät | stark | | | | |
| | **lila:** | | | | | | |
| 1 | **catawb. Boursault** | spät | stark | | | | |
| 1 | **„ grandifl.** | spät | stark | | | | |
| 2 | **Everestianum** | spät | mittelstark | | | | |
| 2 | **Fastuosum fl. pl.** | mittelfrüh | stark | | | | |
| | **lilarosa:** | | | | | | |
| 2 | **Cath. van Tol** | spät | mittelstark | | | | |
| 2 | **Parsons Gloriosum** | spät | stark | | | | |
| | **hellrot:** | | | | | | |
| 2 | **Roseum elegans** | spät | stark | | | | |
| | **anilinrot:** | | | | | | |
| 2 | **Dr. H. C. Dresselhuys** | spät | stark | | | | |
| 2 | **Dr. V. H. Rutgers** | spät | mittelstark | | | | |
| | **karminrot:** | | | | | | |
| 2 | **Van der Hoop** | spät | stark | | | | |
| 2 | **Van Weerden Poelmann** | spät | stark | | | | |
| | **rubinrot:** | | | | | | |
| 2 | **Charles Dickens** | spät | schwach | | | | |
| 2 | **Edward S. Rand** | spät | schwach | | | | |
| | **weinrot:** | | | | | | |
| 2 | **Caractacus** | spät | stark | | | | |
| 1 | **Hybriden aus Samen in rosa und roten Farben** | | | | | | |
| | | | | **Preisgruppe 1:** | | | |
| | | | | 30—40 | 4,30 | 39,— | 350,— |
| | | | | 40—50 | 5,40 | 49,— | 445,— |
| | | | | 50—60 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | | | | 60—70 | 7,50 | 67,50 | 620,— |
| | | | | 70—80 | 9,— | 82,50 | 750,— |
| | | | | 80—100 | 13,50 | 125,— | 1125,— |
| | | | | 100—125 | 20,— | 188,— | |
| | | | | 125—150 | 30,— | 270,— | |
| | | | | 150—175 | 56,— | | |
| | | | | 175—200 | 82,— | | |
| | | | | **Preisgruppe 2:** | | | |
| | | | | 30—40 | 4,70 | 43,— | |
| | | | | 40—50 | 6,— | 54,— | |
| | | | | 50—60 | 7,— | 64,— | |
| | | | | 60—70 | 8,25 | 75,— | |
| | | | | 70—80 | 10,— | 90,— | |
| | | | | 80—100 | 15,— | 135,— | |
| | | | | 100—125 | 22,50 | 200,— | |
| | | | | 125—150 | 34,— | | |
| | | | | **Solitärpflanzen:** | | | |
| | | | | 80—100 | 18,— | | |
| | | | | 100—125 | 27,— | | |
| | | | | 125—150 | 41,— | | |
| | | | | 150—175 | 71,— | | |
| | | | | 175—200 | 112,— | | |
| | | | | 200—225 | 170,— | | |
| | | | | 225—250 | 200,— | | |

### Frostharte und kleinbleibende Rhododendron-Arten und -Varietäten:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ferrugineum** (L.), **Echte Alpenrose** — **B, I, R, S, St**<br>Alpen, bis 1 m hoch, junge Zweige braunschilfrig. Blüten scharlachrosa, trichterförmig, Juni-Juli. | 15—25<br>25—30 | 2,75<br>3,30 | 25,—<br>30,— | |
| **hippophaeoides** (Balf. et W. W. Smith) — **I, S, St**<br>Yunnan, China, reich- und feinverzweigter, bis 1 m hoher Strauch. Eine unserer **anspruchslosesten Arten** für den Steingarten. Blüten lilarosa im Juni. | 25—30<br>30—40<br>40—50 | 2,75<br>3,75<br>4,50 | 25,—<br>34,—<br>41,— | |
| **hirsutum** (L.), **Almenrausch** — **I, R, S, St**<br>Kalk-Alpen, bis 1 m hoch werdender Strauch mit kleinen, behaarten, braunschilfrigen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten hell lilarosa, Mai-Juni. **Verträgt Kalk!** | 20—25<br>25—30<br>30—35<br>35—40 | 2,50<br>3,—<br>3,75<br>4,50 | 22,50<br>27,—<br>34,—<br>41,— | |
| **impeditum** (Balf. et W. W. Smith) — **I, S, St**<br>Hochgebirge Lichiangs, ausgesprochener, niedriger, breitwachsender **Hochgebirgsstrauch.** Blüten violettpurpur bis veilchenblau, in 3-8-blütigen Köpfchen stehend, Juni-Juli. | 15—20<br>20—30<br>30—40 | 3,—<br>3,60<br>4,50 | | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| Frostharte und kleinbleibende Rhododendron-Arten und -Varietäten (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Rhododendron impeditum** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **Blue Tit** (Hort.), **Neuheit!** (Rh. impeditum x augustinii) **I, S, St** | | | | |
| Sehr wertvoll, geschlossen und kompakt wachsend. Die Endtriebe sind mit **hyazinthenblauen,** kugelförmigen Blütenköpfchen übersät. Blüht im Juni mit Rh. hippophaeoides zusammen. | 15—20 | 3,40 | | |
| | 20—30 | 4,— | | |
| | 30—40 | 4,90 | | |
| **laetevirens** (Rehd.), (Rh. wilsonii, Hort.), (Rh. carolinianum x ferrugineum) **I, R, S, St** | | | | |
| Immergrünes, breitwachsendes, bis 1,50 m hoch werdendes Gehölz mit frischgrüner, glänzender Belaubung. Blüten rosa im Juni. **Eine sehr harte und widerstandsfähige Hybride.** | 30—40 | 3,— | 27,— | |
| | 40—50 | 3,75 | 34,— | |
| | 50—60 | 4,50 | 41,— | |
| **minus** (Michx.), (Rh. punctatum, Andr.) **I, R, S, St** | | | | |
| Südost-USA, bis 1 m hoher, **frostharter** und immergrüner Strauch mit kräftiger und gesunder Belaubung. Blüten karminrosa im Juni-Juli. **Sehr hart und widerstandsfähig.** | 30—40 | 3,— | 27,— | |
| | 40—50 | 3,75 | 34,— | |
| | 50—60 | 4,50 | 41,— | |
| **praecox** (Carr.), **Vorfrühlingsalpenrose** **I, R, S, St,** Hybride zwischen Rh. ciliatum und dahuricum. Immergrüner, bis 1,50 m hoch werdender Strauch mit **glänzend hellgrüner Belaubung.** Die tief karminrosa, bis 4 cm großen Blüten erscheinen bereits im März-April. **Verträgt etwas Kalk.** Eignet sich auch vorzüglich **zum Treiben.** | 30—40 | 3,70 | 33,— | |
| | 40—50 | 4,10 | 37,50 | |
| | 50—60 | 5,70 | 45,— | |
| | 60—70 | 7,50 | | |
| **punctatum,** siehe Rh. minus | | | | |
| **williamsianum** (Rehd. & Wils.) **I, S, St** Szechuan; niedrig bleibende Art mit dünnen, waagerechten Zweigen und **lederartigen, oval bis rundlichen, glänzenden Blättern.** Blüten zu 3—5 in 3—4 cm langen reinrosa Glocken im April. Der prächtig rotbraune Austrieb hebt sich schön von den reinrosafarbenen Glockenblüten ab. Benötigt Schutz vor Spätfrösten! Breite | 25—30 | 3,40 | 30,— | |
| | 30—40 | 4,10 | 37,50 | |
| | 40—50 | 5,25 | 47,— | |
| **wilsonii,** siehe Rh. laetevirens | | | | |

## Rhodotypus (S. & Z.) - Scheinkerrie - ROSACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **kerrioides** (S. & Z.), (R. scandens, Maki.) **F, S** Japan, Mittelchina, bis 2 m hoher, breit aufrecht wachsender Strauch mit doppelt gesägten, dunkelgrünen Blättern und reinweißen, bis 5 cm großen, endständigen Blüten im Mai bis Juni. | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **scandens,** siehe R. kerrioides | | | | |

## Rhus (L.) - Sumach, Essigbaum - ANACARDIACEAE (zweihäusig)

Die Rhusarten bevorzugen einen vorwiegend trockenen, steinigen Boden und gedeihen besonders gut auf Kalk. **Je ärmer der Boden ist, umso schöner wird die Herbstfärbung.**

**cotinus,** siehe Cotinus coggygria

**glabra** (L.) **E, F, L, R**

Östl. Vereinigte Staaten, **bis 5 m hoher, sparrig und malerisch wachsender, sich durch Wurzelausläufer verbreitender, baumartiger Strauch** mit kahlen, violett bereiften, braunen Zweigen. Früchte in dichten, scharlachroten, aufrechtstehenden, kolbenartigen Rispen. Ist wegen seiner bis 50 cm langen, fiederförmigen Belaubung, die sich im Herbst leuchtend karminrot färbt, **ein selten schönes Einzelgehölz.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| eintriebig | 80—100 | 1,70 | 15,— | |
| | 100—125 | 2,50 | 22,50 | |
| 2—4 Triebe | 80—100 | 3,40 | 30,— | |
| | 100—125 | 4,10 | 37,50 | |
| **Solitärbüsche,** mehrstämmig, 3 × verpflanzt. Wurzeln feucht verpackt. Auf Wunsch mit Ballen + 25 %. | 80—100 | 5,— | 45,— | |
| | 100—125 | 5,60 | 52,50 | |
| | 125—150 | 12,— | 105,— | |
| 5—10 Triebe. Höhe oder Breite | 150—200 | 16,50 | 150,— | |
| 10—20 Triebe. Höhe oder Breite | 125—150 | 25,— | | |
| | 150—175 | 30,— | | |
| | 175—200 | 33,— | | |
| | 200—250 | 36,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Rhus glabra** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **laciniata** (Carr.) **E, F, L, R** | | | | |
| **Schwachwachsende, sehr wertvolle Form** mit fiederschnittigen Blättern. **Hervorragendes Einzelgehölz.** | 80—100 | 2,60 | 24,— | |
| eintriebig | 100—125 | 3,40 | 30,— | |
| 2—4 Triebe | 80—100 | 4,50 | 41,— | |
| | 100—125 | 5,25 | 47,— | |
| **typhina** (L.), **Essigbaum** **E, F, L, R** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, **bis 10 m hoher, breit und sparrig wachsender, malerischer Baum mit dicken, samthaarigen Trieben.** Blätter 6- bis 15-paarig gefiedert. Sonst die gleichen guten Eigenschaften wie Rhus glabra. | | | | |
| eintriebig | 80—125 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| 2—4 Triebe | 80—125 | 3,40 | 30,— | |
| | 125—150 | 4,10 | 37,50 | |
| **Solitärbüsche,** mehrstämmig, 3 × verpflanzt. Wurzeln feucht verpackt. Auf Wunsch mit Ballen + 25 %. | 100—125 | 7,50 | 67,50 | |
| 5—10 Triebe. Höhe oder Breite | 125—150 | 9,— | 81,— | |
| | 150—200 | 12,— | | |
| 10—20 Triebe. Höhe oder Breite | 125—150 | 16,50 | | |
| | 150—200 | 22,50 | | |
| | 200—250 | 27,— | | |
| | 250—300 | 34,— | | |
| „ **laciniata** (Wood) **E, F, L, R** | | | | |
| Blätter fiederförmig geschlitzt. Herbstfärbung scharlach-orangerot, von malerisch schönem Wuchs. **Hervorragend für Einzelstellung geeignet. Besonders wertvoll!** | 80—100 | 2,60 | 24,— | |
| eintriebig | 100—125 | 3,40 | 30,— | |
| 2—4 Triebe | 80—100 | 4,50 | 41,— | |
| | 100—125 | 5,60 | 52,50 | |
| **Solitärbüsche,** mehrstämmig, 3 × verpflanzt. Wurzeln feucht verpackt. Auf Wunsch mit Ballen + 25 %. | 100—125 | 7,50 | | |
| 5—10 Triebe. Höhe oder Breite | 125—150 | 12,— | | |
| 10—20 Triebe. Höhe oder Breite | 125—150 | 25,— | | |
| | 150—200 | 33,— | | |
| **Ribes** (L.) - Stachelbeere, Johannisbeere - SAXIFRAGACEAE | | | | |
| **alpinum** (L.), **Alpenjohannisbeere** **F, H, R, S** | | | | |
| Bekannter, guter, frühaustreibender **Schatten- und Hekkenstrauch, der nährstoffreiche und kalkhaltige Böden bevorzugt.** Wird bis 2 m hoch. | | | | |
| **Büsche,** 2 × verpflanzt, 3—5 Triebe | 30—40 | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| 3—5 Triebe | 40—60 | 0,45 | 4,10 | 37,50 |
| 3—5 Triebe | 60—80 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| 5—8 Triebe | 30—40 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| 5—8 Triebe | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 52,50 |
| 5—8 Triebe | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 63,— |
| 8—12 Triebe | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| 8—12 Triebe | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **americanum,** siehe R. floridum | | | | |
| **arboreum,** siehe R. divaricatum | | | | |
| **aureum** (Pursh.), **Goldjohannisbeere** **H, R, S** | | | | |
| Mittel- und Westamerika, bis 3 m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch mit gelben, duftenden Blüten, April-Mai, und schwarzen Beeren. . . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **divaricatum** (Dougl.), (Ribes arboreum, Hort.) **Amerikanische Wildstachelbeere** **H, R, S** | | | | |
| Westl. Nordamerika, bis über 3 m hoch werdender, stark dornig bewehrter Strauch mit grünlichpurpurnen Blüten. **Eignet sich sowohl für dornige Anpflanzungen, wie als Vogelschutzgehölz** . . . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **floridum** (L'Hérit), (R. americanum, Mill.) **H, L, R, S** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, schattenverträglicher, bis 1,50 m hoher Strauch mit in Trauben hängenden, hellgelben Blüten im April-Mai. Früchte schwarz. Fällt durch seine lebhaft gelb bis **scharlachrote Herbstfärbung** auf. . . . | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **Büsche,** 3 × verpflanzt. Auf Wunsch mit Ballen + 25 %. 125—150 cm breit . . . . . | 125—150 | 4,10 | 37,50 | |
| **grossularia, Amerikanische Gebirgsstachelbeere** **F, H, R, S** | | | | |
| Bis 2 m hoher, kleinfrüchtiger, dorniger Schattenstrauch, der sich als gesund und mehltaufrei gezeigt hat und gut den Heckenschnitt verträgt. **Ein guter Ersatz für R. alpinum.** Nebenbei können die vielen Beeren auch gut zur Geleebereitung dienen. **Büsche,** 3—5 Triebe | | 0,35 | 3,— | 26,— |
| 5—8 Triebe | | 0,50 | 4,10 | 37,50 |
| 8—12 Triebe | | 0,55 | 5,— | 45,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Ribes** (Fortsetzung) | | | | |
| **sanguineum** (Pursh.), **Blutjohannisbeere** **H, R, S** Kalifornien, bis 2 m hoher Strauch mit großen roten Blütentrauben im April. . . . . | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **atrorubens** (Loud.) **H, R, S** Beste Form mit besonders tiefdunkelroten Blütentrauben. | 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 125—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| „ **King Edward VII., Neuheit!** **E, H, S** Strauch mit kompaktem Wuchs und großen, tief dunkelroten Blütentrauben. Blüht spät und ist eine der schönsten Formen, die leider nur durch Veredlung vermehrt werden kann. . . . . | 60—100 | 1,15 | 10,— | |

## **Robinia** (L.) - Robinie, Scheinakazie - LEGUMINOSAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **hispida macrophylla** (DC.) **B, R** **Eine Verbesserung von R. hispida,** die sich durch kräftigeren Wuchs auszeichnet und weniger unter Windbruch leidet. Desgleichen sind die karminrosa gefärbten, lockeren Trauben etwas größer und blühen 1-2 Wochen früher im Mai-Juni . . . . . | 80—100 | 3,75 | 34,— | |
| **pseudoacacia** (L.) **B, E, H, R** Östl. Vereinigte Staaten, bis 25 m hoher und locker wachsender, spät austreibender Baum **für trockene Sand- und Heideböden,** mit rissiger, brauner Rinde und **unpaarig gefiederten, gesunden Blättern.** Kann in passenden Lagen auch als **schöner, malerischer und mehrstämmiger Einzelbaum verwandt werden.** Verbreitet sich stark durch Ausläufer. **Gut zu verwenden zur Befestigung von Bahndämmen und für dornige Anpflanzungen. Eine Volltrachtpflanze für die Imkerei.** | | | | |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Beästung | 125—150 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 300—350 | 2,25 | 20,— | 188,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| „ **bessoniana** (Kirchn.) **B, E, R** Zweige unbewehrt, starkwachsend, eine geschlossene und ovale Krone bildend. Sehr wertvoller, **kleinkroniger Straßenbaum mit gesunder Belaubung.** | 8—10 | 5,40 | 50,— | |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 14—16 | 10,— | 90,— | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 175—200 cm, Kronendurchm. 175—200 cm, Kronenhöhe 175—200 cm | 18—20 | 28,— | | |
| Stammumfang | 20—25 | 37,50 | | |
| „ **pyramidalis** (Pépin.) **B, R** Wuchs säulenförmig, ähnlich der italienischen Pyramidenpappel. Triebe unbewehrt. | 150—175 | 4,10 | 37,50 | |
| | 175—200 | 5,— | 45,— | |
| „ **rozynskiana** (Hort.) **B, E, R** Äste waagerecht abstehend oder überhängend, Blätter bis 50 cm lang herabhängend. Außerordentlich reichblütig im Juni. **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 5,60 | | |
| | 10—12 | 6,40 | | |
| | 12—14 | 8,25 | | |
| „ **tortuosa** (DC.) **E, R** Ein auffallend interessanter, mittelstark und locker wachsender Baum mit gewundenen und gedrehten Zweigen und Blättern. **Bildet im Alter sehr malerische Kronen.** **Pyramiden** | 175—200 | 5,25 | 47,— | |
| „ **umbraculifera** (DC.), (R. inermis, Kirch.), **Echte Kugelakazie** **B, R** Ein feinzweigiger, unbedornter und mäßig stark wachsender, **kleinkroniger Straßenbaum mit gesunder Belaubung,** der ungeschnitten sehr schöne dichte und kugelrunde Kronen bildet. Sehr wertvoll. | 8—10 | 5,40 | 50,— | |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| | 14—16 | 10,— | 90,— | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 16—18 | 12,50 | | |

## **Rosa** (L.) - Rose - ROSACEAE

**Veredelte Strauchrosen** (Sortenbeschreibung, siehe unter Strauch- und Parkrosen, Seite 44—46)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **andersonii** . . . . . | 125—150 cm breit | 125—150 | |
| **Austrian Yellow** . . . . . | 70—100 cm breit | 100—125 | |
| **Frühlingsgold** . . . . . | 125—150 cm breit | 125—150 | |
| **Hugonis** . . . . . | 125—150 cm breit | 125—150 | |
| **moyesii** . . . . . | 100—150 cm breit | 125—150 | 6,— 54,— |
| **New Dawn** . . . . . | 125—150 cm breit | 125—150 | |
| **omeiensis pteracantha** . . . . . | 100—150 cm breit | 150—200 | |

**Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen

| Rosa (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **blanda** (Ait.) **B, F, H** | | | | |
| Nordöstl. Vereinigte Staaten, bis 2 m hoher, unbewehrter Strauch mit braunen Zweigen und 5—6 cm großen, rosa Blüten, Ende Juni. . . . . | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **canina** (L.), **Hundsrose** **B, F, H** | | | | |
| Bis 3 m hoher, bogig überhängender Strauch mit rosa Blüten im Juni. | 60—80<br>80—125 | 0,50<br>0,65 | 4,10<br>5,60 | 37,50<br>49,— |
| „ **von Kiese** **B, H** | | | | |
| Blüte karminrot, halbgefüllt, duftend, 8—9 cm Durchmesser. **Eine der schönsten Hundsrosen** . . . . . | 80—125 | 1,25 | 11,50 | 98,— |
| **eglanteria**, siehe R. rubiginosa | | | | |
| **ferruginea**, siehe R. rubrifolia | | | | |
| **lucida**, siehe R. virginiana | | | | |
| **multiflora** (Thunb.) **B, F, H, S** | | | | |
| Japan, China, bis 3 m hoher, dünnzweigiger und kletternder Strauch mit zahlreichen weißen Blüten im Juni-Juli. Guter Schattenstrauch. | 60—80<br>80—125 | 0,50<br>0,65 | 4,10<br>5,60 | 37,50<br>49,— |
| **pimpinellifolia**, siehe R. spinosissima | | | | |
| **rubiginosa** (L.), (R. eglanteria, L.), **Schottische Zaunrose** **B, F, H** | | | | |
| Europa, bis 3 m hoher, dicht aufrecht wachsender und stark bestachelter Strauch mit apfelartig duftenden Blättern und bis 3 cm breiten, frischrosa Blüten im Juni. **Guter, windbeständiger Heckenstrauch** mit scharlachroten Früchten. | 60—80<br>80—125 | 0,50<br>0,65 | 4,10<br>5,60 | 37,50<br>49,— |
| **rubrifolia** (Vill.), (R. ferruginea, Déségl.) **B, F, H** | | | | |
| Gebirge von Süd- und Mitteleuropa, bis 3 m hoher, schlanktriebiger Strauch mit rotbraun bereiften Zweigen und bläulichpurpurner Belaubung. Blüten einfach, karminrosa. Verlangt einen **nährstoffreichen Boden**. . . | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **rugosa** (Thunb.), **Jap. Apfelrose, Kartoffelrose** **B, F, H, R** | | | | |
| Nordchina, Korea, Japan, bis 2 m hoher Strauch mit dicken, filzigen und stark stacheligen und borstigen Zweigen. Blüten meist einzeln, rosarot. Früchte gut im Haushalt verwendbar. Völlig winterhart u. **sehr windbeständig.** | 30—40<br>40—60<br>60—80 | 0,50<br>0,65<br>0,75 | 4,10<br>5,60<br>6,75 | 37,50<br>49,—<br>60,— |
| „ **alba** (Hort.) **B, F, H, R** | | | | |
| Mit einfachen, weißen Blüten, sonst wie die Art. | 30—40<br>40—60 | 0,50<br>0,65 | 4,10<br>5,60 | 37,50<br>49,— |
| **setipoda** (Hemsl. u. Wils.) **B, E, F, R** | | | | |
| Nordamerika, bis 3 m hoher, locker wachsender Strauch mit hellrosa bis purpurfarbenen Blüten im Juli. **Früchte zeigen sich im Herbst in großer Zahl in flaschenförmigen scharlachrot gefärbten, lockeren Fruchtdolden.** . . . . | 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär**, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 125—150 | 5,— | 45,— | |
| **spinosissima** (L.), (R. pimpinellifolia, L.), **Bibernellrose** **B, F, H** | | | | |
| Europa, Westasien, **bis 2 m hoher, Ausläufer treibender** Strauch mit dünnen, sparrigen und stacheligen bis borstigen Zweigen. Die zahlreichen, einfachen, reinweißen Blüten sind bis 6 cm breit, Mai-Juni. . . . . | 60—80<br>80—125 | 0,75<br>0,90 | 6,75<br>8,25 | 60,—<br>75,— |
| **virginiana** (Mill.), (R. lucida, Ehrh.) **B, F, H, L** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, **bis 1,50 m hoher, dichtverzweigter Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung** und einfachen, bis 6 cm breiten, rosa Blüten. Zeichnet sich durch die karminroten, lange haftenden Fruchtdolden und durch die **hübsche Herbstfärbung** aus. | 60—80<br>80—125<br>125—150 | 0,65<br>0,75<br>0,85 | 5,60<br>6,75<br>7,50 | 49,—<br>60,—<br>67,50 |

## Rubus (L.) - Brombeere, Himbeere, Weinbeere - ROSACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **fruticosus** (L.) **B, F, R, S** | | | | |
| Europa, unsere heimische Brombeere. Eignet sich besonders zur **Bepflanzung von armen, sandigen Böden und zur Halden- und Trümmerbegrünung.** 2j. Ausläufer | 60—100 | 0,40 | 3,— | 26,— |
| **henryi**, siehe unter Schling- und Kletterpflanzen | | | | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Rubus** (Fortsetzung) | | | | |
| **lasiostylus** (Focke), **Neueinführung!** **E, L, S** | | | | |
| Mittelchina, aufrechtwachsender, bis 2 m hoch werdender Strauch mit **weißbereiften, stachelborstigen Trieben** und lichtgrünen, unten grauweißfilzigen, gefiederten Blättern. Blüten purpurn. **Besitzt auch im Winter mit seinen weißbreiften, stachelborstigen Trieben einen hohen Zierwert.** . . . . . | 80—125 | 1,30 | 12,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—125 cm breit | 125—150 | 6,— | | |
| 250—300 cm breit | 150—200 | 22,50 | | |
| **odoratus** (L.), **Wohlriechender Himbeerstrauch** **B, R, S** | | | | |
| Östliches Nordamerika, bis 2 m hoher, Ausläufer treibender Strauch mit vielblumigen, karminroten Blütenrispen. **Sehr anspruchslose,** üppig wachsende, großlaubige Art **für schattige und feuchte Lagen.** . . . . . | 70—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **albus** (Hort.), **Neuheit!** **B, R, S** | | | | |
| Eine kürzlich hier entstandene Mutation mit schöner, großer, reinweißer Blüte. Wirkungsvoller als die Art. | 70—100 | 1,70 | 15,— | |
| **phoenicolasius** (Maxim.), **Japanische Weinbeere** **B, E, F, R** | | | | |
| Korea, Japan, bis 2,50 m hoher Strauch mit **malerischem Wuchs,** für halbschattige Lagen, Blüten im Juni-Juli in vielblumigen, rosa Trauben. Die eßbaren Früchte sind himbeerartig gelbrot gefärbt. **Die elegant überhängenden Triebe sind dicht mit roten Drüsenborsten besetzt** . . . | 70—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **spectabilis** (Pursh.) **B, F, R, S** | | | | |
| Nordwestamerika, bis 1,20 m hoher, aufrecht wachsender Strauch mit karminroten, leicht nickenden, 2,5 cm breiten Blüten. Die orangegelbe Frucht hat die Größe einer Himbeere. **Gut zur Befestigung von schattigen Grabenrändern und Böschungen zu gebrauchen. Auch für Windschutzstreifen zu empfehlen.** . . . . . | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Salix** (L.) - Weide - SALICACEAE | | | | |
| **alba** (L.), **Weiß- oder Kopfweide** **B, R** | | | | |
| Europa bis Mittelasien, bis 25 m hoher, heimischer Baum mit **malerischem Habitus und weithin sichtbarer silbriger Belaubung.** Dieser durchaus sturmsichere Baum eignet sich auf Grund seines dichten Wurzelwerks als Bodenbefestigungspflanze und zur Wasserlaufbepflanzung. Die Rinde enthält 9,4 % Gerbsäure. **Eine wertvolle Windschutzpflanze, ganz besonders für Obstplantagen. Büsche** | 125—175 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 300—350 | 2,25 | 20,— | 188,— |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt. 150—200 cm breit | 300—400 | 20,— | | |
| 300—350 cm breit | 600—700 | 33,— | | |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 6—8 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| „ **argentea** (Wimm.), (S. sericea, Gaud.) **L, R** | | | | |
| Blätter beiderseits dicht seidig behaart und silbrig glänzend. . . . . | 125—175 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **tristis,** siehe S. alba vitellina pendula | | | | |
| „ **vitellina pendula** (Rehd.), (S. alba tristis, Gaud.) **E, R** | | | | |
| Bekannte Trauergoldweide mit senkrecht niederhängenden, hellgelben Zweigen. Bei Herbstpflanzung treten häufig Verluste ein. Wir empfehlen daher Frühjahrspflanzung mit Erdballen, welchen wir nur gering berechnen. | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 200—250 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Pyramiden** mit geradem Mittelstamm und langer, seitlicher Bezweigung | 300—350 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| | 350—400 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| **Mehrstämmige Büsche** mit 3—5 Grundtrieben | 150—200 | 2,25 | 20,— | |
| | 200—250 | 3,— | 27,— | |
| **Solitärbüsche,** 3 × verpflanzt. 200—250 cm breit . . | 200—250 | 5,— | | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 14—16 | 8,25 | 75,— | |

| Salix (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **aurita** (L.) **B, R, S**<br>Europa, Westasien, heimischer, bis 2 m hoher, dichtwachsender Strauch mit kleinen, stumpfgrünen, leicht runzeligen Blättern. **Ein wertvolles heimisches Gehölz für Autobahnbepflanzungen.** . . . . . | 60—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **caprea hybrida** (Hort.) **B, R, S**<br>Eine wertvolle, mittelhoch bis baumartig wachsende Varietät der Saalweide. Sehr wertvolle Bienenweide. . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **mas** (L.) **B, R, S**<br>Diese veredelte männliche Kätzchenweide kann als die wertvollste Weide bezeichnet werden. | 100—150<br>150—200 | 1,30<br>1,50 | 12,—<br>13,50 | 105,—<br>120,— |
| **Hochstämme** und **Stammbüsche,** bis unten beästet. 80—125 cm breit und 250—400 cm hoch. Stammumfang | 8—10<br>10—12<br>12—14 | 4,50<br>5,40<br>6,40 | 41,—<br>50,— | |
| **cinerea** (L.), **Aschweide** **B**<br>bläulich bereiften Zweigen und bis zu 10 cm langen, glänfilzigen Zweigen. Im Frühjahr ist der Baum lückenlos mit silberweißen Kätzchen besetzt. . . . . | 80—150 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **daphnoides** (Vill.), **Reifweide** **B**<br>Europa bis Mittelasien, großer, **bis 10 m hoher Baum** mit bläulich bereiften Zweigen und bis zu 10 cm langen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Wertvolle Kätzchenweide. | 125—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **pommeranica** (W. Koch) **B, R**<br>Bedeutend wertvoller als der Typ. Blüten vor den Blättern. Die im März-April erscheinenden Kätzchen sind bis 8 cm lang. Wertvolle Bienenweide. . . . . | 125—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **praecox** **B, R**<br>Früheste Kätzchenweide, männliche Kätzchen bis 9 cm lang. Sehr wertvoll. . . . . | 125—175 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **ruberrima** (Hort.), (S. pulchra ruberrima, Hort.) **B, R**<br>Eine wertvolle Varietät mit rötlichem Holz. Kätzchen erscheinen im März-April vor den Blättern. Gut geeignet zum Kätzchenschnitt. . . . . | 125—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **incana** (Schrank.) **B, R**<br>Mittel- und Südeuropa, **bis 15 m hoher, breitwachsender Strauch** mit bis 12 cm langen, lineal bis lanzettlichen, unten weißfilzigen Blättern. . . . . | 60—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **pendulifolia** (Krü.), **Neuheit!** **B, R**<br>**Bis 6 m hoher Strauch** mit lang überhängenden, blaubereiften Zweigen und mit langen, frischgrün glänzenden Blättern. Eine sehr wertvolle neuere Sorte. Die großen, männlichen Kätzchen erscheinen bereits im Januar bis Februar. . . . . | 125—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **pentandra** (L.), **Lorbeerweide** **B, R**<br>Europa-Kaukasus, **bis 20 m hoch werdender, baumartiger Strauch** mit glänzenden Zweigen und elliptisch bis eiförmigen, 12 cm langen, derben und stark glänzenden, tiefgrünen Blättern. Eine wertvolle Zierweide. . . . . | 100—150 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **pulchra ruberrima,** siehe S. daphnoides ruberrima | | | | |
| **purpurea** (L.), **Purpurweide** **B, R**<br>Europa, Nordafrika, Mittelasien-Japan, bis 3 m hoher Strauch mit schlanken und sehr zähen Zweigen und gegenständigen, gesägten, oben stumpfgrünen, unten hellbläulichgrünen Blättern. Eine wertvolle Bindeweide. . . | 125—175 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **gracilis** (Gren. & Godr.), (S. uralensis, Hort.) **B,R**<br>Feinzweigig, schmalblättrig, vorzügliche Bindeweide. | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **nana** (Hort.) **L, St**<br>**Kleiner, bis 1 m hoch werdender, wertvoller, dichtverzweigter Strauch** mit lanzettlich, bläulichgrün gefärbten Blättern. Hervorragend für **kleinbleibende Hecken** geeignet. . . . . | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **repens argentea** (W. Koch), (S. repens nitida, Wender.), **Silberkriechweide** **St**<br>Europa, reizend kriechender Strauch mit rundlichen, ober- und unterseits silbrigen Blättern. . . . . | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **nitida,** siehe S. repens argentea | | | | |

| Salix (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **simulatrix** (B. White), (S. herbacea x formosa) **B, St** | | | | |
| Schweiz, Strauch von **kriechendem Wuchs,** Blätter 1,5 cm | 15—20 | 1,15 | 10,— | |
| lang, Kätzchen an belaubten Zweigen. | 20—30 | 1,30 | 12,— | |
| Mit Ballen | 30—40 | 1,70 | 15,— | |
| **smithiana** (Willd.), (S. viminalis x caprea) **B** | | | | |
| Dieser **bis 6 m hohe Strauch** kann als eine der wertvollsten Kätzchen- und Bienenweiden bezeichnet werden. Die Triebe sind bis zu den äußersten Spitzen mit anfangs rötlichen Kätzchen besetzt. . . . . | 125—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **viminalis** (L.), **Korbweide** **B, R** | | | | |
| Europa bis Nordasien, Wuchs aufrecht, **5—10 m hoch werdend,** wertvolle Nutzweide. Die Rinde enthält 11,9 % Gerbsäure. Gut für **Windschutzstreifen** geeignet. . . . | 125—200 | 0,65 | 5,60 | 49,— |

## Sambucus (L.) - Holunder - CAPRIFOLIACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **canadensis lutea** (Hort.) **F, L** | | | | |
| Bis 3 m hoher Strauch mit gesunden goldgelben Blättern. Frucht leuchtendrot. . . . . | 80—125 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **maxima** (Schwer.) **F, R, S** | | | | |
| Nordamerika, Ausläufer treibender, bis 4 m hoher Strauch mit graugelblichen, anfangs bereiften Zweigen. Die gelblichweißen, schirmförmig angeordneten **Doldenrispen erreichen eine Größe bis zu 40 cm.** Beeren 4—5 mm dick, glänzend schwarzpurpur. . . . . | 70—100 | 1,15 | 10,— | |
| **nigra** (L.), **Schwarzer Holunder** **F, H, R, S** | | | | |
| Europa, Nordafrika, Westasien, bis 10 m hoher Strauch, sonst wie S. canadensis. Bevorzugt im Gegensatz zu S. canadensis einen nährstoff- und kalkreichen Boden. Verträgt auch leichten Salzgehalt und tiefen Schatten. Gut geeignet für **Windschutzstreifen.** | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 150—200 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| „ **laciniata** (L.) **F, R, S** | | | | |
| Eine feingeschlitzte Art, die sich durch besonders reichen Fruchtertrag auszeichnet, reift gleichmäßig. | 80—125 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 150—200 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **racemosa** (L.), **Traubenholunder** **F, H, R, S** | | | | |
| Europa, Westasien, bis 4 m hoher Strauch mit großer, frischgrüner Belaubung und roten Blattstielen. Zeichnet sich besonders durch die **scharlachroten Früchte** aus. **Diese typische Ruderal- und Gesellschaftspflanze verlangt einen frischen Boden.** . . . . . | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

## Sarcococca (Ldl.) - Schleimbeere - BUXACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ruscifolia** (Stapf.) **I, St** | | | | |
| Mittel- und Westchina. Ein sehr langsam wachsender, kaum über 50 cm hoch werdender, immergrüner Strauch mit eielliptischen, 3—5 cm langen, glänzenden Blättern und zierlichkleinen, weißen Blüten im November bis Februar. Mit Ballen | 15—20 | 1,50 | 13,50 | |

## Sarothamnus scoparius, siehe Cytisus scoparius

## Skimmia (Thunb.) - Skimmie - RUTACEAE

**Bevorzugen in halbschattiger, windgeschützter Lage einen milden Lehmboden.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **foremannii** (Knight), (S. japonica x reevesiana) **F, I, S, St** | | | | |
| Strauch mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zwittrigen, meist männlichen, weißen Blüten folgen rote Früchte. | 25—30 | 2,— | 17,— | 150,— |
| | 30—40 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| Mit Ballen | 40—50 | 3,30 | 30,— | |
| **japonica** (Thunb.) **F, I, S, St** | | | | |
| Japan, kleiner, bis 1,50 m hoher, harter, immergrüner, schattenliebender Strauch mit lederartigen Blättern. Die weißen Blüten im Mai sind nur klein, umso auffallender sind die großen, ovalen, **korallenroten Früchte.** Mit Ballen | 30—40 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 40—50 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| | 50—60 | 4,50 | 41,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 50—60 | 6,— | | |
| **reevesiana rubella** (Rehd.) **I, S, St** | | | | |
| Breitwachsende, männliche Form mit schwarzgrünem Laub und schönen roten Blattstielen, Knospen und Blüten. **Ist sehr frosthart.** Mit Ballen | 25—30 | 2,— | 17,— | 150,— |
| | 30—40 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 40—50 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 50—60 | 6,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Sophora** (L.) - Schnurbaum - LEGUMINOSAE | | | | |
| **japonica** (L.) **B, L** | | | | |
| China, Korea, bis 20 m hoher, rundkroniger Baum mit **gesunder, frischgrüner, lange haftender und gefiederter Belaubung.** Blüten in großen, gelblichweißen, bis 25 cm langen, endständigen Rispen im August, **die gern von Bienen beflogen werden.** Die Frucht ist eine runde, perlschnurartige Hülse. **Wundervoller, spätblühender Park- und Straßenbaum** für gute, nährstoffreiche Böden. | | | | |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Beästung | 150—200 | 3,60 | 33,— | |
| | 200—250 | 4,50 | 40,— | |
| | 300—350 | 6,75 | 60,— | |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 7—8 | 8,25 | 75,— | |
| | 8—10 | 10,50 | 94,— | |
| **Sorbaria** (A. Br.) - Fiederspiere, Ebereschenspiere - ROSACEAE | | | | |
| **aitchisonii** (Hemsl.) **B, S** | | | | |
| Afghanistan, Kaschmir, **bis 3 m hoher Spätsommerblüher** mit großen, rotgestielten Fiederblättern. Blüten im Juli-August in langen, bis 25 cm großen, weißen Rispen. Zeichnet sich durch einen **gefälligen und lockeren Wuchs aus.** | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **arborea glabrata** (Rehd.) **B, S** | | | | |
| Zweige und Blattstiele kahl; Staubfäden viel größer als die Petalen. Blüte Juli-August. **Strauch wird bis 6 m hoch.** | 80—125 | 0,75 | 6,75 | |
| **sorbifolia** (A. Braun) **B, S** | | | | |
| Nordasien, **bis 2 m hoher, Ausläufer treibender Strauch** mit sonst gleich wertvollen Eigenschaften. Ist besonders reichblumig. | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| „ **stellipila** (Maxim.) **B, S** | | | | |
| Ostasien, Form mit unterseits weißlich büschelhaarigen Blättern. Blütenstände bedeutend größer, schneeweiß. Ein nicht genug geschätzter Sommerblüher, sollte weit mehr verwendet werden. | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 125—150 cm breit | 125—150 | 4,10 | 37,50 | |
| **Sorbus** (L.) - Eberesche, Mehlbeere, Speierling - ROSACEAE | | | | |
| **aria** (Crantz.), **Gemeine Mehlbeere** **B, F, L** | | | | |
| Europa, bis 15 m hoher Baum mit breitpyramidaler Krone und bis 12 cm langen, oval bis eiförmigen, scharf gesägten, tiefgrünen, unten dicht weißfilzigen Blättern. Frucht bis 2 cm lang und rotorange. | 125—150 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| **Hochstämme,** in fertigem Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand. Stammumfang | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| | 14—16 | 11,— | 98,— | |
| | 16—18 | 12,50 | 112,— | |
| „ **lutescens** (Hartw.) **B, L** | | | | |
| Europa, pyramidal wachsender, bis 15 m hoher Baum mit leuchtend gelbem Austrieb. Belaubung großblättrig und stark filzig. Bevorzugt einen nährstoffreichen Boden. **Hochstämme,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | |
| „ **magnifica** (Hesse) **B, F, L** | | | | |
| Eine besonders straff aufrecht wachsende Form mit bedeutend größeren, unterseits fast weißen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Geschätzter Alleebaum. | 125—150 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 150—200 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 200—250 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| | 250—300 | 4,— | 36,— | 330,— |
| **Hochstämme** und **Stammbüsche,** 60—80 cm breit und 200—300 cm hoch Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| **Hochstämme,** in fertigem Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand. Stammumfang | 10—12 | 7,— | 64,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| | 14—16 | 11,— | 98,— | |
| | 18—20 | 16,50 | 150,— | |
| | 20—25 | 24,— | 210,— | |
| **aucuparia** (L.), **Gemeine Eberesche** **B, F, R, S** | | | | |
| Europa bis Westasien, bis 15 m hoher Baum mit rundlicher Krone, gefiederten Blättern und reichen, **herrlich gefärbten, korallenroten Früchten.** In schön gewachsenen Exemplaren einer unserer wertvollsten fruchttragenden Einzelbäume. Ist in der Jugend auffallend schattenverträglich. Stellt ein besonders wertvolles **Windschutzmaterial** dar und verträgt längere Überschwemmungen. Einer unserer besten Honigspender! | 125—150 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 150—200 | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |

| Sorbus aucuparia (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Mehrstämmige Büsche,** mit 3—4 Grundtrieben | 200—250 | 3,40 | 30,— | |
| | 250—300 | 4,10 | 37,50 | |
| | 300—350 | 5,25 | 47,— | |
| 5—10 Grundtrieben | 200—250 | 5,25 | 47,— | |
| | 250—300 | 6,— | 54,— | |
| | 300—350 | 7,50 | 67,50 | |
| | 350—400 | 10,— | 90,— | |
| **Alleebäume und Stammbüsche,** Stammumfang | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| „ **edulis,** siehe Sorbus aucuparia moravica | | | | |
| „ **moravica** (Zengerling), (S. aucuparia edulis, Dieck.), **Eßbare Eberesche** **B, F, R** Zeichnet sich durch einen gleichmäßigeren, pyramidalen Wuchs und durch einen **sehr starken Fruchtertrag aus,** gut als Alleebaum. Die Früchte sind groß, nicht bitter und von angenehmer Säure. | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Alleebäume und Stammbüsche,** Stammumfang | 7—8 | 3,— | 27,— | 250,— |
| | 8—10 | 3,75 | 34,— | 300,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 360,— |
| | 12—14 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 14—16 | 6,40 | 58,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 200 cm, Kronendurchm. 200 cm, Kronenhöhe 300—400 cm. Stammumfang | 20—25 | 34,— | | |
| | 30—35 | 56,— | | |
| **foliolosa** (Spach.), (S. vilmorinii, C. Schn.) **E, L** Himalaja, **sehr wertvoller, langsam wachsender Baum mit sehr dekorativen, 15 cm langen, achtpaarig gefiederten, unten weißlichgrau behaarten, dunkelgrünen Blättern.** Blüten Ende Mai bis Juni in weißen, lockeren Doldentrauben. Frucht rosarot. **Hochstämme,** Stammumfang | 7—8 | 3,75 | 34,— | |
| | 8—10 | 4,50 | 41,— | |
| **intermedia,** siehe S. suecica | | | | |
| **latifolia** (Pers.), (S. aria x torminalis) **B, F, R** Mitteleuropa, bis 15 m hoher, sich prächtig, ganz regelmäßig breitpyramidal aufbauender Baum mit dunkelgrüner, mattglänzender Belaubung und zahlreichen, großen, gelbbraunen Früchten. **Sehr wertvoll!** | 150—200 | 2,70 | 25,— | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 3,30 | 30,— | |
| | 250—300 | 4,— | 36,— | |
| **suecica** (Krocklet Almg.), (S. scandica, Fries.; S. intermedia Pers.), **Schwedische Mehlbeere, Oxelbeere** **B, F, R** Nordeuropa, bis 10 m hoher Baum mit dunkelgrünen, unterseits weißgraufilzigen Blättern. Eine sehr wertvolle, gleichmäßige Kronen bildende und **außerordentlich windbeständige Eberesche,** die nicht genug empfohlen werden kann. **Wertvollstes Windschutzgehölz.** | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung | 200—250 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 10—12 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 14—16 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang | 10—12 | 6,75 | 60,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| | 14—16 | 11,— | 98,— | |
| | 16—18 | 12,50 | 112,— | |
| | 18—20 | 16,50 | 150,— | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 200 cm, Kronendurchm. 150—200 cm, Kronenhöhe 300 cm. Stammumfang | 18—20 | 25,— | | |
| | 20—25 | 34,— | | |
| **vilmorinii,** siehe S. foliolosa | | | | |

## Spartium (L.) - Binsenpfriemen - LEGUMINOSAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **junceum** (L.) **B, St** Mittelmeergebiet, meist blattloser, bis 3,5 m hoher Strauch, mit fast binsenartigen Zweigen und lanzettlichen, 1—3 cm langen, bläulich-grünen Blättern. Die im Mai bis September erscheinenden, duftenden, 2,5 cm breiten, goldgelben Blüten erinnern an Cytisus scoparius. Mit Topfballen | 40—60 | 0,90 | 8,25 | |

| Spiraea (L.) - Spierstrauch - ROSACEAE | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **albiflora** (Zbl.), (Sp. callosa alba) **B, e, R, St** | | | | |
| Japan, niedriger, bis 50 cm hoch werdender, weiß blühender, kleiner Heckenstrauch. . . . . | 30—40 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **arguta** (Zbl.), (Sp. thunbergii x multiflora) **B, H, R** | | | | |
| Bis 2 m hoher Strauch mit leicht überhängenden, dünnen Zweigen, die im April-Mai überaus reich mit reinweißen Doldentrauben besetzt sind. **Einer der dankbarsten und gegen Trockenheit unempfindlichsten Frühjahrsblüher. Eignet sich gut zum Treiben.** | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 60—80 | 1,— | 9,— | 82,50 |
| | 80—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—125 cm breit | 100—125 | 4,50 | | |
| | 125—150 | 6,— | | |
| **ariaefolia,** siehe Holodiscus discolor ariaefolius | | | | |
| **bullata** (Maxim.), (Spiraea crispifolia, Hort.) **e, R, St** | | | | |
| **Japan, bis 40 cm hoher, feinzweigiger und sehr dichtverzweigter Heckenstrauch** mit dunkelgrünen, blasig runzligen Blättern und mit in halbkugeligen, dunkelrosafarbigen Doldentrauben sitzenden Blüten, Juli-August. . . . | 15—20 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **bumalda Anthony Waterer** (A. Waterer), (Sp. pumila Anthony Waterer, Hort.) **B, e, H, R, St** | | | | |
| **Bis 1 m** hoher, dichtverzweigter, niedriger Heckenstrauch, der mit seinen karminroten, flachen Doldentrauben fast den ganzen Sommer blüht. . . . . | 30—40 | 0,50 | 4,— | 37,50 |
| | 40—60 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **froebelii** (Rehd.), (Sp. pumila froebelii) **B, H, R** | | | | |
| **Bis 1,50 m** hoher Heckenstrauch mit großen, dunkelpurpurnen Doldentrauben, Juli-August. Zeichnet sich noch durch den braunroten Austrieb aus. . . . . | 60—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **callosa alba,** siehe Sp. albiflora | | | | |
| **douglasii** (Hook.) **B, H, R** | | | | |
| Nordamerika, **bis 2,50 m** hoch werdender Strauch mit weißfilzigen Trieben und Blättern und langen, purpurrosa Blütenrispen im Juli-August. . . . . | 100—150 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **margaritae** (Zbl.), (S. japonica x superba) **B, H, R** | | | | |
| **Bis 1,50 m** hoher Strauch mit dunkelbraunen Trieben und elliptischen, bis 8 cm langen, groben, doppeltgesägten, dunkelgrünen, leicht behaarten Blättern. Die lebhaft rosafarbigen Blüten erscheinen im Juli-August in großen, behaarten Doldentrauben. . . . . | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **menziesii triumphans** (Bean) **B, H, R** | | | | |
| Nordwestamerika, **bis 2 m** hoher Strauch mit lebhaft karminrosa gefärbten, bis 20 cm langen, schmalpyramidalen Blütenrispen, Juni-August. . . . . | 100—150 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **nobleana** (HK.), (S. sanssouciana, K. Koch), (S. japonica x douglasii) **B, H, R** | | | | |
| Mittelhoch wachsender Strauch, mit feinfilzigen, kantigen, gestreiften Zweigen und doppelt gesägten, lanzettlichen, 7—9 cm langen Blättern. Die in besonders schön verzweigten Rispen stehenden, mittelgroßen, rosa Blüten erscheinen Anfang Juli. . . . . | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **opulifolia,** siehe Physocarpus opulifolius | | | | |
| **prunifolia plena** (C. Schneid.) **E, H, R, St** | | | | |
| Korea, China, **bis 1,50 m** hoher, malerischer, lang überhängender Strauch mit kleinen, **glänzend frischgrünen Blättern** und roter Herbstfärbung. Die Zweige sind Ende April bis Mai überreich mit gefüllten, reinweißen Blütendolden besetzt. In geschützten Lagen eine der edelsten **Sorten** für Einzelstellung. . . . . | 60—80 | 1,30 | 12,50 | 105,— |
| **pumila Anthony Waterer,** siehe Sp. bum. Anth. Waterer | | | | |
| „ **froebelii,** siehe Sp. bum. froebelii | | | | |
| **thunbergii** (Sieb.) **B, H, R** | | | | |
| Japan, China, **bis 1 m** hoher, sehr reichblühender, leicht überhängender und fein verzweigter Strauch mit frischgrüner Belaubung und weißen Blütenrispen im April-Mai. Ist sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit. Zum **Treiben** geeignet. . . . . | 40—60 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **trilobata** (L.) **E, R, St** | | | | |
| Nordchina bis Turkestan, **bis 1 m hoher, reizender kleiner Strauch** mit kleinen, 3-lappigen, bläulichgrünen Blättern und vielen reinweißen Doldentrauben von Ende Mai-Juni. . . . . | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Spiraea** (Fortsetzung) | | | | |
| **vanhouttei** (Zbl.), (Sp. cantoniensis x trilobata) **B, H, R, S** Dieser, **bis 2 m** hoch werdende, bekannte, wertvolle Hekken- und Gruppenstrauch ist neben der früher blühenden Sp. arguta eine der besten, schattenverträglichsten und robustesten Sorten überhaupt. Blüten Ende Mai-Juni. | 80—100<br>125—150 | 0,65<br>0,75 | 5,60<br>6,75 | 49,—<br>60,— |
| **Staphylea** (L.) - Pimpernuß - STAPHYLEACEAE | | | | |
| **colchica** (Stev.) **B, E** Kaukasus, bis 4 m hoher, aufrecht wachsender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und **mit bis 10 cm langen,** duftenden, reinweißen, aufrecht stehenden Blütenrispen im Mai. **Sehr wertvoller, seltener Einzelstrauch für frische und nährstoffreiche Böden.** . . . . . | 60—80 | 2,50 | 22,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 50—60 cm breit | 100—125<br>125—150 | 5,—<br>7,50 | | |
| **pinnata** (L.) **B, E, S** Mittel- und Südeuropa, aufrecht wachsender, baumartiger Strauch mit lebhaft grüner, unten bläulich graugrüner Belaubung und bis 1 cm langen, grünlichweißen, rötlich überlaufenen Blüten in 12 cm langen, hängenden Trauben. **Wertvoller und seltener Einzelstrauch für frische und nährstoffreiche Böden** . . . . . | 80—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—100 cm breit<br>80—100 cm breit | 100—125<br>125—150<br>150—175 | 2,60<br>4,10<br>5,60 | | |
| **Stephanandra** (S. & Z.) - Kranzspiere - ROSACEAE | | | | |
| **flexuosa,** siehe St. incisa | | | | |
| **incisa** (Zbl.), (St. flexuosa, S. & Z.) **H, L, R, St** Japan, Korea, bis 1,50 m hoher, wertvoller Strauch mit sehr feinen, leicht überhängenden Trieben und **zierlich gelappter Belaubung,** die sich im Herbst braunrot färbt. Die lockeren, bis 6 cm langen, weißen Doldentrauben erscheinen im Juni. Verdient in stärkerem Maße, auch für niedrige Hecken verwandt zu werden . . . . . | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit<br>125—150 cm breit | 80—100<br>100—125 | 4,10<br>15,— | 37,50 | |
| **tanakae** (Franch.) **B, H, L, R** Japan, bis 2 m hoher, kräftig wachsender Strauch mit dunkelgrüner, gelappter und gekerbter Belaubung. Herbstfärbung tief braunrot. Blüten erscheinen im Juni in 10 cm langen, weißen Doldentrauben. **Auch sehr wertvoll.** . . . . . | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Stranvaesia** (Ldl.) - ROSACEAE | | | | |
| **davidiana** (Dcne.) **B, E, F, H, I** Westchina, bei uns bis über 6 m hoher, sparrig wachsender, **immergrüner** Strauch mit lanzettlichen, glänzendgrünen Blättern, die zur Zeit des Austriebes rosarot umrandet sind. Blüten weiß in endständigen Doldentrauben. Im Herbst heben sich die zahlreichen scharlachroten Fruchtstände besonders schön vom frischgrünen Laub ab. **Eine sehr dekorative, schönfrüchtige, immergrüne Einzelpflanze.** | 60—80 | 2,50 | 22,50 | |
| Mit Ballen | 80—100 | 3,30 | 30,— | |
| **Symphoricarpus** (L.) - Schneebeere - CAPRIFOLIACEAE | | | | |
| **albus laevigatus,** siehe S. racemosus | | | | |
| **chenaultii** (Rehd.), (S. microphyllus x orbiculatus) **B, F, H, R ,S** Bis 1,50 m hoher Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern und mit glockigen bis trichterförmigen, rosa Blüten im Juni-Juli. **Im Herbst zieren die violetten Früchte. In geschützten Lagen wohl die hübscheste Form.** . . . . | 70—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **orbiculatus** (Mch.), **Rundblättrige Schneebeere, Korallenbeere** **B, F, H, L, R, S** Östl. Vereinigte Staaten, bis 1,50 m hoher, **schattenverträglicher Strauch mit blaßroten Blüten im Juli-August und purpurroten, sehr lange haftenden Beeren.** Zeichnet sich nebenbei noch durch eine sehr schöne Herbstfärbung aus. . . . . | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| „ **aureo-variegatus** (Hook.) **B, F, H, L, R, S** Blätter goldgelb gerandet und geadert. . . . . | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Symphoricarpus** (Fortsetzung) | | | | |
| **racemosus** (Mchx.), (S. albus laevigatus, Blake.), **Gemeine Schneebeere** **B, F, H, R, S** | | | | |
| Kanada, bis 2 m hoher, aufrecht wachsender Strauch mit rötlichweißen Blütenähren im Juni-September. Die weißen Beeren haften bis nach dem Laubfall. Eignet sich **gut für schattige Lagen.** | 40—60 | 0,50 | 4,50 | 37,50 |
| | 80—100 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| **Syringa** (L.) - Flieder - OLEACEAE | | | | |
| **amurensis japonica** (Fr. & Sav.) **B, E, R** | | | | |
| Japan, bis 10 m hoher Baum mit breiteiförmigen, lebhaft grünen, unterseits blaugrünen Blättern und gelblichweißen, in bis zu 30 cm langen Rispen stehenden Blüten. | 60—80 | 1,70 | 15,— | |
| Ist die am spätesten blühende Fliederart. | 80—100 | 2,25 | 20,— | |
| **chinensis** (Willd.), (S. rothomagensis, De Launey), (S. persica x vulgaris), **Chinesischer Flieder** **B, E, H, R** | | | | |
| Bis 4 m hoher Strauch mit **zierlich überhängender, feiner Bezweigung.** Im Mai ist der Strauch mit violetten Blütenrispen bedeckt. | 60—80 | 2,25 | 18,50 | 170,— |
| | 80—100 | 2,60 | 22,50 | 200,— |
| | 100—125 | 3,— | 27,— | 240,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 125—150 | 12,— | | |
| | 150—175 | 15,— | | |
| 150—200 cm breit | 150—175 | 30,— | | |
| | 175—200 | 37,50 | | |
| | 200—225 | 45,— | | |
| **josikaea** (Jacq.) **B, E, R** | | | | |
| Ungarn, Galizien, kräftig wachsender, bis 4 m hoher Strauch mit dunkelvioletten, bis 20 cm langen, gut duftenden Blütenrispen im Mai. Wächst in seiner Heimat auf sonnigen, steinigen Berghängen. **Ein außerordentlich winterharter Park- und Heckenstrauch.** | 60—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 100—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 125—150 | 3,40 | 30,— | |
| 125—150 cm breit | 175—200 | 22,50 | | |
| **reflexa** (Schneid.) **B, E, R** | | | | |
| Mittelchina, bis 4 m hoher, breit aufrecht wachsender, **sehr wertvoller, spätblühender Einzelstrauch** mit dunkelgrünen, harten Blättern, die ihn sehr rauchfest machen. | 80—100 | 2,60 | 22,50 | |
| Die dunkelrosa gefärbten, bis 20 cm langen, überhängenden Blütenrispen erscheinen im Juni. Knospe ist karminrot gefärbt. 3 × verpflanzt | 100—125 | 3,— | 27,— | |
| | 125—150 | 4,10 | 37,50 | |
| | 150—175 | 5,— | 45,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 100—125 | 4,10 | 37,50 | |
| | 125—150 | 5,60 | | |
| | 150—175 | 8,25 | | |
| 125—150 cm breit | 175—200 | 16,50 | | |
| **rothomagensis,** siehe S. chinensis | | | | |
| **swegiflexa** (Hesse), (S. reflexa x sweginzowii) **B, E, R** | | | | |
| Diese bis 4 m hoch werdende Kreuzung kann mit ihren bis 30 cm langen, zierlich überhängenden, zartrosa bis weinroten Blütenrispen als die **wertvollste, spätblühende Sorte überhaupt** bezeichnet werden. Die Knospe ist tiefrot. Sehr wertvoller und malerischer Einzelstrauch. | 80—100 | 3,20 | 28,50 | |
| | 100—125 | 4,50 | 41,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 80—100 cm breit | 125—150 | 13,50 | | |
| | 150—175 | 18,— | | |
| | 175—200 | 22,50 | | |
| 100—150 cm breit | 200—250 | 30,— | | |
| | 250—300 | 37,50 | | |
| **vulgaris** (L.), **Gemeiner Flieder** **B, H, R** | | | | |
| Südosteuropa, bis 6 m hoher, baumartiger und Ausläufer treibender Strauch mit frischgrüner Belaubung und bis zu 20 cm langen, lila Blütenrispen im Mai. **Eine vorzügliche Heckenpflanze für kalkhaltige Böden;** verträgt jeden Schnitt. | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 80—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 100—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 125—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 150—200 | 15,— | | |
| 150—200 cm breit | 200—250 | 25,— | | |
| 200—250 cm breit | 250—300 | 30,— | | |
| | 300—350 | 37,50 | | |
| „ **alba** (Ait.) **B, H, R** | | | | |
| Mit weißen Blütenrispen. | 60—80 | 0,65 | 5,60 | 49,— |
| | 80—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 100—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 125—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| „ **marlyi** (Hort.) **H** | | | | |
| Außerordentlich reichblühender und **geschlossen wachsender Strauch mit einfachen, rotvioletten Blütenrispen; vorzüglich für Hecken geeignet.** | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 80—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 100—125 | 1,30 | 12,— | 105,— |

## Syringa vulgaris in veredelten Sorten:

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|

**Einfach blühend:**

**Andenken an L. Späth,** dunkelrot
**Charles X.,** lila, **gute Treibsorte!**
**Congo,** dunkelrot
**Christophe Colomb,** zartlila
**Decaisne,** hellkarmin
**Fürst Bülow,** purpurviolett
**Hermann Eilers,** violettrosa
**Hugo Koster,** rötlich-lila, **gute Treibsorte!**
**J. C. van Tol,** reinweiß
**Königin Luise,** reinweiß
**Macrostachia,** mattviolett
**Mme. Felix,** weiß, großblumig
**Mme. Florent. Stepman,** weiß
**Maréchal Foch,** rosa
**Marie Legraye,** reinweiß, **gute Treibsorte!**
**praecox Catinat,** rosalila
„ **Mirabeau,** rosalila
**Reaumur,** hellviolett
**Ruhm von Horstenstein,** lilarot

**Gefüllt blühend:**

**Belle de Nancy,** seidigrosa
**Charles Joly,** dunkelpurpur
**Georges Bellair,** große, dichte, gefüllte Rispen mit lilapurpurnen, in der Knospe karminroten Blüten
**Katharine Havemeyer,** hellviolett
**Louis Pasteur,** rot
**Leon Gambetta,** hellrosa, **gute Treibsorte!**
**Mme. Ant. Buchner,** zartrosalila
**Mme. Lemoine,** reinweiß
**Maximowicz,** blau
**Michel Buchner,** hellila
**Paul Hariot,** purpurviolett
**Perle von Stuttgart,** lila
**Président Fallieres,** zartlila

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Büsche** mit 3—5 Trieben | ca. 60—80 | 2,— | 18,50 | 170 — |
| **Büsche** mit 5—8 Trieben | ca. 65—100 | 3,20 | 28,50 | 262,— |
| **Büsche** mit 8—12 Trieben | ca. 80—100 | 4,50 | 41,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 6,40 | 56,— | |
| 80—100 cm breit | 100—125 | 9,— | 75,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 120 — | |
| 80—125 cm breit | 150—175 | 18,— | 160,— | |
| | 175—200 | 22,50 | 200,— | |
| | 200—250 | 30,— | | |
| 4 × verpflanzt. Mit Ballen. 200—250 cm breit | 250—300 | 100,— | | |
| 300—350 cm breit | 300—350 | 120,— | | |
| **Halb- und Hochstämme,** Stammhöhe | 60—80 | 3,75 | | |
| | 80—100 | 4,50 | | |
| | 100—120 | 6,— | | |
| | 120—140 | 7,50 | | |
| | 140—160 | 9 — | | |

## Tamarix (L.) - Tamariske, Uferheide - TAMARICACEAE

**hispida aestivalis,** siehe T. pentandra

**odessana** (Stev.) **E**
Südrußland, bis 2 m hoher, aufrecht wachsender Strauch mit feiner, zierlicher, **gelblich graugrüner Belaubung und reizenden, hellrosa Blütenähren,** Ende Juni-August. . . — 80—100 | 0,90 | 8,25 | 75,—

**parviflora** (DC.), (T. tetrandra purpurea, Boiss.) **E**
Südosteuropa, wertvoller und winterharter, bis 4 m hoch werdender Strauch mit tiefbraunroten Zweigen und hellrosa Blütenähren im Mai. **Vollkommen unempfindlich gegen Kochsalzvorkommen** im Boden und verträgt bei Uferbefestigungen vorübergehende Überflutungen durch Brackwasser mit einem Gehalt von 5 % NaCl. **Auch zur Bepflanzung von reinen Sandböden vorzüglich geeignet.** — 80—100 | 0,65 | 5,60 | 49,—

**pentandra** (Pall.), (T. hispida aestivalis, Hort.) **E**
Südosteuropa, bis 5 m hoher baumartiger Strauch mit purpurroten, **malerisch überhängenden Zweigen und bläulichgrüner Belaubung.** Blüten in großen, endständigen, lebhaft rosa gefärbten Blütenrispen im Juli-August. In geschützten Lagen **die schönste Sorte für Einzelstellung.** — 60—80 | 1,70 | 15,— | 135,—

**tetrandra purpurea,** siehe T. parviflora

**Tecoma,** s. Campsis unt. Schling- u. Kletterpflanzen

**Teucrium,** siehe unter Stauden

## Tilia (L.) - Linde - TILIACEAE

**euchlora** (K. Koch), (T. cordata x dasystyla), Krimlinde **R**
Bis 20 m hoher Baum mit rundlich ovaler Krone, dessen Äste sich bei zunehmendem Alter zu Boden senken. Seine auffallend glänzend dunkelgrüne Belaubung hat sich relativ widerstandsfähig gegen rote Spinne und Lindenzikade gezeigt. **Besonders wertvoller, rauchharter** Straßen- und Parkbaum. **Alleebäume,** Stammumfang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8—10 | 6,40 | 58 — | |
| 10—12 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| 12—14 | 10,— | 90,— | |

*Pterocarya fraxinifolia*
Solitär 3 × v. Höhe 200/250 — Breite 80/125

*Rhus typhina laciniata*
Solitär 3 × v. Höhe 150/200 — 10-20 Triebe

*Verladung einer Birke*

10/12 m hoch und 40/45 cm Stammumfang, mit unserem Spezial-Transport- und Aushebewagen

*Quartier mit 4000*
*Tilia intermedia*

3 × v.
Stammumfang 12/16

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Tilia euchlora** (Fortsetzung) | | | | |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 16—18 | 19,— | | |
| | 18—20 | 25,— | | |
| | 25—30 | 45,— | | |
| **europaea,** siehe T. intermedia | | | | |
| „ **pallida,** siehe T. pallida | | | | |
| **grandifolia,** siehe T. platyphyllos | | | | |
| **intermedia** (DC.), (T. europaea, L.; T. vulgaris, Hayne; T. cordata x platyphyllos), **Zwischenlinde** **B, H, R, S** Bis 40 m hoher Baum mit pyramidaler Krone und **frischgrüner, gesunder Belaubung. Übertrifft ihre Eltern, was Schönheit, Wüchsigkeit und Gesundheit des Blattes anbelangt** und ist einer der wertvollsten Straßenbäume. Vorzügliche Bienenweide. | | | | |
| **Heister** mit geradem Mittelstamm und natürlicher seitlicher Bezweigung . . . . . | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270 — |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 12—14 | 12,50 | 112,— | 1000,— |
| | 14—16 | 15,— | 135,— | 1200,— |
| | 16—18 | 19,— | 170,— | 1500,— |
| | 18—20 | 25,— | 225,— | |
| | 20—25 | 33,— | 300,— | |
| **Stammbüsche,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl., 150—200 cm breit und 300—400 cm hoch. Stammumfang | 12—14 | 12,50 | 112,— | |
| | 14—16 | 15,— | 135,— | |
| | 16—18 | 18,50 | 170,— | |
| | 18—20 | 25,— | 225,— | |
| | 20—25 | 33,— | 300,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 200—250 cm. Kronendurchm. 250—300 cm, Kronenhöhe 250—300 cm. Stammumfang | 25—30 | 67,50 | 600,— | |
| Kronendurchm. 300—450 cm, Kronenhöhe 400—450 cm. Stammumfang | 30—35 | 86,— | 750,— | |
| | 35—40 | 112,— | | |
| | 40—45 | 150,— | | |
| | 45—50 | 210,— | | |
| | 50—55 | 270,— | | |
| | 55—60 | 360,— | | |
| Kronendurchm. 400—500 cm, Kronenhöhe 400—500 cm. Stammumfang | 60—70 | 525,— | | |
| **longivirens** (Timm & Co.) **B** Eine von uns gezogene Varietät, die sich durch ihren grünlichgelben Austrieb mit bräunlicher Spitze und durch das **im Herbst sehr lange haftende, gesunde Laub** auszeichnet. Wuchs kräftig mit eiförmiger Krone. **Diese Neuheit wurde bei uns 20 Jahre auf ihren Wert hin geprüft.** | | | | |
| **Heister,** aus weitem Stand, mit geradem Mitteltrieb und natürlicher seitlicher Bezweigung . . . . . | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 10—12 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | 825,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 12—14 | 12,50 | 112,— | 1000,— |
| | 14—16 | 15,— | 135,— | 1200,— |
| | 16—18 | 18,50 | 170,— | 1500,— |
| | 18—20 | 25,— | 225,— | 2000,— |
| | 20—25 | 33,— | 300,— | 2700,— |
| | 25—30 | 45,— | 410.— | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 200 cm. Kronendurchm. 150—200 cm, Kronenhöhe 250—350 cm. Stammumfang | 18—20 | 33,— | 300,— | |
| | 20—25 | 50,— | 450,— | |
| | 25—30 | 67,50 | 600,— | |
| **pallida** (Wierzb.), (T. europaea pallida, Reichb.; T. cordata major x rubra), **Kaiserlinde** **B** **Als idealer Straßenbaum** zeichnet sich dieser Bastard mit seiner dunkelgrünen, gesunden Belaubung durch seinen charakteristisch **kräftigen, pyramidalen** Wuchs aus. | | | | |
| **Heister,** aus weitem Stand. Stammumfang 6—8 cm | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Alleebäume und Stammbüsche,** Stammumfang | 8—10 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 10—12 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 12—14 | 12,50 | 112,— | 1000,— |
| | 14—16 | 15,— | 135,— | 1200,— |
| | 16—18 | 18,50 | 170,— | 1500,— |
| | 18—20 | 25,— | 225,— | |
| | 20—25 | 33,— | 300,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Tilia pallida** (Fortsetzung) | | | | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 225 cm. Kronendurchm. 200—250 cm, Kronenhöhe 300—400 cm. Stammumfang | 25—30 | 67,50 | 600,— | |
| | 30—35 | 86,— | 750,— | |
| | 35—40 | 112,— | | |
| | 40—45 | 150,— | | |
| **parvifolia** (Ehrh.), (T. cordata, Mill.), **Winterlinde, Kleinblättrige Linde** **B, H** Breitsäulenförmig und regelmäßig wachsender, bis 30 m hoher Baum. Reichblühende beste Bienenweidelinde. **Sehr für Windschutzstreifen und Heckenpflanzungen zu empfehlen.** | 60—80 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 80—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 100—125 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| | 125—150 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 150—200 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 200—250 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Heister** mit natürlicher seitlicher Bezweigung | 250—300 | 3,30 | 30,— | 270,— |
| **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 50,— | 450,— |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 14—16 | 10,— | 90,— | 825,— |
| | 16—18 | 13,— | 116,— | 1050,— |
| | 18—20 | 15,— | 135,— | 1200,— |
| | 20—25 | 17,— | 150,— | 1350,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl., mit geraden durchgehenden Stämmen bis 6 m. Stammumfang | 10—12 | 8,— | 67,50 | 600,— |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | 750,— |
| | 14—16 | 13,— | 112,— | 900,— |
| | 16—18 | 14,— | 125,— | 1125,— |
| | 18—20 | 19,— | 150,— | 1275,— |
| | 20—25 | 25,— | 188,— | 1500,— |
| | 25—30 | 33,— | 300,— | |
| **Solitärbäume,** 3 × verpflanzt. Stammhöhe 200—225 cm. Kronendurchm. 125—175 cm, Kronenhöhe 250—300 cm. Stammumfang | 14—16 | 16,50 | 150,— | |
| | 16—18 | 18,— | 160,— | |
| | 18—20 | 22,50 | 200,— | |
| | 20—25 | 30,— | 270,— | |
| | 25—30 | 50,— | | |
| **Stammbüsche,** 3 × verpflanzt, bis unten beästet. 80—125 cm breit u. 300—450 cm hoch. Stammumfang | 8—10 | 5,40 | 50,— | |
| | 10—12 | 6,40 | 58,— | |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | |
| | 14—16 | 10,— | 90,— | |
| 100—150 cm breit u. 450—600 cm hoch. Stammumfang | 14—16 | 13,— | 115,— | |
| | 16—18 | 15,— | 135,— | |
| | 18—20 | 18,— | 160,— | |
| **Solitärbüsche,** mehrstämmig, 3 × verpflanzt. 250—300 cm breit | 250—300 | 34,— | | |
| | 300—350 | 45,— | | |
| | 350—400 | 60,— | | |
| **platyphyllos** (Scop.), (T. grandifolia, Ehrh.), **Großblättrige Linde, Sommerlinde** **B** Europa, bis 40 m hoher, breitpyramidaler, schöner Park- und Straßenbaum; **jedoch nur in luftigen Außenlagen und in Gegenden mit großer Luft- und Bodenfeuchtigkeit zu verwenden.** **Alleebäume,** Stammumfang | 10—12 | 6,40 | 58,— | 525,— |
| | 12—14 | 8,25 | 75,— | 675,— |
| | 14—16 | 10,— | 90,— | 825,— |
| | 16—18 | 13,— | 116,— | 1050,— |
| | 18—20 | 15,— | 135,— | 1200,— |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 10—12 | 8,— | 67,50 | 600,— |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | 750,— |
| | 14—16 | 13,— | 112,— | 900,— |
| | 16—18 | 14,— | 125,— | 1125,— |
| | 18—20 | 18,50 | 150,— | 1275,— |
| | 25—30 | 33,— | 300,— | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 200—225 cm. Kronendurchm. 300 cm, Kronenhöhe 400 cm. Stammumfang | 30—35 | 67,50 | | |
| | 35—40 | 86,— | | |
| **tomentosa** (Mnch.), (T. argentea, DC.), **Echte Ungarische Silberlinde** **B, R** Bis 30 m hoher Baum **für trockene Lagen** mit breitpyramidaler bis rundlicher Krone. Die großen, gesunden, herzförmigen Blätter sind oben dunkelgrün und unten schneeweißfilzig. **Herrlicher Park- und ausgezeichneter Straßenbaum, der außerordentlich rauchhart und hitzefest ist.** **Alleebäume,** Stammumfang | 8—10 | 6,40 | 58,— | |
| | 10—12 | 8,25 | 75,— | |
| | 12—14 | 10,— | 90,— | |
| | 14—16 | 13,— | | |
| **Alleebäume,** im fertigen Zustande zum 3. × verpfl. aus extra weitem Stand Stammumfang | 16—18 | 19,— | | |
| | 18—20 | 25,— | | |
| | 20—25 | 33,— | | |
| | 25—30 | 45,— | | |
| **Solitärbäume,** 4 × verpflanzt. Stammhöhe 225—250 cm. Kronendurchm. 200—300 cm, Kronenhöhe 250—300 cm. Stammumfang | 40—45 | 188,— | | |
| Kronendurchm. 350—450 cm, Kronenhöhe 400—500 cm. Stammumfang | 50—55 | 300,— | | |
| | 55—60 | 375,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Ulex** (L.) - Stechginster - LEGUMINOSAE | | | | |
| **europaeus** (L.) **R, St, W** | | | | |
| Bis 1 m hoher, stark dorniger Strauch mit goldgelben Blüten, April-Juni. Treibt nach starken Wintern stets von unten kräftig wieder durch. Mit Ballen | 20—40 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| | 40—60 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Ulmus** (L.) - Ulme, Rüster - ULMACEAE | | | | |
| **campestris dampieri wredei** (Rehd.), (U. carpinifolia wredei, Rehd.) **E, L, R** | | | | |
| Säulenförmig, straff aufrecht wachsende Sorte mit **lebhaft goldgelbem Laub.** | 80—100 | 2,60 | 22,50 | |
| | 100—125 | 3,40 | 30,— | |
| | 125—150 | 4,50 | 41,— | |
| **carpinifolia wredei**. siehe U. campestris dampieri wredei | | | | |
| **montana fastigiata** (Loud.), (U. glabra exoniensis, Rehd.) | | | | |
| Schmal und straff aufrecht wachsende Bäume mit gekräuselten, tief und unregelmäßig gezähnten Blättern. | 200—250 | 4,50 | 41,— | |
| **pumila arborea** (Litvin.), (U. turkestanica, Reg., U. pinnatoramosa, Dieck.), **Neueinführung 1952!** **R** | | | | |
| Turkestan, Sibirien, sehr wüchsige, anfangs pyramidal wachsende Sorte mit hübscher, fiederartig gestellter, dunkelgrüner Belaubung. **Ist außerordentlich widerstandsfähig gegen die Ulmenkrankheit** und kann daher sehr als **äußerst windbeständiger Alleebaum** und in unmittelbarer Küstennähe als **Windbrecher** empfohlen werden. | 200—250 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **Heister,** auf geraden Mittelstamm gezogen, mit natürlicher breiter Beästung | 250—300 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| | 300—350 | 2,70 | 25,— | 225,— |
| **Alleebäume und Stammbüsche,** Stammumfang | 7—8 | 2,50 | 22,50 | 200,— |
| | 8—10 | 3,40 | 30,— | 270,— |
| | 10—12 | 4,50 | 41,— | 375,— |
| | 12—14 | 6,40 | 58,— | |
| | 14—16 | 8,25 | 75,— | |
| | 16—18 | 10,— | | |
| | 18—20 | 13,— | | |
| **turkestanica,** siehe U. pumila arborea | | | | |
| **Viburnum** (L.) - Schneeball - CAPRIFOLIACEAE | | | | |
| **burkwoodii** (Burkw.), (V. carlesii x utile) **B, E, I, R** | | | | |
| Bis 2 m hoch werdender, **immergrüner,** locker wachsender, winterharter Strauch mit glänzendgrüner Belaubung und rosa-weißlichen, angenehm duftenden Blütendolden, Ende April-Mai. Wertvoller Einzelstrauch. | 40—60 | 4,40 | 36,— | |
| Mit Ballen | 60—80 | 5,80 | 48,— | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 60—80 | 7,50 | 67,50 | |
| 80—100 cm breit | 80—100 | 9,— | | |
| | 100—125 | 10,— | | |
| | 125—150 | 13,50 | | |
| **carlesii** (Hemsl.) **B, E, R, St** | | | | |
| Korea, langsam wachsender, breitrundlicher, bis 1,50 m hoher Strauch mit breiteiförmigen, dicht behaarten, trübgrünen Blättern und **sehr wohlriechenden,** rosa-weißen Blütendolden im April bis Mai. Wertvoller Einzelstrauch. | 30—40 | 3,75 | 34,— | |
| | 40—60 | 5,25 | 48,— | |
| | 60—80 | 9,— | | |
| Mit Ballen | 80—100 | 12,— | | |
| **fragrans** (Bge.) | | | | |
| Nordchina, bis 3 m hoher, aufrecht wachsender, braunzweigiger Strauch mit kleinen, wohlriechenden, röhrenförmigen, rosaweißen Blütenrispen. Erlangt wie Hamamelis virginiana besondere Bedeutung durch **seine extrem frühe Blütezeit.** Mit Ballen | 40—60 | 2,25 | | |
| **juddii** (Rehd.), (V. carlesii x bitchiuense), **Neueinführung!** **B, E, R, St** | | | | |
| Diese Sorte unterscheidet sich von V. carlesii durch größere Blütenstände u. höhere Wuchsfreudigkeit. Mit Ballen | 30—40 | 3,75 | 34,— | |
| | 40—50 | 5,25 | 48,— | |
| **lantana** (L.), **Wolliger Schneeball** **B, R, S** | | | | |
| Europa, Westasien, schattenverträglicher, bis 5 m hoher, **kalkliebender,** aufrecht wachsender Strauch mit sternfilzigen Blättern und Trieben. Blüten in 10 cm breiten, weißen Doldenrispen im Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz. **Ist sehr resistent gegen Trockenheit.** | 60—80 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| | 80—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 100—125 | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **nudum** (L.) **B, E, R** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, bis 4 m hoher, aufrechtwachsender Strauch mit lebhaft glänzendgrünen, lorbeerartigen Blättern und in weißen Scheindolden sitzenden Blüten im Juli. **Wertvoller und schattenliebender Einzelstrauch.** | 40—60 | 2,25 | | |
| Mit Ballen | 60—80 | 3,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Viburnum** (Fortsetzung) | | | | |
| **opulus** (L.), **Gemeiner Schneeball** **B, F, H, R, S** | | | | |
| Europa bis Nordasien, 3—4 m hoher, heimischer Strauch mit gelblichweißen Blütendolden im Mai-Juni und **koralenroten Früchten** im Herbst. **Sehr wertvoller Schattenstrauch,** liebt einen nicht zu trockenen und nährstoffreichen Boden. . . . . | 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| 2 × verpfl., **extra stark,** aus doppeltweitem Stand | 125—150 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Solitär, 3 × verpflanzt. Mit Ballen** 125—150 cm breit | 200—250 | 27,— | | |
| | 250—300 | 33,— | | |
| 175—225 cm breit | 300—350 | 45,— | | |
| „ **sterile** (DC.), (V. opulus roseum, L.) **B, R** | | | | |
| Prächtiger, gefülltblühender Schneeball. | | | | |
| **Büsche,** 3—5 Triebe | | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Büsche,** 5—8 Triebe | | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Büsche,** 8—12 Triebe | | 1,30 | 12,— | 105,— |
| **Stämme,** Stammhöhe | 100—120 | 3,75 | | |
| | 120—140 | 4,50 | | |
| **plicatum,** siehe V. tomentosum sterile | | | | |
| „ **tomentosum,** siehe V. tomentosum | | | | |
| **rhytidophyllum** (Hemsl.) **B, E, F, H, I, R** | | | | |
| Mittel- und Westchina, bis 3 m hoher, sehr wertvoller, **immergrüner Strauch,** mit bis 25 cm langen, glänzend dunkelgrünen und runzeligen Blättern. Blüten in bis 20 cm breiten,, sternfilzigen Doldenrispen im Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann glänzendschwarz. **Sehr wertvoller Einzelstrauch.** Mit Ballen | 40—60 | 4,— | 33,— | |
| | 60—80 | 5,25 | 43,50 | |
| | 80—100 | 7,50 | 67,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 9,— | | |
| | 100—125 | 12,— | | |
| 80—100 cm breit | 100—125 | 15,— | | |
| **tomentosum** (Thunb.), (V. plicatum tomentosum, Miq.) **B, E, L, R** | | | | |
| Japan, China, bis 3 m hoher, üppig wachsender Solitärstrauch mit dicht aufrechtwachsenden Zweigen, die im Mai-Juni **dicht mit bis 10 cm breiten, flachen, weißen Blütenständen bedeckt sind. Ein wertvolles Gehölz zur Einzelstellung.** Ohne Ballen | 40—60 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| | 60—80 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| | 80—100 | 2,— | 18,50 | 170,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 60—80 cm breit | 80—100 | 4,50 | | |
| 80—125 cm breit | 100—125 | 6,— | | |
| „ **mariesii** (Rehd.), **Neueinführung!** **B, E, L, R** | | | | |
| Bis 3 m hoher Strauch mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, die dicht mit großen, flachausgebreiteten Blütenständen besetzt sind. **In Wuchs und Blüte wohl die wertvollste Art für Einzelstellung.** Mit Ballen | 40—60 | 3,40 | 30,— | |
| | 60—80 | 4,10 | 37,50 | |
| „ **sterile** (Koch), (V. plicatum, Thunb.) **B, E, L, R** | | | | |
| Bis 3 m hoher, breitrundlicher, sehr reichblühender Strauch mit großen, **rahmweißen Blütenbällen. Ein wertvoller und reichblühender Einzelstrauch.** Mit Ballen | 40—60 | 3,40 | 30,— | |
| | 60—80 | 4,10 | 37,50 | |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. Ca. 60 cm breit | 60—80 | 7,50 | | |
| | 80—100 | 11,50 | | |
| „ „ **grandiflorum** (Hesse), (V. plicatum rotundifolium, Rehd.) **B, E, L, R** | | | | |
| Bis 3 m hoher, breitrundlicher Strauch mit großen, früh aufblühenden, weißen, breiten und kugeligen Blütenbällen. Mit Ballen | 40—60 | 3,40 | 30,— | |
| | 60—80 | 4,10 | 37,50 | |
| | 80—100 | 6,75 | | |
| **venosum canbyi** (Rehd.) **B, E R** | | | | |
| Östl. Vereinigte Staaten, bis 3 m hoher Strauch mit breiteiförmigen Blättern und in 10 cm breiten Doldenrispen sitzenden, weißen Blüten im Juni. Sehr zierend durch die gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Wertvolles Solitärgehölz. | 70—100 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Solitär,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen. 100—150 cm breit | 125—150 | 9,— | | |
| | 150—175 | 12,— | | |

**Vinca,** siehe unter Stauden

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Weigela** (Thunb.), (Diervilla, Adans) - Weigelie - CAPRIFOLIACEAE **R, S** | | | | |
| **Die Weigelien gehören wegen ihres Blüten- und Farbenreichtums zu den beliebtesten und wertvollsten Sommerblühern, die dabei noch geringe Ansprüche an den Boden stellen. Die vielen Züchtungen der letzten Jahre bescheren uns einen Blütenflor, der vom Spätfrühjahr bis in den Herbst hinein reicht. Alle Arten bilden 1½—2½ m hohe Sträucher. In den besten Sorten wie:** | | | | |
| **candida** Blüte ziemlich groß, schön reinweiß, nicht verfärbend | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Eva Rathke** Dunkelkarmin, bis in den Herbst hinein reich blühend, Blüte mittelgroß, Strauch langsam wachsend, **sehr wertvolle Sorte.** | 60—80 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Féeri** Eine sehr früh- u. reichblühende, reinrosa gefärbte Sorte. | 80—125 | 1,15 | 10,— | |
| **florida purpurea** (Boom.) Unterscheidet sich mit ihrem niedrigen, geschlossenen Wuchs und ihrer tief braunroten Belaubung außerordentlich stark von den übrigen Sorten. Die zahlreichen, lange haftenden, dunkelrosa Blüten zeichnen sich durch einen sauberen, leuchtenden Farbton aus. | 60—80 | 1,15 | 10,— | |
| **Gustave Mallet** (Billiard.) Die ziemlich großblumigen, locker angeordneten, rosa Blüten zeigen einen weißen Saum und lebhaft rubinrosa gefärbte Knospen. | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Mme. Couturier** Im Aufblühen weißlichrosa, später lebhaft rosa | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **Memoire de Madame van Houtte** Eine großblumige, karmesinrosa, weiß gefleckte Sorte mit leuchtendroten Knospen. | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **middendorffiana** (Lem.) Mandschurei, bis 1 m hoher Strauch mit 3 cm langen, schwefelgelben Blüten; Mai-Juni. | 60—80 | 2,60 | 24,— | |
| **Newport Red. Neuheit!** Eine **sehr wüchsige, wertvolle,** tiefrote Sorte mit glockigen Blumen. | 60—100 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **praecox Bouquet rose** **Eine außerordentlich reich- und frühblühende Sorte** mit karminrosa bis hellrosa Blüten. Alle praecox - Sorten zeichnen sich durch ihre oben und unten weichbehaarten Blätter aus. | 80—125 | 1,50 | 13,50 | |
| „ **Fleur de mai** (Lemn.) Diese von der praecox-Gruppe am frühesten blühende, mittelstark wachsende Sorte zeichnet sich durch schön gefärbte, auffallend lange, frischkarmin-rosa gefärbte Blüten aus. | 80—125 | 1,50 | 13,50 | |
| „ **Floréal** Eine außerordentlich früh- und reichblütige, **wertvolle Sorte** mit verhältnismäßig großen, intensiv gefärbten, karminrosa Blüten. | 100—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **rosea** Eine ziemlich großblumige, rosa Sorte mit weiß marmoriertem Saum. | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **stelzneri** (van Houtte) Eine sehr reichblühende, großblumige, dunkelrote Sorte. | 100—150 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| **styriaca** Eine außerordentlich reichblühende, leuchtenderdbeerrote Sorte mit üppigem Wuchs und frischgrünem Laub. **Sehr wertvoll!** | 100—150 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| **Wistaria** (Glycine), siehe unter Schling- und Kletterpflanzen | | | | |
| **Zenobia** (D. Don.) - ERICACEAE | | | | |
| **pulverulenta** (Pollard.) **E, S, St** Östl. Vereinigte Staaten, bis 1,50 m hoher, **halbimmergrüner** Strauch mit ovalen, blau bereiften Blättern und mit zierlich bogig überhängenden Zweigen, die im Mai-Juni dicht mit schneeweißen, glockigen Blütenbüscheln besetzt sind. Ein **besonders reizvoller** und gefällig wachsender, schattenliebender Einzelstrauch. | 30—40 | 3,75 | 34,— | |
| Mit Ballen | 40—60 | 4,50 | 41,— | |



# Schling- und Kletterpflanzen

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Actinidia** (Ldl.) - Strahlengriffel - ACTINIDIACEAE | | | | |
| **arguta** (Miq.) **F, L, R**<br>Japan, Korea, sommergrüner, getrenntgeschlechtlicher, hochschlingender Strauch mit glänzend dunkelgrünen Blättern und weißen, duftenden Blüten im Juni. Die runden Früchte haben einen feigenähnlichen Geschmack und sind sehr vitaminreich. **Ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben, Pergolen und Mauerwerk geeignet.** Mit Ballen | 80—120 | 1,50 | 13,50 | |
| **kolomikta** (Maxim.) **F, L**<br>Japan, China, sehr wertvolle, bis 2 m hoch werdende, **nur mäßig schlingende Art** mit eirundlichen, oben zugespitzten Blättern, **die im oberen Teil weiß bis rosa gefärbt sind.** Frucht süß, blauschwarz. Mit Topfballen | 60—80 | 2,25 | 20,— | |
| **Extra starke Pflanzen,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen | 125—150 | 3,40 | | |
| **Akebia** (Dcne.) - Akebie - LARDIZABALACEAE | | | | |
| **quinata** (Dcne.) **F**<br>Bis 10 m und höher schlingender, **halbimmergrüner** Strauch mit dunkelgrünen, fünffingerigen, bis lange in den Herbst hinein haftenden Blättern. Blüten bräunlichviolett in hängenden Trauben. **Besonders dekorativ sind die bis 15 cm langen, blaubereiften und nierenförmigen Früchte, die in der Vollreife weit aufplatzen.** Siehe Umschlagseite! Mit Ballen | 100—150 | 2,— | 18,— | |
| **Extra starke Pflanzen,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen | 150—200 | 2,50 | 22,50 | |
| **Ampelopsis,** siehe Parthenocissus | | | | |
| **Aristolochia** (L.) - Pfeifenwinde, Pfeifenblume - ARISTOLOCHIACEAE | | | | |
| **durior** (Hill.), (A. sipho, L'Herit.; A. macrophylla, Lam.) **L, R, S**<br>Pennsylvanien, bis 10 m hoch windender Strauch mit bis 30 cm langen, dunkelgrünen Blättern und **pfeifenähnlichen, außen gelbgrünen, innen purpurbraunen Blüten im Juni.** Mit Ballen | 80—100 | 4,50 | 41,— | |
| **sipho,** siehe A. durior | | | | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Campsis** (Lour.) - Trompetenblume - BIGNONIACEAE | | | | |
| **Bevorzugen einen tiefgründigen, lockeren und nährstoffreichen Boden.** | | | | |
| **radicans** (Seem.), (Tecoma radicans, Juss.), (Bignonia rad. L.) | | | | |
| Nordamerika, **mit Luftwurzeln, bis 10 m hoch kletternder, winterharter Strauch** mit vielen orangefarbenen Blüten im Juli-September. Mit Ballen | 80—100 | 2,25 | 20,— | |
| **tagliabuana Madame Galen** W | | | | |
| **Eine der allerschönsten Hybriden überhaupt. Wenig kletternd; Blüten werden bis 8 cm lang und sind am Schlund 4—5 cm weit geöffnet.** Blütenfarbe lachs bis scharlachrot. Verlangt Winterschutz. Mit Topfballen | 40—60 | 4,10 | 37,50 | |
| **Celastrus** (L.) - Baumwürger - CELASTRACEAE | | | | |
| **orbiculata** (Thunb.), (C. articulata, Thunb.) F, S | | | | |
| China, Japan, ein **zweihäusiger,** bis 12 m hoch windender, **anspruchsloser Strauch für sonnige Lagen.** Früchte sind tiefgelb gefärbt, Samenmantel scharlachrot, **ein sehr wertvoller Vasenschmuck.** Die Früchte halten sich mehrere Monate. Mit Ballen | 125—175 | 1,35 | 12,— | |
| **Extra starke Pflanzen,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen | 200—250 | 2,50 | | |
| **scandens** (L.), **Echter Baumwürger** | | | | |
| Östl. Nordamerika, **zweihäusig,** bis 9 m hochwindend, sonst gleich gute Eigenschaften wie orbiculata. Mit Ballen | 125—175 | 1,35 | 12,— | |
| **Clematis** (L.) - Waldrebe - RANUNCULACEAE | | | | |
| Gedeiht in jedem gut kultivierten normalen Gartenboden. **Wichtig ist, daß der Fuß der Pflanze stets abgedeckt wird.** Alle Arten sind kalkliebend. | | | | |
| **alpina** (Mill.), (Atragene alpine, L.), **Alpenwaldrebe** S, St | | | | |
| Mittel- und Südeuropa bis Nordostasien, kalkliebender, **besonders reizvoller,** bis 2 m hoch kletternder Strauch mit vielen, **glockigen, violettgefärbten Blüten** im Mai-Juli. | 40—60 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| Mit Topfballen | 60—100 | 1,70 | 15,— | 135,— |
| **eriopoda,** siehe C. tangutica | | | | |
| **montana** (Buch-Ham.) S | | | | |
| Himalaja, Westchina, bis 8 m kletternder, **üppig wachsender, völlig winterharter Strauch** mit unzähligen, ca. 5 cm großen, weißen Blüten im Mai. 1jährig, mit Topfballen | 80—125 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| 3 × verpflanzt, **extra stark,** mit Ballen | 150—200 | 3,40 | 30,— | |
| „ **rubens** (Ktze.) S | | | | |
| Sehr gesunder und frohwüchsiger Strauch mit besonders beim Austrieb purpurner Belaubung und 5 bis 6 cm großen, rosaroten Blüten, die bei dieser Varietät bis in den späten Herbst hinein anhalten. **Ist außerordentlich reichblumig. Besonders wertvolle Sorte.** 1jährig, mit Topfballen | 80—125 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| 3 × verpflanzt, **extra stark,** mit Ballen | 150—200 | 3,40 | 30,— | |
| **paniculata** (Thunb.) F, S | | | | |
| Japan, bis 10 m hoch kletternder, winterharter Strauch mit **unzähligen, kleinen, weißen und wohlriechenden Blütenständen im Herbst.** 1jährig, mit Topfballen | 60—80 | 2,25 | 20,— | |
| **recta hybrida** F, S | | | | |
| Bis 4 m hoch werdender, stark rankender Strauch mit einem **außerordentlich reichen, weißen Blütenflor** im Juni-Juli. Hat in der Blüte sehr viel Ähnlichkeit mit C. paniculata. Mit Topfballen | 80—120 | 1,50 | 13,50 | |
| **tangutica** (Korsh.), (C. eriopoda, Koehne) F | | | | |
| Mongolei bis Nordwestchina, bis 3 m hoch kletternder, winterfester Strauch mit hellgrüner Belaubung und **3—5 cm großen, goldgelben Blüten im Juni und nochmals im Herbst.** Von besonderem Reiz sind auch die feingefiederten, silbriggrauen Fruchtköpfchen. Auch geeignet zur Bekleidung mäßig hoher Lauben, Säulen und Wände. Mit Topfballen | 60—80 | 1,65 | 15,— | |
| **vitalba** (L.), **Heimische Waldrebe** R, S | | | | |
| Europa, Kaukasus, **sehr starkwüchsiger und alles überkletternder Strauch** mit ungezählten, dichten und lockeren weißen Blütenständen. Auch die federartigen Fruchtstände sind im Winter zierend. Mit Topfballen | 80—125 | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| Mit Ballen | 125—175 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

| Clematis (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **viticella** (L.) R, S<br>Südeuropa bis Westasien, bis 4 m hoch kletternder Strauch, **der von Juli bis in den Herbst überreich mit purpurrosa bis violetten Blüten bedeckt ist.**<br>Mit Topfballen | 60—100 | 1,65 | 15,— | |
| „ **kermesina.** Neueinführung! R, S<br>Südeuropa, bis 4 m hoch rankender, doppelt gefiederter Strauch mit prächtigen, violett bis weinroten Blüten. **Diese außerordentlich reichblühende Art ist sehr zuverlässig und widerstandsfähig gegen die Clematiskrankheit.** 1jährige Vg., mit Topfballen | 80—125 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| „ **venosa.** Neueinführung! R, S<br>Sorte mit großen Blüten, deren violettes Blau mit purpurvioletter Aderung durchzogen ist. Die helleren Mittelstreifen der 5 Blütenblätter scheinen zur Mitte hin fast weiß, wovon sich die dunklen Staubgefäße sehr schön abheben. 1jährige Vg., mit Topfballen | 80—125 | 2,25 | 20,— | |

## Die schönsten und wertvollsten, großblumigen Clematis Hybriden:

**Die bis zu einem Durchmesser von 14 cm großen Einzelblüten sind, was Formschönheit und Farbnuancen anbelangt, kaum zu übertreffen. Die von Juni bis Oktober in den Farben Weiß bis Dunkelrot und Dunkelviolett reich blühenden Sorten beanspruchen bei guter Beschattung der Wurzelscheibe einen guten, lockeren, nicht überdüngten Gartenboden in voller Sonne.**

**Weiße und hellrosa Farbtöne:**

**Henry** (lanuginosa Hybr.), Neueinführung!
Großblumige, reinweiße Sorte mit 6 Blütenbl. und großen dunklen Staubgefäßen.

**Mme. Le Coultre**
Sehr großblumige, alabasterweiße Sorte mit 6 Blütenbl. und großen weißen Staubgefäßen.

**Nelly Moser** (lanuginosa Hybr.)
Mittelgroßblumige, zartrosa Sorte mit kräftig gefärbten roten Streifen und intensiv roten Staubgefäßen.

**Hellblaue Farbtöne:**

**Prins Hendrik** (lanuginosa Hybr.)
Sehr großblumige, azurblaue Sorte mit 6 gewellten Blütenbl. und dunklen Staubgefäßen. Diese **herrliche Sorte** ist leider etwas frostempfindlich.

**Dunkelblaue Farbtöne:**

**Daniel Deronda** (viticella Hybr.), Neueinführung!
Sehr großblumige, leuchtend purpurblaue Sorte mit 6 weit auseinanderstehenden Blütenbl. und großen, weißen Staubgefäßen.

**Gipsy Queen** (jackmannii Hybr.)
Im Vergleich mit Lady Betty Balfour unterscheidet sie sich durch ein noch tieferes Blau und dunkle Staubgefäße.

**Jackmannii** (lanuginosa x viticella)
3—4 m hoch kletternd. Die vierblumenblättrigen, mittelgroßen violettpurpurnen Blüten sitzen an 10—14 cm langen Stielen.

**Lady Betty Balfour** (viticella Hybr.)
Großblumige, samtig tiefdunkelblau gefärbte Sorte mit 6 Blütenbl. und großen, weißen Staubgefäßen.

**Lazurstern** (patens Hybr.)
Frühblühend. Großblumige, tiefviolettpurpurne Sorte mit 6 Blütenbl. und großen, weißen Staubgefäßen.

**The President** (jackmannii Hybr.)
Unterscheidet sich von Lady Betty Balfour nur durch ihre dunklen Staubgefäße.

| Die schönsten und wertvollsten, großblumigen Clematis Hybriden: | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Rote Farbtöne:** (Fortsetzung) | | | | |
| **Barbara Dibley** Großblumige, hellkarminrote Sorte mit 6 Blütenbl., dunkelroten Streifen und tiefroten Staubgefäßen. | | | | |
| **Crimson King** (lanuginosa Hybr.), **Neueinführung!** Wertvolle, großblumige, intensiv weinrote, spätblühende Sorte mit 6 Blütenbl. und braunen Antheren. | | | | |
| **Ernest Markham, Neueinführung!** Eine großblumige viticella Hybride mit leuchtend petunienroten, samtigen Blüten. | | | | |
| **Mme. Baron Veillard** (jackmannii Hybr.) Großblumige Sorte mit blaß lilarosa gefärbten Blütenbl. und hellen Staubgefäßen. | | | | |
| **Ville de Lyon** Eine sehr reichblühende Sorte mit mittelgroßen, leuchtend karminroten Blüten, tiefroten Rändern und hellen Staubgefäßen. | | | | |
| **viticella kermesina**, siehe Seite 128 | | | | |
| 1jährige Vg., mit Topfballen | 70—120 | 2,25 | 20,— | 180,— |
| **Glycine**, siehe Wistaria | | | | |
| **Hedera** (L.) - Efeu - ARALIACEAE | | | | |
| **helix** (L.), **Gemeiner, kleinblättriger Efeu** **B, I, R, S** Europa, Kaukasus, an der Erde kriechender oder mit Luftwurzeln bis 30 m hoch kletternder, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen, weißnervigen Blättern. **Liebt kalkhaltige Böden.** | | | | |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 40—60 | 1,— | 8,25 | 75,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 60—80 | 1,30 | 11,50 | 105,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 80—100 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| „ **arborescens**, siehe unter Laubgehölzen | | | | |
| „ **conglomerata**, siehe unter Laubgehölzen | | | | |
| „ **hibernica** (Kirchn.) **B, I, R, S** **Großblättriger, irländischer Efeu.** | | | | |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 40—60 | 1,— | 8,25 | 75,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 60—80 | 1,30 | 11,50 | 105,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 80—100 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 100—125 | 2,40 | 20,— | 180,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 125—150 | 3,30 | 30,— | |
| „ **minima**, siehe unter Laubgehölzen | | | | |
| „ **Remscheid** (Hort.) **I, R, St** Diese von uns vermehrte Varietät zeichnet sich durch besonders schön gezeichnete Blätter und kurzgestielte, dicht aufliegende Triebe aus. **Hervorragend zur Berankung von Mauern und dergl. geeignet.** | | | | |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 40—60 | 1,— | 8,25 | 75,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 60—80 | 1,30 | 11,50 | 105,— |
| Mit Ballen, 5—8 Ranken | 80—100 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| „ **sagittifolia** (Hibb.) **I, R, S, St** Eine Zwergform mit pfeilförmig zugespitzten Blättern. **Sehr wertvolle Bodenbedeckung.** | 40—60 | 1,50 | 13,50 | |
| Mit Topfballen, ab 3 Ranken | 60—80 | 1,90 | 17,— | |
| **Hydrangea** (L.) - Hortensie - SAXIFRAGACEAE | | | | |
| **scandens**, siehe H. petiolaris | | | | |
| **petiolaris** (S. & Z.), (H. scandens, Maxim.), **Kletterhortensie** **E, R, S** Japan, China, starkwüchsiger Strauch, dessen gelbgrüne Triebe mit Kletterwurzeln versehen sind. Die herzförmigen, glänzenden und frühaustreibenden Blätter sind bis 10 cm lang. Blüten in großen, flachen, mit weißen Randblüten versehenen Dolden im Juni-Juli. **Sehr wertvoll!** | 30—40 | 2,25 | 20,— | |
| Mit Ballen | 40—60 | 3,40 | 30,— | |
| **Extra starke Pflanzen**, 3 × verpflanzt, mit Ballen. 40—60 cm breit | 40—60 | 4,50 | 41,— | |
| | 60—80 | 5,— | 45,— | |
| 60—80 cm breit | 60—80 | 5,60 | 52,50 | |
| **Lonicera** (L.) - Geißblatt, Jelängerjelieber - CAPRIFOLIACEAE | | | | |
| **americana**, siehe L. caprifolium major | | | | |
| **brownii fuchsioides** (Rehd.), **F** Schwachwindender Strauch mit meist zweilippigen, orangeroten bis granatroten Blüten. **Eine sehr zierliche und wertvolle Sorte für nährstoffreiche Böden.** Mit Ballen | 80—125 | 3,— | 27,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Lonicera brownii** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **punicea** (Rehd.) **F** Schwachwüchsig, Blüten meist zweilippig, orangerot, **große Ähnlichkeit mit L. brownii fuchsioides.** Mit Ballen | 80—125 | 3,— | 27,— | |
| **caprifolium major** (Carr.), (L. americana, Koch) **F** Europa, Westasien, mittelhoch windender Strauch mit stark duftenden, weißlichgelben, rot angehauchten Blüten im Juni-Juli. Die länglich bis kugeligen Beeren sind orangerot. Mit Ballen | 80—125 | 3,— | 13,50 | 120,— |
| **heckrottii** (Rehd.), (L. americana x sempervirens) **F, R** Schwachwindender, den ganzen Sommer über unermüdlich blühender Strauch mit oben dunkelgrünen und unten bläulichen Blättern. Die stark duftenden Blüten entwikkeln sich aus einer purpur gefärbten Knospe, die sich beim Öffnen violett färbt und deren Innenseite weißlichgelb gezeichnet ist. Beeren purpurrot. **Eine der wertvollsten Sorten für nährstoffreiche Böden.** Mit Ballen | 80—125 | 3,— | 27,— | |
| **henryi** (Hemsl.) **F, I, L, R** Westchina, **immergrüner, 3—4 m hoher, kräftig schlingender Strauch** mit länglich-lanzettlichen Blättern. Blüten im Juni-Juli, rötlich-bronzefarbig mit gelb. Früchte bläulich bereift. Sehr wertvoll! Mit Ballen | 60—80 | 3,— | 27,— | |
| **periclymenum florida** (Hort.) **F, R** Europa, Kleinasien, eine sehr reichblühende, von uns vermehrte, mehr rotgefärbte Mutation mit gesundem und üppigem Wuchs, die sich nach langjähriger Erprobung als **wesentliche Verbesserung** erwiesen hat. Mit Ballen | 150—200 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| „ **belgica** (Ait.) Wuchs mehr strauchig; Blüten außen purpurn, zuletzt gelblich werdend. . . . . | 150—200 | 2,25 | | |
| **tellmanniana** (Späth), (L. tragophylla x sempervirens) **F** **Eine neuere, hochwindende, starkwachsende und frühblühende Hybride** mit beim Austrieb olivbraunen, später tiefgrünen, unten weiß bereiften Blättern und großen, orangegelben Blüten im Mai-Juni. Mit Ballen | 80—125 | 2,25 | 20,— | |
| **Menispermum** (L.) - Mondsame - MENISPERMACEAE | | | | |
| **canadense** (L.) **F, L** Nordamerika, bis 4 m hoch windender Schlinger mit stumpflappigen, oberseits tiefgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Die sehr kleinen, weißlich-gelbgrünen Blüten erscheinen in lockeren Blütenständen im Juni-Juli. Frucht blauschwarz. Mit Ballen | 80—100 | 1,80 | 15,— | |
| **Parthenocissus** (Planch.), (Ampelopsis), Selbstklimmer, Wilder Wein und Jungfernrebe | | | | |
| **quinquefolia** (Planch.), (Ampelopsis quinquefolia, Mchx.), **Wilder Wein** **B, L, R** Nordamerika, **mittelhoch schlingender Strauch** mit großen, fünfzähnigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Haftscheiben fehlen oder sind nur schwach entwickelt. Herbstfärbung prächtig rot. 3—5 Triebe | | 0,75 | 6,40 | 56,— |
| 5—8 Triebe | | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| 8—12 Triebe | | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| „ **engelmannii** (Rehd.), (Ampelopsis engelmannii Hort.) **B, L, R** **Hoher, selbstklimmender Strauch,** dessen feinere Bezweigung stark mit Haftscheiben versehen sind. Blätter sind etwas kleiner als bei P. quinquefolia. Sonst die gleichen Eigenschaften. 3—5 Triebe | | 0,75 | 6,40 | 56,— |
| 5—8 Triebe | | 0,90 | 8,25 | 75,— |
| 8—12 Triebe | | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| **tricuspidata veitchii** (Rehd.), (Ampelopsis veitchii, Hort.) **B, L, R** Japan, Mittelchina. Dieser dreispitzige und **zierliche, hochkletternde Selbstklimmer** zeichnet sich durch seine wunderschöne orangegelbe bis **scharlachrote Herbstfärbung** aus. **Wertvollste Sorte.** | | | | |
| **Freilandpflanzen,** einjährige Vg. | 40—60 | 0,55 | 5,— | 45,— |
| zweijährige Vg. | 60—100 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| Mit Topfballen, einjährige Vg. | 40—60 | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| zweijährige Vg. | 60—100 | 0,90 | 8,25 | 75,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Polygonum** (L.) - Knöterich - POLYGONACEAE | | | | |
| **aubertii** (L. Henry) **B** | | | | |
| Westchina, **in einem Jahr bis 6 m hoch werdender, stark schlingender Strauch.** Im August bis September ist er mit großen, aufrechten, weißen Blütenrispen bedeckt. | 125—200 | 1,35 | 12,50 | 112,— |
| **Rubus** (L.) - Brombeere - ROSACEAE | | | | |
| **henryi** (Hemsl.) **I, L, St** | | | | |
| Westchina, **immergrüner,** bis 6 m hoch rankender, winterharter Strauch mit unregelmäßigen, 3—5 lappigen, dunkelgrünen, 10—15 cm langen Blättern, die unterseits weißfilzig sind. Blüten hellrot im Juni in achselständigen Trauben. **Wohl unser wertvollster, immergrüner, rankender Strauch,** dessen Blätter bei Rauhreif besonders dekorativ wirken. Mit Ballen | 80—120 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Tecoma,** siehe Campsis | | | | |
| **Vitis** (L.) - Zierwein - VITACEAE | | | | |
| **coignetiae** (Pulliat), (V. kaempferi, K. Koch) **L** | | | | |
| Japan, hochrankender, winterharter Strauch mit rostigfilzigen Blättern und bis 25 cm langen und breiten, sattgrünen, unterseits rötlich-braunfilzigen Blättern. **Wertvolle und interessante Sorte,** die sich vorzüglich zur Bekleidung wuchtiger Säulen und größerer Laubengänge eignet. 2jährig, mit Topfballen | 80—125 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **kaempferi.** siehe V. coignetiae | | | | |
| **odoratissima** (Don.), (V. vulpina, L.; V. riparia, Mchx.) **L** | | | | |
| Nordamerika, **stark kletternder Strauch** mit bis 20 cm großen, glänzendgrünen Blättern, duftenden Blüten und ungenießbaren, blau bereiften Beeren. 2jährig, mit Topfballen | 80—125 | 1,90 | 17,— | 150,— |
| **Wistaria** (Nutt.) - Glyzine - LEGUMINOSAE | | | | |
| **Vor der Pflanzung auf 30-50 cm zurückschneiden und mit feuchtem Moos einpacken.** | | | | |
| **floribunda macrobotrys** (Rehd. & Wils.), (W. multijuga; W. florib. macrostays) | | | | |
| Blüten blauviolett; Trauben bis 1 m lang. Blättchen größer als beim Typ. Mit 1 Ranke | 125—200 | 4,50 | 41,— | |
| Ab 2 Ranken | 125—200 | 5,— | 45,— | |
| **multijuga,** siehe W. floribunda macrobotrys | | | | |
| **sinensis** (Sweet.), (W. chin. DC.; Glycine sinensis, Sims.) **B, R** | | | | |
| China, bis 8 m hoch windender Strauch mit schönen blauen, 15—30 cm langen Trauben. Um ein richtiges Anwachsen zu gewährleisten, ist es zu empfehlen, die Triebe auf 40—50 cm zurückzuschneiden und Sonnenschutz zu geben. einjährig, mit Topfballen | 60—100 | 2,25 | 20,— | |
| Mit 1 Ranke | 125—200 | 4,50 | 41,— | |
| Ab 2 Ranken | 125—200 | 5,— | 45,— | |
| **Vieltriebige Büsche,** 3 × verpflanzt. Mit Ballen | 200—300 | 10,— | | |
| „ **alba** (Ldl.), Blüte weiß. Mit 1 Ranke | 125—200 | 4,50 | 41,— | |
| Ab 2 Ranken | 125—200 | 5,— | 45,— | |

# Winterharte Freilandfarne

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Adiantum** (L.) - Venushaar, Schleierfarn - POLYPODIACEAE | | | | |
| **pedatum** (L.) L, S | | | | |
| **Extra starke Einzelpflanzen,** 30-50 cm breit. Mit Ballen | | 3,75 | 34,— | |
| **Aspidium,** siehe Dryopteris und Polystichum | | | | |
| **Dryopteris** (Aspidium) - Schildfarn, Wurmfarn - POLYPODIACEAE | | | | |
| **filix mas** (Schott), (Aspidum filix mas, Sw.) S | | | | |
| Etwa 50—60 cm hoher, bekannter, trichterförmig wachsender Waldfarn. Starke Pflanzen. Mit Ballen | | 0,40 | 3,40 | 30,— |
| **Matteucia** - Becherfarn, Trichterfarn - POLYPODIACEAE | | | | |
| **struthiopteris** (Torado), (Struthiopteris german., Willd.) L, S | | | | |
| 40-70 cm hoch werdender Farn mit becherförmig gestellten Wedeln. Starke Pflanzen. Mit Ballen | | 1,— | 9,— | 82,50 |
| **Onoclea** - Sumpffarn - POLYPODIACEAE | | | | |
| **sensibilis** L | | | | |
| Nordamerika, China, Japan. Die sehr hübschen Wedel stehen senkrecht auf dem kriechenden Erdstamm, sind hellgrün, 30—50 cm lang. Sehr zu empfehlender Freilandfarn. Liebt feuchten Boden. Mit Ballen | | 1,20 | 11,50 | |
| **Osmunda** (L.) - Königsfarn, Rispenfarn - OSMUNDACEAE | | | | |
| **regalis** (L.) L, S | | | | |
| Etwa 80—120 cm hoch und breit werdender Farn mit herrlichen, zweifach gegliederten, 25—35 cm breiten Wedeln. Liebt feuchte und nach Westen geschützte Lagen. | | 1,15 | 10,— | |
| 3 × verpflanzte **Einzelpflanzen.** Mit Ballen | | 2,60 | 25,— | 225,— |
| **Phyllitis** - Hirschzunge - POLYPODIACEAE | | | | |
| **scolopendrium** (Neumann), (Scolopendrium officinarum, Hort.; Scolopendrium vulgare, Smith.) I, L, S | | | | |
| **Immergrüner,** bis 40 cm hoch werdender Farn mit langen, ungeteilten, glänzenden Blättern. **Liebt schattige Lage und kalkhaltigen, guten Boden. Sehr dekorativ.** Mit Ballen | | 0,95 | 8,25 | 75,— |
| **Polypodium** - Tüpfelfarn - POLYPODIACEAE | | | | |
| **vulgare** (L.), **Engelsüß** S | | | | |
| Farn mit wenig aufgerichteten, mehr oder weniger niederliegenden Wedeln, etwa 25—35 cm breit werdend. Wächst auf trockenen, armen Böden unter leichtem Schatten. Mit Ballen | | 0,40 | 3,— | 26,— |
| **Polystichum** - Punktfarn - POLYPODIACEAE | | | | |
| **aculeatum proliferum** (Hort.), (P. angulare proliferum, Hort.; Aspidium aculeatum proliferum) L, S | | | | |
| Sehr schmückender, wintergrüner und frostfester Freilandfarn mit lineal-lanzettlichen Fiedern. Wedel werden bis 70 cm lang. Wuchs breit und übergebogen. **Der schönste und wertvollste Freilandfarn.** Mit Ballen | 20—30 | 0,90 | 7,50 | 67,50 |
| **Scolopendrium,** siehe Phyllitis | | | | |
| **Struthiopteris** germanica, siehe Matteucia struthiopteris | | | | |

# Stauden und Halbsträucher

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Funkia** (Hosta) - Trichterlilie - LILIACEAE | | | | |
| **lancifolia undulata medio-picta** (Hosta jap. undulata, Bailay) L, S | | | | |
| Blätter weißbunt, schön gewellt, sehr zur Frühtreiberei geeignet. Mit 3—5 Triebspitzen | | 0,50 | 5,— | 45,— |
| Mit 5—8 Triebspitzen | | 0,70 | 6,— | 52,50 |
| **Hosta**, siehe Funkia | | | | |
| **Iberis** (L.) - Schleifenblume - CRUCIFERAE | | | | |
| **sempervirens Schneeflocke** B, e, I, S, St | | | | |
| Immergrüner, bis 30 cm hoch werdender Halbstrauch mit großen, flachen, reinweißen Blütendolden im Mai. Breite | 15—20 | 0,45 | 4,10 | 37,50 |
| „ **Weißer Zwerg** (Little Gem) B, e, I, S, St | | | | |
| Dicht verzweigter, geschlossen wachsender Busch, Blüten und Blätter etwas kleiner. Breite | 15—20 | 0,45 | 4,10 | 37,50 |
| **Lavandula** (L.) - Lavendel - LABIATAE | | | | |
| **latifolia**, siehe L. officinalis | | | | |
| **officinalis** (Chaix.), (L. latifolia, Vill.; L. vera, DC.) e, I | | | | |
| Südeuropa, **immergrüner**, aufrecht wachsender Halbstrauch mit kleinen, lavendelblauen und endständigen Blütenähren im Juli-August. Belaubung graugrün. Eine gute Beeteinfassung. Ohne Ballen | 20—30 | 0,45 | 4,10 | 37,50 |
| Mit Topfballen | 20—30 | 0,50 | 5,— | 45,— |
| **Nepeta** - Nepete - LABIATAE | | | | |
| **mussinii** St | | | | |
| Laub silbergrau, Wuchs ausgebreitet bis aufsteigend, Blüten sehr zahlreich, himmelblau. Höhe 25 cm. Blüte im Mai-Juli. . . . . | 15—25 | 0,40 | 3,— | 24,— |
| **Pachysandra** (Mchx.) - BUXACEAE | | | | |
| **terminalis** (S. & Z.) e, I, S, St | | | | |
| Japan, immergrüner, sich durch Rhizome ausbreitender, am Boden kriechender, bis 3 cm hoch werdender Kleinstrauch mit lederartiger Belaubung. **In stark schattigen Lagen die beste Bodenbedeckungspflanze.** 3—5 Triebe | | 0,50 | 4,50 | 41,— |
| 6—8 Triebe | | 0,75 | 6,75 | 60,— |
| **Teucrium** (L.) - Gamander - LABIATAE | | | | |
| **chamaedrys** (L.) B, e, I, St | | | | |
| Mittel- und Südeuropa, immergrüner, bis 30 cm hoch werdender Halbstrauch mit dunkelgrüner, kleiner Belaubung und purpurnen Blüten, Juli - Oktober. Verträgt als **kleine Einfassungspflanze** jeden Schnitt und treibt willig wieder durch. | 15—20 | 0,35 | 2,60 | 22,50 |
| **Einfassungspflanzen**, per lfd. m | | 0,50 | 4,10 | 34,— |
| **Vinca** (L.) - Immergrün, Sinngrün - APOCYNACEAE | | | | |
| **minor** (L.) e, I, R, S, St | | | | |
| Europa bis Westasien, immergrüner, bis 15 cm hoch werdender Halbstrauch mit kleinen, glänzenden, dunkelgrünen Blättern und 2—5 cm breiten Blüten im Mai-September. Besonders gut im Schatten **als Rasenersatz** geeignet. | | | | |
| 5—8 Triebe | | 0,35 | 2,60 | 22,50 |
| 8—12 Triebe | | 0,40 | 3,— | 27,— |
| 12—20 Triebe | | 0,45 | 3,40 | 30,— |
| **Einfassungspflanzen**, per lfd. m | | 0,50 | 4,10 | 34,— |

# Nadelgehölze

Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, sich von dem Kulturzustand unseres reichhaltigen Koniferensortiments selbst zu überzeugen, so möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen:

**Punkt 1:**
Alle von uns zum Versand gelangenden Koniferen werden ihren besonderen Bodenansprüchen gemäß auf überwiegend humosen oder mehr anlehmigen Böden kultiviert und erlangen so ihre charakteristische Färbung.

**Punkt 2:**
Nach einer sachgemäßen Düngung und regelmäßigem Verpflanzen **wird jede von uns gelieferte Konifere im vorhergehenden Spätsommer umstochen und bietet so die sichere Gewähr für ein freudiges Weiterwachsen nach dem Versand.**

**Punkt 3:**
**Der hohe Humusgehalt unserer Böden verhindert ein leichtes Zerfallen und damit das sogenannte „Rieseln" der Ballen. Beim Empfang der Ware bitten wir auf folgende Hinweise Rücksicht zu nehmen:**

a) Da alle Immergrünen während des Versandes besonders viel Feuchtigkeit beanspruchen, ist es unbedingt notwendig, die Ballen der Pflanzen unmittelbar nach ihrem Eintreffen **kräftig zu durchwässern.** In diesem Zusammenhang möchten wir noch darauf hinweisen, **daß erfahrungsgemäß in der Zeit nach Johanni bei größeren Einzelpflanzen ein besonders großer Wasserbedarf eintritt.**

b) Dabei soll das später leicht zerfallende Ballentuch an der Pflanze belassen werden, um die Struktur des Ballens nicht zu gefährden.

c) In sehr sonnigen und zugigen Lagen wird es notwendig sein, einen entsprechenden Schutz herzurichten.

d) Bei größeren Solitärs muß nach guter Verankerung im Boden sofort die Drahtverschnürung am Stamm gelöst werden.

e) Vor Eintritt stärkeren Frostes sollen neugepflanzte Koniferen gründlich gewässert werden, um dadurch die Gefahr von Frostschäden, die ja zum Teil nur ein Vertrocknen sind, erheblich zu verringern.

**Zeichenerklärung:**
**E** = für Einzelstellung (Solitär) geeignet
**H** = für Heckenpflanzen geeignet
**R** = besonders rauchharte Koniferen für Industriegebiete
**S** = für schattige Lagen und als Unterholz geeignet
**St** = für Steingärten etc. geeignet

## Solitärpflanzen

Alle von uns zum Verkauf angebotenen Einzelexemplare sind in Abständen von 2—3 Jahren regelmäßig verpflanzt und bieten damit gleichfalls die Gewähr für ein gutes Weiterwachsen. Mit Ausnahme von ungewöhnlichen Witterungsfaktoren, wie plötzliche überdurchschnittliche Hitze oder ungewöhnlich starke Fröste übernehmen wir bei sachgemäßer Behandlung und Pflege der großen Solitärpflanzen **volle Garantie für das Anwachsen;** bei Ersatzlieferung werden lediglich die zusätzlichen Transportkosten in Rechnung gestellt. **Die als Solitär vorrätigen Koniferen haben wir, wie bei den Laubgehölzen, fettgedruckt.**

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Abies** (Mill.) - Tanne, Edeltanne - PINACEAE | | | | |
| **arizonica** (Merriam), (A. lasiocarpa arizonica, Lemm.) **E, R** | | | | |
| **Korktanne** | | | | |
| Nordarizona, Nordmexiko, **frühaustreibender,** feuchtigkeitsliebender, bis 15 m hoher, sich symmetrisch aufbauender Baum mit dicker, korkiger, rahmweißer Rinde, auffallend dickem Stamm und weicher, silbriggrauer Belaubung. | 60—80 | 6,20 | | |
| | 80—100 | 8,25 | | |
| **brachyphylla,** siehe A. homolepis | | | | |
| **concolor** (Lindl. et Gord.), **Grautanne, Koloradotanne F, R** | 100—125 | 11,50 | | |
| Kolorado, 25—40 m hoher, spät austreibender und **besonders** frostharter, pyramidal wachsender Baum mit blaugrün bereiften, langen Nadeln. Ist wie kaum eine andere Art **völlig widerstandsfähig gegen Rauch und Ruß** und wie keine andere Tanne **unempfindlich gegen Trockenheit.** | 125—150 | 13,50 | | |
| | 150—175 | 21,— | | |
| | 175—200 | 25,50 | | |
| | 450—500 | 150,— | | |
| | 500—550 | 190,— | | |
| **homolepis** (S. & Z.), (A. brachyphylla, Maxim.), **Nikkotanne E** | 80—100 | 6,40 | | |
| Japan, ein sehr regelmäßig pyramidal wachsender, bis 30 m hoher, schattenverträglicher, grauschuppiger Baum; zeichnet sich bei uns durch hohe Frosthärte aus und wird nicht von der Trieblaus befallen. Gruppenpflanzen | 100—125 | 9,— | | |
| | 125—150 | 11,— | | |
| | 150—175 | 16,50 | | |
| | 175—200 | 20,— | | |
| | 200—225 | 22,50 | | |
| | 225—250 | 25,— | | |
| | 250—275 | 27,— | | |
| **lasiocarpa arizonica,** siehe A. arizonica | | | | |
| **nordmanniana** (Spach.), **Nordmannstanne E** | 40—60 | 4,75 | 37,50 | |
| Kaukasus, Kleinasien, 25—30 m hoher, **breitpyramidaler Baum mit wuchtigen, gedrungenen Ästen und glänzenddunkelgrüner Benadelung.** Weit verbreitete Tanne im Garten und Park, die 8—14 Tage später als Abies pectinata austreibt und dadurch in erhöhtem Maße spätfrostresistent ist. | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | | |
| | 125—150 | 13,50 | | |
| | 300—350 | 37,50 | | |
| | 350—400 | 75,— | | |
| **Cedrus** (Link.) - Zeder - PINACEAE | | | | |
| **atlantica glauca** (Carr.) **E** | 80—100 | 7,50 | | |
| Atlasgebirge, bis 40 m hoch werdender, **malerischer,** locker und pyramidal wachsender, winterharter, kalkliebender Baum, der auf Grund seiner stahlblauen Benadelung sehr trockenresistent ist. **Eine unserer edelsten Solitärkoniferen, die nicht unter Insekten leidet.** | 100—125 | 12,50 | | |
| | 125—150 | 13,50 | | |
| | 150—175 | 17,— | | |
| | 175—200 | 19,50 | | |
| | 200—225 | 24,— | | |
| | 225—250 | 34,— | | |
| | 250—275 | 45,— | | |
| | 275—300 | 67,50 | | |
| **deodara** (Laws.) **E** | 30—40 | 2,40 | 19,— | |
| Himalaja, hochwachsender Baum mit pyramidalem Wuchs, wobei Äste und Zweige **leicht bogig überhängen.** | 40—60 | 3,— | 24,— | |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | |
| | 80—100 | 4,75 | | |
| | 100—125 | 6,20 | | |
| **Chamaecyparis** (Spach.) - Scheinzypresse, Lebensbaumzypresse - CUPRESSACEAE | | | | |
| **lawsoniana** (Parl.) | | | | |
| Amerika, bis 60 m hoher Baum mit spitzkegelförmiger Krone. Bezweigung flach, wedelförmig, waagerecht stehend, frischgrün. Bevorzugt in seiner Heimat kalte und feuchte Lagen. | 60—80 | 1,70 | 13,50 | |
| | 80—100 | 2,40 | 19,— | |
| „ **alumii** (Beiss.) **H** | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| Schlanke Pyramide mit stahlblauer und aufrechter Bezweigung. | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 125—150 | 4,75 | 37,50 | |
| | 150—175 | 8,25 | 67,50 | |
| | 175—200 | 10,50 | 82,50 | |
| | 200—225 | 13,— | | |
| | 225—250 | 17,— | | |
| „ **ellwoodii** (Hort.) **St** | 30—40 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| Hat große Ähnlichkeit mit Cham. laws. fletcheri. Zeichnet sich durch **sehr gesunde, dunkelgrüne Bezweigung** aus und ist noch geschlossener im Wuchs. | 40—60 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 80—100 | 4,75 | 37,50 | |
| | 100—125 | 6,20 | | |
| „ **fletcheri** (Fletcher & Sons) **St** | 40—60 | 3,— | 24,— | |
| Langsam wachsende, dichte, bläulichgrüne Säulenform mit aufstrebenden Zweigen. | 60—80 | 3,75 | 30,— | |
| | 80—100 | 4,75 | 37,50 | |
| | 100—125 | 6,20 | 50,— | |
| | 175—200 | 13,— | | |

| Chamaecyparis lawsoniana (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| „ **glauca argentea** (Hort.) H<br>**Verbesserte Triumph von Boskoop,** jedoch streng pyramidal wachsend, Färbung herrlich blau. Sehr wertvoll! | 40—60<br>60—80<br>80—100<br>150—175<br>175—200 | 2,40<br>3,—<br>3,75<br>10,50<br>13,— | 19,—<br>24,—<br>30,— | 165,—<br>210,— |
| „ **intertexta** (Hort.) E<br>Eine locker wachsende Form mit weitgestellter, dicklicher, blaugrüner, **zierlich überhängender Bezweigung.** Eine sehr dekorative und wertvolle Konifere zur Einzelstellung. | 40—60<br>60—80 | 3,—<br>3,75 | | |
| „ **minima glauca** (Hort.) St<br>Dicht gedrängter, zwergig wachsender Kegel von dunkelblaugrüner Färbung. | 15—20<br>20—25<br>25—30 | 2,50<br>3,40<br>3,75 | 20,—<br>27,—<br>30,— | |
| „ **monumentalis nova** (Hort.), (Ch. laws. erecta glauca) H<br>Sehr wertvolle, dichtverzweigte, blaue Säulenform. | 60—80<br>80—100 | 2,40<br>3,— | 19,—<br>24,— | |
| „ **pendula** (Beißn.), (Ch. laws. bowleri, Hort.)<br>Hängeform, rundlicher Wuchs, mattgrüne Benadelung. | 100—125<br>125—150 | 6,20<br>8,25 | | |
| „ **Silver Queen** (Hort.) H<br>Locker wachsende Pyramidenform mit beim Austrieb **silberweißer Bezweigung.** | 40—60<br>60—80<br>80—100 | 2,40<br>3,—<br>3,75 | 19,—<br>24,— | |
| „ **stewartii** (Hort.) E<br>Locker und malerisch wachsende Konifere mit **gesunder, goldgelber Bezweigung,** die später als leicht schimmernd überlaufen bezeichnet werden muß. | 40—60<br>60—80<br>80—100 | 3,—<br>3,75<br>4,75 | 24,—<br>30,—<br>37,50 | 210,— |
| „ **tharandtensis caesia** (Büttner) St<br>Kugelförmig wachsende Zwergform mit feiner, graugrüner Belaubung, in der Jugend ähnlich der Ch. laws. forsteckensis. | 20—25<br>25—30<br>30—40<br>40—50<br>50—60<br>60—70 | 3,40<br>3,75<br>4,20<br>5,20<br>6,75<br>8,25 | 27,—<br>30,—<br>34,—<br>41,—<br>54,— | 270,— |
| „ **wisselii** (Hort.)<br>Eine sehr interessante und **dekorativ wachsende Säulenform** mit hübscher, monströser, farnwedelartiger Bezweigung. | 40—60<br>60—80<br>80—100<br>100—125<br>125—150 | 3,—<br>3,75<br>4,75<br>6,20<br>8,25 | 24,—<br>30,—<br>37,50 | |
| **nootkatensis glauca** (Rehd.), (Ch. nutkaensis glauca, Beiss.) E<br>Alaska, bis 20 m hoher Baum mit schlank pyramidalem Wuchs und **dichtstehenden, leicht überhängenden Zweigen** von bläulichgrüner Färbung. Eine unserer schönsten Koniferen. | 100—125<br>125—150<br>150—175<br>175—200 | 10,50<br>13,50<br>21,—<br>25,50 | | |
| „ **pendula** (Bailey), (Ch. nutkaensis pendula, Hort.) E<br>**Eine malerische Hängeform,** die besonders als freistehendes Exemplar ihre ganze Schönheit entfaltet. Ist zu den allerschönsten, zypressenartigen Nadelgehölzen zu zählen. | 100—125<br>125—150<br>150—175<br>175—200<br>200—225<br>350—400 | 15,—<br>16,50<br>25,50<br>34,—<br>46,50<br>190,— | | |
| **nutkaensis glauca,** siehe Ch. nootkatensis glauca | | | | |
| „ **pendula,** siehe Ch. nootkatensis pendula | | | | |
| **obtusa nana compacta,** siehe Ch. obtusa nana gracilis | | | | |
| „ „ **gracilis** (Beissn.), (Ch. obtusa nana compacta, Hort.) S, St<br>Japanische Zwergkonifere, eine außerordentlich schwachwüchsige Form mit fächerförmig gedrehten Zweigen. **Eine der wertvollsten, schattenliebenden Steingartenkoniferen.** Höhe oder Breite | 15—20<br>20—25<br>25—30<br>30—40<br>40—50<br>50—60<br>60—70 | 2,50<br>4,50<br>5,60<br>6,75<br>9,—<br>13,50<br>19,— | 20,—<br>36,— | |
| „ **pygmaea** (Carr.) S, St<br>Zwergform mit fächerförmigen Zweigen und glänzend bräunlich-grüner Belaubung. **Sehr wertvoll!** Breite | 40—50<br>50—60<br>60—70 | 9,—<br>13,50<br>19,— | | |
| **pisifera aurea** (Hort.) H<br>Eine reingelbe Varietät mit sonst gleich wertvollen Eigenschaften. | 60—80<br>80—100<br>100—125 | 3,—<br>3,75<br>4,50 | 24,—<br>30,— | |
| „ **filifera aurea** (Hort.) E<br>Eine anmutig und graziös wachsende Form mit fadenförmig herabhängender, goldgelber Benadelung, die sich gegen dunkle Koniferen gestellt, schön abhebt. Breite<br>Höhe und Breie | 20—25<br>25—30<br>125—150 | 3,40<br>4,10<br>45,— | 27,—<br>33,— | |

*Juniperus chin. pfitzeriana*
Solitär Höhe 200/225 — Breite 175/200

*Juniperus chin. pfitzeriana*
Liegende Solitärpflanze Höhe 60/100 — Breite 225/250

*Juniperus virg. canaertii*

Höhe 175/200 — Breite 60/70

*Tsuga canadensis*

Solitär
Höhe 200/225
Breite 200/225

| | | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chamaecyparis pisifera** (Fortsetzung) | | | | | |
| „ **nana** (Hort.) | St | | | | |
| Eine grüne, dem Boden festanliegende, breitwachsende und dichtbuschige, wertvolle Zwergform. | | 10—15 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | | 15—20 | 2,25 | 18,— | 150,— |
| „ **plumosa** (Beiss.) | H, R | 30—40 | 1,40 | 10,— | 90,— |
| Eine völlig winterharte Form mit zierlich straußenfederartig gekräuselter, dunkelgrüner Bezweigung. Wichtigste Sorte für die **Binderei.** | | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | | 125—150 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | | 150—175 | 8,25 | 67,50 | |
| | | 175—200 | 10,50 | 82,50 | |
| | | 200—225 | 14,— | 100,— | |
| Solitär, 80—100 cm breit | | 200—225 | 19,— | | |
| | | 225—250 | 25,— | | |
| „ „ **aurea** (Hort.) | H | 30—40 | 1,40 | 10,— | 90,— |
| Eine sehr schöne, gesunde, goldgelbe Varietät. Wichtigste Sorte für die **Binderei.** | | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | | 125—150 | 4,75 | 37,50 | |
| | | 150—175 | 8,25 | 67,50 | |
| | | 175—200 | 10,50 | 82,50 | |
| | | 200—225 | 13,— | | |
| | | 225—250 | 17,— | | |
| Solitär, 80—100 cm breit | | 175—200 | 16,— | | |
| | | 200—225 | 19,— | | |
| | | 225—250 | 25,— | | |
| „ **squarrosa** (Beissn. et Hochst.) | H, R | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| Eine pyramidal wachsende Form mit feiner, silbergrauer, leicht überhängender Bezweigung und braunroter Rinde. Beliebte Sorte für die **Binderei.** | | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | | 125—150 | 4,75 | 37,50 | |
| | | 150—175 | 8,25 | | |
| „ „ **intermedia** (Hornibr.) | St | 15—20 | 1,65 | 14,— | |
| Niedrige Zwergform mit dichter, blaugrüner Bezweigung. | Breite | 20—25 | 2,50 | 20,— | |
| | | 25—30 | 3,30 | 26,— | |
| | | 30—40 | 3,75 | 30,— | |
| „ „ **sulphurea** (Hort.) | H, R | | | | |
| Eine Form mit **schwefelgelber Bezweigung,** die sonst die gleichen Eigenschaften wie Ch. pisifera squarrosa hat. **Wertvoll für Binderei.** | | 60—80 | 3,— | 24,— | |
| | | 80—100 | 3,75 | 30,— | |
| | | 100—125 | 4,75 | 37,50 | |
| **Cryptomeria** (D. Don.) - Sicheltanne, Kryptomerie - PINACEAE | | | | | |
| **japonica compacta** (Beiss.) | E | | | | |
| Japan, eine mehr gedrungen wachsende Form, die sich durch besondere Winterhärte und frischgrüne, gesunde Benadelung auszeichnet. | Mit ca. 80 cm Stamm | 300—325 | 27,— | | |
| „ **dacrydioides** (Hort.) | E | | | | |
| Japan, **bizarr wachsende Form** mit ausgebreiteten, langen, weitstehenden Ästen und leicht überhängenden Zweigen. Eine sehr interessante, dekorative Einzelpflanze. | | | | | |
| Solitär, 125—150 cm breit | | 125—150 | 22,50 | | |
| 175—200 cm breit | | 150—175 | 34,— | | |
| | | 175—200 | 37,50 | | |
| „ **elegans** (Mast.) | E | | | | |
| Kleinbleibender Baum mit bläulichgrüner, dichtgestellter, krausbuschiger und weicher Bezweigung, die öfter sichelförmig zurückgebogen ist und sich im Winter rotbraun färbt. Besonders schön gewachsene Exemplare sind als **Kübelpflanzen sehr für Dekorationszwecke geeignet.** | | 60—80 | 4,75 | 37,50 | |
| | | 80—100 | 6,20 | 50,— | |
| | | 100—125 | 8,25 | | |
| **Ginkgo** (L.) - Fächerblattbaum - GINKGOCEAE | | | | | |
| **biloba** (L.) | E | | | | |
| Ostchina, Japan, lichtbedürftiger, bis 40 m hoher, frostharter, geradstämmiger Baum mit anfangs pyramidaler, später ausgebreiteter Krone. Die fächerförmig gelappten, 5—8 cm großen Blätter sind lichtgrün und im Herbst goldgelb gefärbt. **Ein herrliches Einzelexemplar.** | | 150—175 | 10,50 | | |
| | | 175—200 | 13,— | | |
| | | 200—225 | 16,50 | | |
| **Hochstämme,** mit Ballen. Stammumfang | | 12—14 | 25,— | | |
| | | 14—16 | 30,— | | |
| | | 16—18 | 36,— | | |

## Juniperus (L.) - Wacholder - CUPRESSACEAE

| | Breite ca. | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **chinensis pfitzeriana** (Späth.) **E, H, R, S, St** | | | | | |
| Eine breitaufrecht wachsende Varietät mit waagerecht abstehender, blaugrüner Bezweigung. Da sich diese schattenverträgliche und sehr rußfeste Sorte sowohl als ganz flache, als auch als mehr aufrecht wachsende Form ziehen läßt, **bietet sie die größte Verwendungsmöglichkeit.** Auch lassen sich mit ihr prächtige Hecken schaffen. | 30—40 cm | 30—40 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 40—60 cm | | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 60—80 cm | | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 80—100 cm | | 6,— | 48,— | 450,— |
| | 40—60 cm | 40—60 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 60—80 cm | | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 80—100 cm | | 6,75 | 54,— | 490,— |
| | 125—150 cm | | 16,— | 145,— | |
| | 150—175 cm | | 24,— | 220,— | |
| | 60—80 cm | 60—80 | 5,60 | 45,— | 410,— |
| | 80—100 cm | | 7,50 | 60,— | 540,— |
| | 80—100 cm | 80—100 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| | 125—150 cm | 60—100 | 16,— | 140,— | |
| | 150—175 cm | | 25,50 | 225,— | |
| | 175—200 cm | | 30,— | 270,— | |
| | 200—225 cm | | 36,— | | |
| | 225—250 cm | | 43,50 | | |
| | 250—275 cm | | 54,— | | |
| | 275—300 cm | | 64,— | | |
| | 300—350 cm | | 75,— | | |
| | 150—175 cm | 100—125 | 27,— | | |
| | 175—200 cm | | 33,— | | |
| | 200—225 cm | | 39,— | | |
| | 225—250 cm | | 45,— | | |
| | 125—150 cm | 125—150 | 25,50 | | |
| | 150—175 cm | | 30,— | | |
| | 175—200 cm | | 35,50 | | |
| | 200—225 cm | | 39,— | | |
| | 225—250 cm | | 48,— | | |
| | 150—175 cm | 150—175 | 35,50 | | |
| | 175—200 cm | | 37,50 | | |
| | 200—225 cm | | 42,— | | |
| | 225—250 cm | | 50,— | | |
| | 200—225 cm | 175—200 | 45,— | | |
| | 350—400 cm | 200—225 | 120,— | | |
| „ „ **aurea** (Young). **Neueinführung!** **E, S, St** | | | | | |
| Diese Varietät zeichnet sich durch sehr dekorative, **goldgelbe Spitzentriebe** aus und kann es an Schönheit mit Juniperus chin. procumbens aurea aufnehmen. Hiermit lassen sich sehr schöne Farbwirkungen erzielen. | | 30—40 | 3,75 | 30,— | |
| | | 40—60 | 4,75 | 37,50 | |
| | | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| | | 80—100 | 11,50 | 90,— | |
| „ **plumosa,** siehe J. chinensis procumbens | | | | | |
| „ „ **aurea,** siehe J. chin. procumbens aurea | | | | | |
| „ **procumbens** (Hort.), (J. chinensis plumosa, Hornibr.; J. japonica, Hort. holl.) **E, St** | | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| Eine niedrige Form mit schräg ausgebreiteten, **fächerförmigen Ästen** und den Winter über anhaltender, lebhaft frischgrüner Benadelung. Eine ganz winterharte, **malerisch wachsende,** wertvolle Einzelkonifere. Höhe ca. 60—80 cm, Breite | | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| | | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | | 100—125 | 12,— | 94,— | |
| | | 125—150 | 15,— | 120,— | |
| | | 150—175 | 22,50 | | |
| | | 175—200 | 30,— | | |
| | | 200—225 | 36,— | | |
| | | 250—275 | 60,— | | |
| „ „ **aurea** (Beiss.), (J. chinensis plumosa aurea, Hornibr.; Junip. japonica aurea, Hort. holl.) **E, St** | | 50—60 | 9,— | | |
| Eine niedrige, auffallend schön goldgefärbte Form mit stark übergebogenen, unregelmäßig gestellten Ästen und kurzen, dichtstehenden, an den Enden leicht nickenden Zweigen. Neben J. chin. pfitzeriana aurea **wohl die wertvollste gelbe Form unter den Wacholdern,** die sich dazu noch als besonders unempfindlich gegen Ruß erwiesen hat. Höhe ca. 60—100 cm, Breite | | 60—70 | 11,50 | | |
| | | 70—80 | 15,— | | |
| | | 80—100 | 19,50 | | |
| | | 100—125 | 24,— | | |
| | | 125—150 | 34,— | | |
| | | 150—175 | 41,— | | |
| | | 175—200 | 52,50 | | |
| | | 200—225 | 67,50 | | |
| | | 225—250 | 90,— | | |
| **communis** (L.), **Gemeiner Wacholder** **E, St** | | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| Heimischer, je nach Standort buschiger oder mehrstämmiger, bis 15 m hoch werdender Baum oder Strauch. | | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |

| Juniperus communis (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| „ **compacta** (Hort.) **E, St** Eine besonders geschlossen wachsende Form, die sich im Alter sehr schön entwickelt. | 40—60 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 60—80 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 80—100 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 100—125 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 125—150 | 6,20 | 50,— | |
| | 150—175 | 8,25 | | |
| „ **cracovica** (Knight.) **E, St** Eine sehr wertvolle, wild bei Krakau gefundene, robuste und wüchsige Sorte mit locker pyramidalem Wuchs und **leicht nickenden Zweigspitzen.** Nadeln ziemlich kurz, hellgrün. | 40—60 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 60—80 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 80—100 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 100—125 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 125—150 | 6,20 | 50,— | |
| | 150—175 | 8,25 | 67,50 | |
| „ **hibernica** (Gord.), (J. comm. stricta), **Säulenwacholder** Bildet blaugrüne und schmale Pyramiden. **E, St** Preise und Größen wie bei J. comm. suecica | | | | |
| „ **hornibrookii** (Grootend.) **Neueinführung!** **St** Eine aus Irland eingeführte Sorte mit sehr kleinen, dichtgestellten, hellgrünen Nadeln. Mit ihren flachausgebreiteten, am Boden kriechenden Zweigen bildet sie eine herrliche, **polsterähnliche Bodenbedeckung. Diese Sorte ist es wert, stärkere Verbreitung zu finden.** Höhe ca. 15 cm, Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | 375,— |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| „ **Obergärtner Bruns** (Hort.) **E, St** Dieser Findling zeichnet sich durch einen sehr schönen Wuchs und schöne, gesunde, unterseits bläuliche Benadelung aus. | 40—60 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 60—80 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 80—100 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 100—125 | 4,75 | 37,50 | |
| „ **repanda** (Grootend.), **Neueinführung!** **St** Eine aus Irland eingeführte, völlig rußfeste Form, die sich hier vorzüglich bewährt hat. Eine rundliche, flach auf dem Boden liegende Pflanze mit dichtstehenden, dunkelgrünen, glänzenden Nadeln. Bildet wie J. com. hornibrookii eine wunderschöne, **polsterartige Bodenbedeckung** und kann auf Grund längerer Erprobung **bestens empfohlen werden.** Höhe ca. 15 cm, Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | 375,— |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| | 80—100 | 8,25 | | |
| „ **stricta**, siehe J. communis hibernica | | | | |
| „ **suecica** (Loud.), **Schwedischer Säulenwacholder** **St** Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen. | 40—60 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 60—80 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 80—100 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 100—125 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 125—150 | 6,20 | 50,— | |
| | 150—175 | 8,25 | | |
| **depressa plumosa**, siehe J. horizontalis plumosa | | | | |
| **horizontalis** (Moench.), (J. prostrata, Pers.; J. sabina prostrata, Loud.; J. sabina procumbens, Pursh.; J. repens, Nutt.), **Kriechwacholder** **R, St** Nordamerika, dem Boden aufliegender, weithin kriechender, langästiger Strauch mit bläulichgrüner bis blauer Färbung. **Eine sehr wertvolle, rußfeste und schattenverträgliche Sorte. Hervorragendes Bodenpolster!** Höhe ca. 10—15 cm, Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| „ **douglasii** (Rehd.) **R, St** Eine niederliegende, dichtverzweigte, 3 m breit und nur 30 cm hoch werdende Form mit stahlblau bereifter Benadelung, die sich im Herbst und Winter leicht rotbraun verfärbt. Hat sich in „Planten un Blomen" als **besonders rußfest erwiesen.** Höhe ca. 10—15 cm, Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | |
| „ **glauca** (Hornibr.) **St** Eine dicht auf dem Boden liegende Form mit schöner, blauer Färbung. Verträgt keinen Schatten. Sonst eine Verbesserung von J. horizontalis. **Hervorragendes Bodenpolster!** Höhe ca. 15—20 cm, Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| „ **plumosa** (Rehd.), (J. depressa plumosa, Hort.) **St** **Neueinführung!** Niedergedrückter, oben flacher Strauch mit fast waagerecht ausgebreiteten Ästen. Wird bis 50 cm hoch und 2—2,50 m breit. Zeichnet sich noch durch seine dichtfederige, im Herbst leicht **bronzepurpurne Bezweigung** aus. **Eine der wertvollsten, bodenbedeckenden Zwergformen.** Höhe ca. 15—20 cm, Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | 375,— |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| **japonica**, siehe J. chinensis procumbens | | | | |
| „ **aurea**, siehe J. chinensis procumbens aurea | | | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Juniperus** (Fortsetzung) | | | | |
| **macrocarpa** (Sibth.), (J. neaboriensis, Laws.) | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| Mittelmeergebiet, kleiner, bis 4 m hoch werdender Baum mit aufrechten, spitzwinkelig abstehenden Ästen. Früchte blau bereift. | 125—150 | 10,50 | 82,50 | |
| | 150—175 | 14,— | 100,— | |
| | 175—200 | 17,— | 135,— | |
| **neaboriensis,** siehe J. macrocarpa | | | | |
| **occidentalis,** siehe J. pseudocupressus | | | | |
| **prostrata,** siehe J. horizontalis | | | | |
| **pseudocupressus** (Dieck), (J. occidentalis, Hook.) | 60—80 | 3,— | 24,— | |
| Montana, bis 15 m hoher Baum mit **säulenförmigem Wuchs** und aufstrebenden Ästen; von grau- bis blaugrüner Färbung. | 125—150 | 6,20 | 50,— | |
| | 150—175 | 8,25 | 67,50 | |
| | 175—200 | 10,50 | 82,50 | |
| | 250—275 | 21,— | | |
| | 275—300 | 30,— | | |
| **repens,** siehe J. horizontalis | | | | |
| **sabina cupressifolia** (Ait.), (J. sabina humilis, Endl.) **St** | 30—40 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| Eine schöne, gedrungene Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden, dicklichen Zweigen. Zeichnet sich durch **Gesundheit,** hohe Schattenverträglichkeit und frisch bläuliche Färbung aus. Breite | 40—60 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 80—100 | 6,75 | 54,— | |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| | 125—150 | 12,— | | |
| „ **femina** (Hort.), **Weiblicher Sadebaum** **R, St** Mitteleuropa bis Kaukasus, Wuchs unterschiedlich, ausgebreitet und niederliegend mit weichen, aufstrebenden, dunkelgrünen Zweigspitzen. Liebt kalkhaltigen Boden. Breite | 20—30 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| | 30—40 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 40—60 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 80—100 | 6,75 | 54,— | 500,— |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| „ **hicksii** (Grootend.), (J. horizont. hicksii, Hort. americ.) **St** | | | | |
| Eine der sabina ähnliche Form mit **auffallend grau-blau** gefärbten Nadeln. Pflanzen sehr gesund und frohwüchsig. Breite | 40—60 | 3,— | 24,— | |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | |
| „ **humilis,** siehe J. sabina cupressifolia | | | | |
| „ **mas** (Hort.), **Männlicher Sadebaum** **R, St** Mitteleuropa bis Kaukasus, unterscheidet sich von J. sabina femina nur durch seine blaugraue, stechende Benadelung. Breite | 30—40 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 40—60 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 80—100 | 6,75 | 54,— | |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| | 125—150 | 12,— | 98,— | |
| „ **procumbens,** siehe J. horizontalis | | | | |
| „ **prostrata,** siehe J. horizontalis | | | | |
| „ **tamariscifolia** (Ait.) **R, St** Eine sehr wertvolle, absolut rußfeste, flachwachsende Zwergform mit **auch den Winter über anhaltender, blaugrüner Bezweigung.** Liebt kalkhaltigen Boden. Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| **squamata meyeri** (Rehd.) **St** In China vorkommende, langsam wachsende Sorte mit intensiv stahlblauer Farbe. Diese relativ rußfeste Konifere **soll laufend etwas im Schnitt gehalten werden,** damit sie ihre Schönheit behält und nicht locker und kahlästig wird. Höhe oder Breite | 20—30 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 30—40 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 40—50 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 50—60 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 60—80 | 5,20 | 41,— | 375,— |
| | 80—100 | 6,75 | 54,— | |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| „ **wilsonii** (Rehd.) **St** Bis 2 m hoch werdender, aufrecht bis breitbuschig wachsender Strauch mit graugrüner Färbung. | 30—40 | 2,50 | | |
| | 40—50 | 3,40 | | |
| | 50—60 | 4,20 | | |
| | 80—100 | 6,75 | | |
| **virginiana** (L.) Nordamerika, bis 30 m hoher Baum mit je nach Boden- und Klimaverhältnissen mehr **schmal- oder breitpyramidaler Krone und rotbrauner, abblätternder Rinde.** Kommt in seiner Heimat sowohl auf feuchten bis sumpfigen, als auch auf trockenen und felsigen Böden vor. | 40—60 | 1,40 | 10,— | |
| | 60—80 | 1,70 | 13,50 | |
| | 80—100 | 2,40 | 19,— | |
| | 100—125 | 3,— | 24,— | |
| | 125—150 | 3,75 | 30,— | |
| „ **burkei** (Slavin), **Neueinführung!** **E, R** Pyramidal und geschlossen wachsende Sorte mit stahlblauer Benadelung, welche im Winter bronzepurpur erscheint. | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 110,— | |
| | 150—175 | 21,— | | |
| | 175—200 | 25,50 | | |
| „ **canaertii** (Sénécl.), (J. virg. cannartii, Beiss.) **E** Eine malerische, locker und aufrecht wachsende Form mit **leicht überhängenden Spitzen und schön hellblau bereiften Beeren,** die sich schön von der dunkelgrünen Bezweigung abheben. Eignet sich besonders zur Einzelstellung. Malerisch gewachsene, schöne Pflanzen | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| | 80—100 | 7,50 | 60,— | |
| | 100—125 | 9,40 | 75,— | |
| | 125—150 | 12,— | 96,— | |
| | 150—175 | 16,50 | | |
| | 175—200 | 22,50 | | |
| | 200—225 | 28,50 | | |
| | 225—250 | 36,— | | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Juniperus virginiana** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **cannartii,** siehe J. virg. canaertii | | | | |
| „ **glauca** (Knight.) **E, R** | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| Eine sehr wüchsige, **stahlblaue Varietät** mit gleichen Wuchs- und Werteigenschaften. Malerisch gewachsene, schöne Pflanzen. | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 110,— | |
| | 150—175 | 21,— | | |
| | 175—200 | 27,— | | |
| | 200—225 | 34,— | | |
| Breite ca. 200—225 cm | 325—350 | 135,— | | |
| „ **globosa** (Beiss.) **St** | 30—40 | 5,60 | 45,— | |
| Eine gedrungene, dicht bezweigte Kugelform mit frischgrüner Färbung. Breite | 40—50 | 6,75 | 54,— | |
| | 50—60 | 9,— | | |
| | 60—70 | 11,50 | | |
| „ **pyramidalis** (Carr.) **E** | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| Eine sehr wertvolle, dichtbezweigte Säulenform mit heller, bläulichgrüner Benadelung. **Ähnelt im Alter der echten Zypresse.** | 80—100 | 7,50 | 60,— | |
| | 100—125 | 9,40 | 75,— | |
| | 125—150 | 12,— | 96,— | |
| | 150—175 | 16,50 | 130,— | |
| | 175—200 | 22,50 | 180,— | |
| | 200—225 | 28,50 | | |
| | 225—250 | 36,— | | |
| | 250—275 | 43,50 | | |
| „ **reptans** (Beiss.) **St** | | | | |
| Eine sich flach über dem Boden ausbreitende Form mit nickenden Zweigspitzen und frischgrüner, bläulich-schimmernder Benadelung. **Sehr gute Bodenbedeckung.** Breite | 40—50 | 3,40 | | |
| | 50—60 | 4,20 | | |
| | 60—80 | 5,20 | | |
| | 80—100 | 6,75 | | |
| **Larix** (Mill.) - Lärche - PINACEAE | | | | |
| Um größere Ausfälle zu vermeiden, dürfen Lärchen **nicht mehr nach dem 1. März verpflanzt werden.** | | | | |
| **decidua** (Mill.), (L. europaea, DC.; L. vulgaris, Fisch.), | | | | |
| **Europäische Lärche H, R** | | | | |
| Sudeten, Karpaten, bis 35 m hoher, ausgesprochener Lichtbaum mit in der Jugend pyramidalem, **im Alter mehr in die Breite gehendem Wuchs und waagerecht abstehenden, leicht überhängenden Zweigen.** Bevorzugt einen kräftigen Lehmboden und **verträgt mehr Trockenheit als L. leptolepis!** | 100—125 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| | 125—150 | 2,40 | 20,— | 180,— |
| | 150—200 | 3,20 | 26,— | 240,— |
| | 200—250 | 5,— | 41,— | 375,— |
| | 250—300 | 7,50 | 64,— | 560,— |
| | 300—350 | 13,50 | 120,— | 1100,— |
| **europaea,** siehe L. decidua | | | | |
| **japonica,** siehe L. leptolepis | | | | |
| **leptolepis** (Murr.), (L. japonica, Carr.), **Japan. Lärche H, R** | 80—100 | 1,35 | 10,50 | 90,— |
| Bis 30 m hoher, breit kegelförmig wachsender Baum mit waagerecht abstehenden, **nicht überhängenden, lebhaft rotbraunen Zweigen.** Da sie in ihrer Heimat Hondo unter hohen Niederschlagsmengen gedeiht, fühlt sie sich auch bei uns **in luftfeuchten Gebieten am wohlsten** und leidet hier wenig unter Krebs und der Motte. | 100—125 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| | 125—150 | 2,40 | 20,— | 180,— |
| | 150—200 | 3,20 | 26,— | 240,— |
| | 200—250 | 5,— | 41,— | 375,— |
| | 250—300 | 7,50 | 64,— | 560,— |
| | 300—350 | 13,50 | 120,— | |
| **Solitär,** 150—250 cm breit | 300—350 | 19,— | | |
| | 350—400 | 26,— | | |
| | 400—500 | 37,50 | | |
| „ **pendula E** | | | | |
| Eine schöne, höchst dekorative Form, die sich mit ihren schwer herabhängenden Ästen im Schmucke der üppigen Belaubung prächtig ausnimmt. | 80—100 | 4,50 | | |
| | 100—125 | 6,— | | |
| | 125—150 | 8,25 | | |
| **vulgaris,** siehe L. decidua | | | | |
| **Libocedrus** (Endl.) - Flußzeder - PINACEAE | | | | |
| **decurrens** (Torr.), **Kalifornische Flußzeder E, S** | | | | |
| Bis 40 m hoher Baum mit **stark aufrechter, säulenförmiger** Krone und kurz abstehenden, frischgrünen Zweigen. In geschützten Lagen eine sehr dekorative Charakterform. Bevorzugt als Halbschattenbaum feuchten Boden. | 125—150 | 12,— | | |
| **Picea** (A. Dietr.) - Fichte, Rottanne - PINACEAE | | | | |
| **alba,** siehe Picea glauca | | | | |
| **albertiana conica,** siehe P. glauca conica | | | | |
| **abies,** siehe Picea excelsa | | | | |
| **canadensis,** siehe P. glauca | | | | |
| „ **conica,** siehe P. glauca conica | | | | |
| **engelmannii glauca** (Engelm.) **E** | | | | |
| Nordamerika, bis 50 m hoher, gleichmäßig pyramidal wachsender Baum mit abstehenden Ästen und im Alter zierlich hängender, fein behaarter, besonders im Frühjahr stark ausgeprägter, bläulichgrüner, weicher Benadelung. | 60—80 | 4,75 | 37,50 | |
| | 80—100 | 6,20 | 50,— | |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| | 125—150 | 10,50 | | |
| | 150—175 | 13,— | | |

| Picea (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **excelsa** (Link), (P. abies, Karst.), **Fichte, Rottanne** **H, R** | 40—60 | 0,85 | 6,75 | 60,— |
| Der deutsche Weihnachtsbaum. Als Windschutz eignet sich P. sitchensis besser. | 60—80 | 1,25 | 10,— | 90,— |
| | 80—100 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 100—125 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 125—150 | 3,— | 24,— | 210,— |
| Besonders breite, vollgarnierte Pflanzen | 150—175 | 4,75 | | |
| | 175—200 | 6,75 | | |
| | 200—225 | 9,— | | |
| **Topffichten** Ohne Ballen | 20—30 | 0,50 | 4,50 | 40,— |
| Dieselben zur Bepflanzung von Balkonkästen; mit kleinen Fehlern 40 % billiger. | 30—40 | 0,60 | 5,50 | 50,— |
| | 40—60 | 0,70 | 6,50 | 60,— |
| | 60—80 | 0,90 | 8,50 | 80,— |
| „ **cupressina** (Thoms.), **Zypressenfichte** **E** | 175—200 | 17,— | 135,— | |
| Ähnelt im Wuchs einer etwas breiten Säulenzypresse. | 200—225 | 21,— | 165,— | |
| Ein sehr wertvoller Einzelbaum. | 225—250 | 25,— | 210,— | |
| | 250—275 | 30,— | 240,— | |
| **Zwergfichten in nachstehenden Varietäten:** | | | | |
| **excelsa conica** (Carr.), **Kegelfichte** **St** | | | | |
| Zweige dichtstehend, Wuchs kegelförmig. Breite ca. 125—150 cm | 150—175 | 30,— | | |
| „ **echiniformis** (Kew.) **St** | 15—20 | 3,75 | | |
| Von dichtem, kugelförmigem Wuchs. Breite | 20—30 | 6,— | | |
| | 30—40 | 7,50 | | |
| „ **maxwellii** (Beißn.) **St** | 20—30 | 2,50 | 20,— | |
| Flachkugelig, hellgrün. Breite | 30—40 | 3,40 | 27,— | |
| | 40—50 | 4,20 | | |
| „ **nidiformis** (Beißn.) **St** | 15—20 | 1,50 | 12,— | 108,— |
| Kissenbildend, ohne Mitteltrieb. Breite | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| „ **procumbens** (Carr.) **St** | 40—50 | 4,20 | 34,— | |
| Flache, ausgebreitete Form. Breite | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| „ **pumila glauca** (Beißn.) **St** | 15—20 | 1,50 | 12,— | 108,— |
| Plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| schwarzgrün. Breite | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| „ **pygmaea** (Carr.) **St** | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| Dichtbuschige, kegelförmige Zwergform. | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| Höhe oder Breite | 40—50 | 4,20 | 34,— | |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| Breite ca. 150—175 cm | 80—100 | 45,— | | |
| 125—150 cm | 100—125 | 45,— | | |
| „ **remontii** (Beißn.) **St** | | | | |
| Dichtverzweigte, eiförmig wachsende Zwergform mit | 30—40 | 3,40 | | |
| hellgrüner Benadelung. | 40—50 | 4,20 | | |
| **glauca** (Voss.), (P. canadensis, Koehne; P. alba, Link) **H, R** | 60—80 | 1,25 | 10,— | |
| **Weißfichte** | 80—100 | 1,70 | 13,50 | |
| Nordamerika, bei uns meist nur bis 10 m hoher, pyramidaler Baum mit sehr dichter und geschlossener Bezweigung. Besonders geeignet **für trockene Lagen und leichtere, sandige Böden.** Läßt sich wegen seiner Frost- und Windbeständigkeit auch **in unmittelbarer Küstennähe gut als Hecke verwenden.** | 100—125 | 2,40 | 19,— | |
| | 125—150 | 3,— | 24,— | |
| | 150—175 | 4,75 | 37,50 | |
| | 175—200 | 6,20 | 50,— | |
| | 200—225 | 8,25 | | |
| | 225—250 | 10,50 | | |
| | 250—275 | 13,— | | |
| | 275—300 | 17,— | | |
| „ **conica** (Rehd.), (P. canad. conica, Fitschen; P. albertiana conica, Hort.), **Zuckerhutfichte** **E, St** | 15—20 | 1,65 | 13,— | 120,— |
| Zwergige Form von schmalkegelförmig dichtem Wuchs | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| mit feinen, dichtbenadelten Zweigen. Eine besonders | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| schöne Form. | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| **Solitär,** 60—80 cm breit | 120—140 | 45,— | | |
| 80—100 cm breit | 160—180 | 60,— | | |
| | 180—200 | 75,— | | |

**Picea** (Fortsetzung)

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **omorika** (Purkynê), **Serbische Fichte** E, H, R<br>Ein in der Heimat bis 50 m hoch wachsender, schlank pyramidaler Baum mit unterseits silbrigweißer, gesunder Benadelung und elegant überhängenden, dünnen Zweigen, die sich mit zunehmendem Alter niedersenken. Dieser außerordentlich anspruchslose, windfeste, trockenresistente und industrieharte Baum wächst in seiner Heimat auf reinen Kalkböden. **Architektonisch eine unserer wichtigsten Charakterpflanzen.** | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 125—150 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 150—175 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 175—200 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| | 200—225 | 13,— | 100,— | 900,— |
| | 225—250 | 17,— | 135,— | 1200,— |
| | 250—275 | 21,— | 165,— | 1500,— |
| | 275—300 | 30,— | 250,— | 2250,— |
| | 300—350 | 39,— | 312,— | |
| | 350—400 | 56,— | 450,— | |
| | 400—450 | 67,50 | 540,— | |
| | 600—700 | 150,— | | |
| „ **nana** (Hort.), **Neuheit 1952!** St<br>Eine dichtnadelige Zwergform **mit sehr gesunder, unterseits blaubereifter Benadelung** und etagenförmig breitkegelförmigem Wuchs. Breite | 50—60 | 11,— | | |
| | 60—70 | 12,— | | |
| | 70—80 | 15,— | | |
| **orientalis** (Carr.), **Türkische oder orientalische Fichte** E, S<br>Langsam wachsender, regelmäßig **breitkegelförmiger** Baum mit glänzend dunkelgrüner Benadelung. Diese **sehr schattenverträgliche** Fichte zeichnet sich durch **besonders hohe Trockenheitsfestigkeit aus.** Wird nicht vom Wild verbissen. | 80—100 | 4,75 | 37,50 | |
| | 100—125 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 125—150 | 8,25 | 67,50 | |
| | 150—175 | 10,50 | | |
| | 175—200 | 13,— | | |
| | 200—225 | 17,— | | |
| | 225—250 | 21,— | | |
| | 250—275 | 27,— | | |
| | 275—300 | 33,— | | |
| **pungens glauca** (Beiss.), **Blaufichte** H, R<br>Diese besonders intensiv blau gefärbte Form **zeichnet sich durch Frosthärte, Rußfestigkeit und außerordentliche Windfestigkeit aus.** Verträgt keinen seitlichen Druck. | 60—80 | 5,40 | 37,50 | |
| | 80—100 | 6,20 | 50,— | |
| | 100—125 | 8,25 | | |
| | 125—150 | 10,50 | | |
| | 150—175 | 13,— | | |
| | 225—250 | 30,— | | |

## Veredelte Blaufichten (Blautannen) in nachstehenden Varietäten:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **pungens glauca endtzii** (Hort.) E<br>Eine sehr wertvolle Sorte mit langen Nadeln, tiefblauer Färbung und schönem Wuchs.<br>„ **glauca Erich Frahm** (Hort. J. Timm & Co.) E<br>Bildet die schönsten, gleichmäßigen Pyramiden, Färbung dunkelblau während des ganzen Jahres.<br>„ **glauca moerheimii** (Hort.) E<br>Verbesserung von P. pg. gl. kosteri, mit schöner Färbung und besserem Wuchs.<br>„ **glauca vuykii** (Hort.) E<br>Färbung der Nadeln dunkelgraublau, Wuchs wohltuend locker, gegen alle Schädlinge besonders widerstandsfähig, sehr wertvolle Form. | 100—125 | 22,50 | 180,— | |
| | 125—150 | 28,— | 225,— | |
| | 150—175 | 33,— | | |
| | 175—200 | 45,— | | |
| **sitchensis** (Carr.) H<br>Nordamerika, ein in seiner Heimat mächtiger Baum mit breitpyramidaler Krone. Dieser bodenvage Baum bevorzugt ein luftfeuchtes Küstenklima und anmoorigen Boden. **Ist in Küstengebieten bei seiner hohen Windfestigkeit ein sehr guter Sandbinder. Hervorragend für Windschutzhecken zu gebrauchen.** | 60—80 | 1,25 | 10,— | 90,— |
| | 80—100 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 100—125 | 2,40 | 19,— | |
| | 125—150 | 3,— | | |
| | 150—175 | 4,75 | | |
| | 175—200 | 6,20 | | |

## Pinus - Kiefer, Föhre - PINACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **cembra** (L.), **Zirbelkiefer, Arve** E, R<br>Karpaten, Nordasien, bis 25 m hoher, schmalpyramidaler Baum mit **kräftig dunkelgrüner Benadelung.** Liebt einen nährstoffhaltigen, leicht anbrüchigen Boden. | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 15,— | 120,— | |
| | 150—175 | 21,— | 165,— | |
| | 175—200 | 25,50 | 200,— | |
| | 200—225 | 30,— | | |
| | 225—250 | 36,— | | |
| | 250—275 | 41,— | | |
| | 275—300 | 45,— | | |
| | 300—350 | 52,50 | | |
| **densiflora pumila** (Hort.)<br>Niedrige Form von dichtverzweigtem Wuchs, rundlich-kegelförmig. | 80—100 | 10,— | | |
| | 100—125 | 13,50 | | |
| | 125—150 | 18,— | | |
| | 150—175 | 27,— | | |

| **Pinus** (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **excelsa** (Wall.), (P. griffithi, Mc. Cl.), **Tränenkiefer** E | | | | |
| Himalaja, in der Heimat zusammen mit Cedrus deodara vorkommender, 50 m hoher, lichtbedürftiger Baum mit lockerer, breit pyramidaler Krone und **weich hängender, bläulichgrüner Benadelung. Eine sehr interessante und malerische Einzelkonifere.** | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 108,— | |
| Solitär, 200—225 cm breit | 275—300 | 67,50 | | |
| 250—300 cm breit | 300—350 | 82,50 | | |
| **griffithi,** siehe P. excelsa | | | | |
| **heldreichii leucodermis,** siehe P. leucodermis | | | | |
| **laricio austriaca,** siehe P. nigra austriaca | | | | |
| **leucodermis** (Ant.), (P. heldreichii leucodermis, Markgr.), **Schlangenhautkiefer** E | | | | |
| Illyrisches Gebirge, Dalmatien, ein mittelstarkwachsender, **breit pyramidaler** Baum mit dichtstehenden, **grauweißen, nie von unten kahl werdenden Zweigen** und auffallend gesunder, **frischgrüner,** büschelig gehäufter Benadelung. Eine sehr wertvolle und **anspruchs**lose, kalkliebende Kiefer. Gedeiht in ihrer Heimat in öden Steinwüsten und auf wasserlosen, sonnigen Steinhängen. | 100—125 | 13,50 | | |
| | 125—150 | 21,— | | |
| | 150—175 | 25,50 | | |
| | 175—200 | 33,— | | |
| **montana** (Mill.), (P. mugo, Turra), **Bergkiefer, Krummholzkiefer** H, R | 20—30 | 1,35 | 10,— | 90,— |
| Stark buschig verzweigt, Äste oft niederliegend, an Boden und Lage sehr anspruchslos und **gut für Windschutzpflanzungen** an der Küste geeignet. Läßt sich **gut für Balkonkastenbepflanzung** verwenden. Bei allen Größen ist die Breite ungefähr gleich der Höhe. | 30—40 | 1,80 | 15,— | 135,— |
| | 40—60 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 60—80 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 80—100 | 6,75 | 54,— | |
| | 100—125 | 10,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 108,— | |
| | 150—175 | 19,— | | |
| | 175—200 | 22,50 | | |
| | 200—225 | 33,— | | |
| „ **mughus** (Willk.), (P. mugo mughus, Turra), **Mughuskiefer, Legföhre oder Latsche** H, R | 20—30 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| Diese mehr gedrungene und niedriger bleibende Form wächst mehr breit als hoch und weist **gedrehte Nadeln auf.** Breite gleich Höhe | 30—40 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 40—50 | 4,20 | 34,— | 300,— |
| | 50—60 | 5,20 | 41,— | 375,— |
| | 60—80 | 6,75 | 54,— | |
| | 80—100 | 9,— | | |
| | 100—125 | 14,50 | | |
| | 125—150 | 19,— | | |
| 2 × verpfl. **volle Büsche,** ohne Ballen | 20—30 | 0,60 | 5,25 | 45,— |
| „ **pumilio** (Willk.), (P. mugo pumilio, Turra) H, R, St | | | | |
| Sie zeigt einen **ausgesprochen zwergigen Wuchs** und besonders kurze, dichtstehende, **gedrehte Nadeln.** | 20—30 | 3,— | 24,— | |
| Breite ca. 30—40 cm | 30—40 | 3,75 | 34,— | |
| 40—50 cm | | 4,50 | 41,— | |
| 50—60 cm | | 5,60 | 51,— | |
| 60—70 cm | | 7,50 | 67,50 | |
| **nigra austriaca** (A. et. Gr.), (P. laricio austriaca, Endl.), **Österreichische Schwarzkiefer** E, R | 40—60 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| **Windfester,** kräftig wachsender, besonders **rußfester Baum mit in der Jugend kandelaberförmiger Aststellung und üppig schwarzgrüner Benadelung,** der noch gut auf mageren und trockenen Böden gedeiht. | 60—80 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 108,— | |
| | 150—175 | 21,— | 165,— | |
| | 175—200 | 25,50 | | |
| | 200—225 | 37,50 | | |
| | 225—250 | 50,— | | |
| | 250—275 | 56,— | | |
| | 275—300 | 67,50 | | |
| | 300—350 | 82,— | | |
| | 350—400 | 94,— | | |
| | 400—450 | 120,— | | |
| **peuce** (Grieseb.), **Rumelische Kiefer** E, R | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| Balkan, im Wuchs zwischen P. cembra und strobus stehender Baum. **Er zeichnet sich durch Anspruchslosigkeit und Gesundheit aus** und wächst selbst noch sehr gut auf kalkarmen Böden, was bei P. cembra nicht der Fall ist. | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 108,— | |
| | 150—175 | 21,— | 165,— | |
| | 175—200 | 25,50 | 200,— | |
| | 200—225 | 30,— | | |
| | 225—250 | 36,— | | |
| **silvestris** (L.), **Gemeine Kiefer, Föhre** E | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| Dieser außerordentlich anspruchslose und **malerische** Baum liefert als schön gewachsener und mehrstämmiger Baum **eine sehr schöne Einzelkonifere.** Um ein sicheres Anwachsen zu garantieren, muß **sofort gepfählt werden.** | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 100—125 | 3,75 | | |
| | 125—150 | 4,75 | | |

*Pinus peuce*

Höhe 150/175 — Breite 50/60

*Pinus cembra*

Höhe 175/200 — Breite 60/70

*Picea omorica*

Höhe 275/300

*Taxus baccata*

breiter Busch

Höhe 175/200 — Breite 175/200

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Pinus silvestris** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **argentea compacta,** siehe P. silv. wateriana | | | | |
| „ **wateriana** (Hort.), (P. silv. argentea compacta, Ordn.) **E** | | | | |
| Der in der Jugend breitpyramidale Wuchs wird mit zunehmendem Alter breitkegelförmig. Die stahlblaue Benadelung hebt sich wunderschön von dem braunroten Stamm ab. **Eine sehr wertvolle und dekorative Einzelkonifere.** | 70—80 | 17,— | | |
| | 80—100 | 21,— | | |
| | 100—125 | 27,— | | |
| | 125—150 | 36,— | | |
| | 150—175 | 45,— | | |
| **strobus** (L.), **Weymouthskiefer** | | | | |
| Nordamerika, in der Jugend pyramidaler, im Alter breitkroniger, bis 40 m hoher Baum. Triebe anfangs grünlich, später violettbraun. Nadeln zu fünf, bis 14 cm lang, bläulichgrün. Die länglichen bis walzenförmigen Zapfen werden bis 20 cm lang. . . . . | 40—60 | 1,40 | 10,— | 90,— |
| **Pseudotsuga** - Douglasie - PINACEAE | | | | |
| **taxifolia viridis** (Brit.) **H, R** | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| Nordamerika. Dieser nicht ganz windfeste, **außerordentlich trockenheitsresistente,** schattenverträgliche Baum zeigt auf ausgesprochen hungrigen Böden überraschend gute Wuchsleistungen, während er in Lagen mit stagnierender Nässe versagt. | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 100—125 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 125—150 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 150—175 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 175—200 | 8,25 | | |
| | 200—225 | 10,50 | | |
| | 225—250 | 13,— | | |
| | 250—275 | 17,— | | |
| **Sciadopitys** - Schirmtanne - PINACEAE | | | | |
| **verticillata** (Sieb. et Zucc.), **Japanische Schirmtanne E** | | | | |
| Dieser in der Heimat bis 40 m hoch werdende, **schatten- und feuchtigkeitsliebende** Baum zeichnet sich durch einen aufrecht pyramidalen Wuchs und eine wunderschöne, schirmartig ausgebreitete Benadelung aus. Nadeln glänzend grün, 8—12 cm lang und bis 7 mm breit. | 40—50 | 9,— | | |
| | 80—100 | 19,— | | |
| | 100—125 | 22,50 | | |
| **Sequoia** - Mammutbaum - PINACEAE | | | | |
| **gigantea** (Lindl.), (Wellingtonia gigantea, Lindl.) **E** | | | | |
| Berühmter Riesenbaum Kaliforniens, der dort bis 100 m hoch wird. Wird bei uns in günstigen Lagen auch bis 30 m hoch und bildet herrliche, schmalpyramidal wachsende Bäume. Mit Topfballen | 20—30 | 9,— | 82,— | |
| | 30—40 | 11,50 | 100,— | |
| | 40—50 | 15,— | 135,— | |
| **Taxodium** (Rich.) - Sumpfzypresse - PINACEAE | | | | |
| **distichum** (Rich.) **E** | | | | |
| Nordamerika, in seiner Heimat zusammen mit Liquidambar und Nyssa, ein frostharter, selten schöner, bis 30 m hoher, kegelförmig wachsender, braunrot berindeter Baum mit waagerecht abstehenden, frischgrün belaubten Zweigen. **In feuchten Lagen ein seltenes Prunkstück für Garten und Park.** | 80—100 | 3,75 | 30,— | |
| | 100—125 | 6,— | 48,— | |
| | 125—150 | 7,50 | 60,— | |
| | 150—175 | 9,— | 72,— | |
| **Taxus** (L.) - Eibe - TAXACEAE | | | | |
| **baccata** (L.), **Heimische Eibe, meist zweihäusig E, R, S** | 30—40 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| Bis 20 m hohe, außerordentlich alt werdende Konifere mit breitwachsender bis rundlicher Krone. Da sie von allen Koniferen den meisten Schatten bzw. Druck verträgt und sich auch gut schneiden läßt, **bieten sich die vielseitigsten Verwendungsmöglichkeiten.** | 40—60 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 80—100 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | |
| | 125—150 | 10,50 | 82,50 | |
| **Breite Büsche,** natürlich gewachsen. Breite ca. 40—60 cm | 40—60 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| 40—60 cm | 60—80 | 4,50 | 36,— | 330,— |
| 60—80 cm | | 6,— | 48,— | 420,— |
| 80—100 cm | | 7,50 | 60,— | |
| 100—125 cm | | 10,— | 82,50 | |
| 40—60 cm | 80—100 | 5,60 | 45,— | 410,— |
| 60—80 cm | | 7,50 | 60,— | 540,— |
| 80—100 cm | | 10,— | 82,50 | 750,— |
| 100—125 cm | | 13,50 | 108,— | |
| 125—150 cm | | 18,— | | |
| 40—60 cm | 100—125 | 9,— | 72,— | |
| 60—80 cm | | 10,— | 82,50 | 750,— |
| 80—100 cm | | 13,50 | 108,— | 975,— |
| 100—125 cm | | 18,— | 145,— | |
| 60—80 cm | 125—150 | 13,50 | 108,— | |
| 80—100 cm | | 18,— | 145,— | |
| 100—125 cm | | 27,— | 220,— | |
| 125—150 cm | | 36,— | | |

| Taxus baccata (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Breite Büsche,** natürlich gewachsen. Breite ca. 100—125 cm | 150—175 | 36,— | | |
| 125—150 cm | | 41,— | | |
| 150—175 cm | | 48,— | | |
| 200—225 cm | | 68,— | | |
| 125—150 cm | 175—200 | 48,— | | |
| 150—175 cm | | 56,— | | |
| 175—200 cm | | 66,— | | |
| 150—175 cm | 200—225 | 66,— | | |
| 175—200 cm | | 75,— | | |
| 175—200 cm | 225—250 | 82,50 | | |
| 200—225 cm | | 90,— | | |
| 175—200 cm | 250—275 | 90,— | | |
| 225—250 cm | | 150,— | | |
| **Mehrmals verpflanzte Büsche,** aus weitem Stand, ohne Ballen | 20—30 | 1,15 | 10,— | 90,— |
| | 30—40 | 1,50 | 13,50 | 120,— |
| | 40—60 | 2,25 | 18,— | 165,— |
| „ **aureo variegata** (Beißn.) **E** | 60—80 | 6,20 | | |
| Benadelung schön goldbunt, die auch beständig bleibt. | 80—100 | 8,25 | | |
| | 100—125 | 11,50 | | |
| „ **dovastonii** (Laws.) **E** | | | | |
| Eine in England entstandene, sehr dekorative Wuchsform **mit weit abstehenden und leicht überhängenden Zweigen.** Der reiche Fruchtbehang hebt sich sehr gut von der dunkelgrünen Belaubung ab. **Wohl eine der schönsten Einzelkoniferen.** | 60—80 | 12,— | | |
| | 80—100 | 18,— | | |
| Liegende Pflanzen, ca. 40 cm hoch, Breite | 100—125 | 22,50 | | |
| Aufrecht wachsende Pflanzen, ca. 60—80 cm breit | 80—100 | 18,— | | |
| | 100—125 | 22,50 | | |
| | 125—150 | 28,— | | |
| „ „ **aurescens** **E** | 100—125 | 16,50 | | |
| Flachwachs. Form mit hellgelblicher Benadelung. | 125—150 | 22,50 | | |
| „ **erecta overeynderi** (Hort.) **E, H, R, S** | | | | |
| Bildet schöne, völlig winterharte, dicht aufrecht wachsende Pyramiden mit dunkelgrüner Benadelung. **Als Einzel- und Heckenpflanze hervorragend geeignet.** | 80—100 | 6,20 | 50,— | |
| | 100—125 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| | 125—150 | 13,50 | 108,— | 975,— |
| **Breite Pyramiden,** ca. 80—125 cm breit | 175—200 | 30,— | | |
| | 200—225 | 37,50 | | |
| | 225—250 | 50,— | | |
| **Freigewachsene Büsche,** ca. 60—80 cm breit | 80—100 | 7,50 | | |
| | 100—125 | 10,— | | |
| | 125—150 | 13,50 | | |
| | 150—175 | 18,— | | |
| „ **fastigiata** (Loud.), (T. bacc. hibernica, Hort.), **Irländischer Säulentaxus** **R, S** | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| Eine Säulenform mit zahlreichen, straff aufrechten, wenig verzweigten Ästen und tiefgrüner Benadelung. | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | | |
| | 125—150 | 13,50 | | |
| „ „ **aureo-marginata** (Fish.), (T. bacc. fastigiata aurea, Stand.) **R** | 60—80 | 6,75 | 60,— | |
| Eine wertvolle, gelbbunte Säulenform. | 80—100 | 9,— | 75,— | |
| „ **fastigiata aurea,** siehe T. bacc. fastigiata aureo-marginata | | | | |
| „ **hibernica,** siehe T. bacc. fastigiata | | | | |
| „ **repandens** (Par.), **Tafeleibe** **R, St** | | | | |
| Niedrige, fast niederliegende Form mit langen, weit ausgebreiteten Ästen und dunkler, bläulichgrüner Benadelung. Höhe ca. 20 cm, Breite | 40—50 | 6,90 | | |
| | 50—60 | 9,— | | |
| „ **semperaurea** (Dallimore) **E** | | | | |
| Eine breitbuschig bis aufrecht wachsende Art, die mit ihrer schönen und **beständigen goldgelben Färbung** als eine der wertvollsten Taxus dieser Art bezeichnet werden kann. Höhe oder Breite | 60—70 | 11,50 | | |
| | 70—80 | 16,50 | | |
| | 80—100 | 22,50 | | |
| „ **washingtonii** (Beiss.) **E, R** | 60—80 | 13,50 | | |
| Eine mehr breit als hoch wachsende Sorte mit leicht überhängenden, **im Sommer grüngelben und im Winter goldbronzefarbigen Zweigen.** Höhe 60—80 cm, Breite | 80—100 | 18,— | | |
| | 100—125 | 22,50 | | |
| | 125—150 | 28,— | | |
| Höhe 150—175 cm, Breite | 150—175 | 37,50 | | |
| **brevifolia,** siehe T. cuspidata nana | | | | |
| **cuspidata hicksii** (Rehd.) **E, R** | 30—40 | 3,75 | 30,— | |
| Schmale Säulenform. Wegen der hervorragenden Winterhärte ein willkommener Ersatz für T. baccata fastigiata. **Entwickelt im Alter besonders schöne Charakterformen.** | 40—60 | 4,75 | 37,50 | |
| | 60—80 | 6,20 | 50,— | |
| | 80—100 | 8,25 | 67,50 | |
| | 100—125 | 11,50 | 90,— | |
| | 125—150 | 13,50 | 108,— | |

| | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **Taxus cuspidata** (Fortsetzung) | | | | |
| „ **nana** (Rehd.), (T. brevifolia, Hort.) **E, R, St** | 40—50 | 6,90 | 52,50 | |
| Japan; diese **außerordentlich frostharte Sorte** gedeiht auf der Insel Hondo noch auf 2000 m hohen windumfegten Berggipfeln. Sie zeichnet sich durch eine eng- und kurznadelige Bezweigung aus und **behält, im Gegensatz zu T. baccata, ihre frischdunkelgrüne Benadelung auch in sonnigen Lagen.** Breite | 50—60 | 9,— | 71,— | |
| | 60—70 | 11,50 | 90,— | |
| | 70—80 | 16,50 | 135,— | |
| | 125—150 | 37,50 | | |
| | 150—175 | 49,— | | |
| | 175—200 | 60,— | | |
| | 200—225 | 75,— | | |
| **Thuja** (L.) - Lebensbaum - CUPRESSACEAE | | | | |
| **gigantea**, siehe Thuja plicata | | | | |
| **occidentalis** (L.) **H, R** | 40—60 | 0,85 | 6,75 | 60,— |
| Für Hecken und Schutzpflanzungen sehr geeignet, an Boden und Lage anspruchslos, wird 15—20 m hoch. | 60—80 | 1,25 | 10,— | 90,— |
| | 80—100 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 100—125 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 125—150 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 150—175 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 175—200 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 200—225 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| Mehrmals verpflanzt, ohne Ballen 1000 St. DM 195,— | 30—40 | 0,35 | 2,60 | 22,50 |
| 1000 St. DM 240,— | 40—60 | 0,40 | 3,— | 27,— |
| 1000 St. DM 285,— | 60—80 | 0,45 | 3,75 | 34,— |
| „ **atrovirens** (Hort.) **H** | | | | |
| Eine pyramidal wachsende, dunkelgrüne Form, welche sich auch im Winter nicht verfärbt. | | | | |
| **Solitär**, ca. 80—100 cm breit | 150—175 | 9,— | | |
| | 175—200 | 12,— | | |
| „ **aurea compacta** (Hort.) **H** | | | | |
| Eine kräftig pyramidal wachsende Form mit gesunder und frischer, goldgelber Benadelung. Eignet sich sehr gut für Dekorationsgrün. | 80—100 | 4,75 | 37,50 | |
| | 100—125 | 6,20 | 50,— | |
| | 125—150 | 8,25 | 67,50 | |
| „ **columna** (Späth) **H** | | | | |
| Eine schlank aufrechtwachsende Sämlingsform von Th. occidentalis fastigiata. | | | | |
| Größen und Preise wie Th. occ. fastigiata | | | | |
| „ **ellwangeriana gracilis** (Hort.) **H** | 40—60 | 0,85 | 6,75 | 60,— |
| Eine völlig unempfindliche und widerstandsfähige Form von Th. occ. ellwangeriana, die sich durch eine **feine und sehr graziöse Verzweigung** auszeichnet. Sehr geeignet für kleine Hecken. | 60—80 | 1,25 | 10,— | 90,— |
| | 80—100 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 100—125 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 125—150 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 150—175 | 4,75 | 37,50 | |
| | 175—200 | 6,20 | 50,— | |
| | 200—225 | 8,25 | 67,50 | |
| „ „ **Rheingold** (Vollert) **St** | | | | |
| Eine der schönsten, langsamwachsenden, bis 2 m hohen Zwergformen mit feiner, moosartiger, goldgelber Bezweigung. | 20—30 | 2,40 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| „ **fastigiata** (Hort.) **H** | 40—60 | 1,40 | 10,— | 90,— |
| Diese Varietät bildet ohne Schnitt dichtverzweigte Säulen mit hellgrüner Färbung, die auch im Winter konstant bleibt. | 60—80 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 80—100 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 100—125 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 125—150 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 150—175 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 175—200 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| | 200—225 | 10,50 | 82,50 | 750,— |
| | 225—250 | 13,— | 100,— | |
| „ **globosa compacta** (Beißn.) **St** | 30—40 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| Bildet ohne Schnitt regelmäßige Kugeln, die nicht auseinanderfallen; Belaubung dunkelgrün. | 40—60 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 60—80 | 3,75 | 30,— | |
| „ **pyramidalis** (Hort.) **H** | | | | |
| Bildet dichtverzweigte Pyramiden mit langgezogener Spitze und dunkelgrüner Belaubung. Setzt keine oder nur verkümmerte Früchte an. | | | | |
| **Solitär**, 80—100 cm breit | 175—200 | 11,50 | | |
| | 200—225 | 15,— | | |
| | 225—250 | 19,— | | |
| „ **recurva nana** (Hort.) **R, St** | | | | |
| Eine schwachwachsende, **gekräuselte** und dichtverzweigte, breite Zwergform. | 20—30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| | 30—40 | 3,40 | 27,— | 240,— |
| „ **spiralis** (Hort.) **R** | 60—80 | 1,70 | 13,50 | |
| Bildet **sehr schöne, spiralenförmige, kerzenförmige, schmale Säulen**, die sich durch eine besonders dunkelgrüne Bezweigung auszeichnen. **Hübsche Einzelpflanze!** | 80—100 | 2,40 | 19,— | |
| | 100—125 | 3,— | 24,— | |
| | 125—150 | 3,75 | 30,— | |
| | 150—175 | 6,20 | 50,— | |
| | 175—200 | 8,25 | 67,50 | |

| Thuja occidentalis spiralis (Fortsetzung) | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| Solitär, ca. 80 cm breit | 200—225 | 15,— | | |
| | 225—250 | 19,— | | |
| | 250—275 | 22,50 | | |
| | 275—300 | 30,— | | |
| **plicata aurescens** (Hort.), (Th. gigantea aurescens, Hort.) **H** | 40—60 | 1,40 | 10,— | 90,— |
| Eine völlig winterharte, kräftig wachsende Sorte mit grüngelben Spitzen. | 60—80 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 80—100 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 100—125 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 125—150 | 3,75 | 30,— | 270,— |
| | 150—175 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| | 175—200 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| | 200—225 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| Besonders breite und schöne Pflanzen | | | | |
| Breite ca. 50—60 cm | 150—175 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| 60—70 cm | 175—200 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| 70—80 cm | 200—225 | 10,50 | 82,50 | 750,— |
| 70—80 cm | 225—250 | 13,— | 100,— | |
| 80—125 cm | 300—350 | 30,— | | |
| „ **dura** (Timm & Co.), **Neuheit 1948!** **E, H** | | | | |
| Eine von uns gezogene, außerordentlich winterharte Varietät, die wir bei uns fast 40 Jahre lang erprobt haben. Neben ihrer Winterhärte zeichnet sie sich durch einen sehr dekorativen, breit pyramidalen Wuchs und auffallend plattgedrückte, **glänzendgrüne Benadelung** aus. Auf Grund ihres gleichmäßig dichten Wuchses eignet sie sich bestens für Kübelpflanzen. Außerdem hat sie die Eigenschaft, auch im Winter nicht ihre frischgrüne Farbe zu verlieren und niemals von unten kahl zu werden. Eine hervorragende Solitärkonifere. | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| Solitär, ca. 80—125 cm breit | 225—250 | 19,— | 150,— | |
| | 250—275 | 22,50 | 180,— | |
| | 275—300 | 30,— | 240,— | |
| | 300—350 | 37,50 | | |
| | 350—400 | 45,— | | |
| „ **excelsa** (Timm & Co.), **Neuheit 1947!** **E, H** | | | | |
| Sie ist in allen Teilen Deutschlands winterhart und hat den Polarwinter 1939/40 ohne den geringsten Schaden überstanden. Sie bildet in kurzer Zeit schlank aufrecht wachsende, von unten gleichmäßig garnierte und nie verkahlende Säulen, **die auch im Winter nicht ihre frische, dunkelgrüne Farbe verlieren.** Unter anderem läßt sie sich gut als Kübelpflanze verwenden und **liefert, wie keine andere Konifere, wundervoll gleichmäßig wachsende, gesunde, grüne Schutzwände.** | 40—60 | 1,70 | 13,50 | 120,— |
| | 60—80 | 2,40 | 19,— | 165,— |
| | 80—100 | 3,— | 24,— | 210,— |
| | 100—125 | 3,75 | 30,— | |
| | 125—150 | 4,75 | 37,50 | |
| | 150—175 | 6,20 | 50,— | |
| | 175—200 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| | 200—225 | 10,50 | 82,50 | 750,— |
| | 225—250 | 13,— | 100,— | 900,— |
| | 250—275 | 17,— | 135,— | 1200,— |
| | 275—300 | 21,— | 165,— | |
| Besonders breite und schöne Pflanzen, 70—80 cm breit | 200—225 | 13,— | 100,— | 900,— |
| | 225—250 | 17,— | 135,— | 1200,— |
| | 250—275 | 21,— | 165,— | 1500,— |
| 80—100 cm breit | 275—300 | 30,— | 250,— | |
| 100—125 cm breit | 300—350 | 45,— | 360,— | |
| **standishii** (Carr.) **E** | | | | |
| Eine aus Japan stammende, sehr hübsche Art, die sich durch ihren **lockeren, leicht überhängenden und malerischen Wuchs und ihre frischgrüne, interessante Bezweigung auszeichnet.** Kann sehr als Einzelbaum empfohlen werden. | 175—200 | 13,— | | |
| | 200—225 | 17,— | | |
| | 225—250 | 21,— | | |

## Thujopsis - Hibalebensbaum - CUPRESSACEAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **dolabrata** (Sieb. et Zucc.) **E** | | | | |
| Japan, dieser feuchtigkeitsliebende Baum bildet regelmäßige, besonders im Alter **sehr schöne, breite und wirkungsvolle Pyramiden,** während er in der Jugend mehr kugelig wächst. Zeichnet sich durch eine schuppige, glänzend hellgrüne Bezweigung aus und ist sehr schattenverträglich. | 60—80 | 4,75 | | |
| | 80—100 | 6,20 | | |

| Tsuga (Carr.) - Hemlockstanne - PINACEAE | Höhe ca. cm | 1 St. DM | 10 St. DM | 100 St. DM |
|---|---|---|---|---|
| **canadensis** (Carr.) **E, H, S** | 40—60 | 4,75 | 37,50 | 340,— |
| Nordamerika, bis 20 m hoher, breitkroniger Baum mit | 60—80 | 6,20 | 50,— | 450,— |
| leicht überhängenden Zweigen und feiner Belaubung. | 80—100 | 8,25 | 67,50 | 600,— |
| **Bevorzugt windgeschützte, feuchte und leicht schattige** | 100—125 | 11,50 | 90,— | 810,— |
| **Lagen und ist auf Grund seines malerischen Wuchses** | 125—150 | 13,50 | 108,— | 975,— |
| **eine gern gepflanzte Einzelkonifere.** | 150—175 | 21,— | 165,— | |
| | 175—200 | 25,50 | | |
| Solitär, besonders breit und schön gewachsen | | | | |
| ca. 150—175 cm breit | 150—175 | 32,— | | |
| ca. 150—200 cm breit | 175—200 | 36,— | | |
| ca. 200—225 cm breit | 200—225 | 41,— | | |
| | 225—250 | 49,— | | |
| | 250—275 | 56,— | | |
| | 275—300 | 64,— | | |

# Koniferen - Schnittgrün

| | 50 kg DM |
|---|---|
| **Chamaecyparis** | |
| **pisifera plumosa** | 30,— |
| **„ „ aurea** | 45,— |
| **„ squarrosa** | 65,— |
| **Picea** | |
| **pungens glauca kosteri** | 90,— |
| **Thuja** | |
| **occidentalis** | 15,— |

# Jungpflanzen zur Weiterkultur

Für die mit einem F bezeichneten Forstpflanzen gelten die Preise und Lieferungsbedingungen für Forstpflanzen.

**ZUR GEFL. BEACHTUNG!**

Sind bei einer Bestellung Pflanzen in den gewünschten Jahrgängen vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, von anderen Jahrgängen gegeben. Für die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die aus Samen nicht echt fallen, wird soweit irgend möglich, garantiert. Die Höhenmaße sind ungefähr angegeben, kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht ausgeschlossen.

**Bei Abnahme unter 100 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis um 0,05 DM je Stück. Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.**

Die angewandten Abkürzungen und Zeichen bedeuten: Abl. — Ableger, Abr. — Abrisse, Ausl. — Ausläufer, bew. — bewurzelt, j. — jährig, S. — Sämling, St. — Steckling, v. — verpflanzt, Vg. Veredlung, HV. — Handveredlung.

## I. Beeren- und Schalenobst

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Brombeeren** | | | | | |
| in den Sorten: **laciniata und Theodor Reimers** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 11,50 | 100,— |
| **Johannisbeeren** | | | | | |
| Rotfrüchtige: **Erstling aus Vierlanden, Heros, Rote Holländische** | | | | | |
| Schwarzfrüchtige: **Goliath, Rosenthals Langtraubige** | | | | | |
| Weißfrüchtige: **Weiße aus Jüterbog, Weiße Versailler** | | | | | |
| | 1j. bew. St. (außer Heros) | 0/1/0 | | 9,— | 75,— |
| | 1j. bew. St. Heros | 0/1/0 | | 11,50 | 100,— |
| **Haselnüsse** (Corylus), in großfrüchtigen Sorten | | | | | |
| **Cosford, Englische Riesen, Hallesche Riesennuß, Holsteiner Lambertnuß, Lange Landsberger, Webbs Preisnuß, Wunder von Bollweiler** | | | | | |
| | 2j. bew. Abl. | —2/0 | 50—70 | 45,— | |

## II. Schling- und Kletterpflanzen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Campsis,** Trompetenblume | | | | | |
| radicans | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 9,— | 78,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 12,— | 108,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 22,50 | |
| | 2j. v. S. m. Topfb. | 1/1 | 25—50 | 37,50 | |

**Preise nur für Wiederverkäufer!**

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Celastrus,** Baumwürger | | | | | |
| **orbiculata** | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 7,20 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 10,— | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 12,— | 108,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 13,— | 120,— |
| **scandens** | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 12,— | 108,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 13,— | 120,— |
| **Clematis,** Waldrebe | | | | | |
| **alpina** | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | 10—20 | 30,— | |
| | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | 20—40 | 45,— | |
| **montana** | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 19,— | |
| **vitalba** | 1j. S. | 1/0 | 30—60 | 3,40 | 22,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 60—100 | 5,25 | 41,— |
| Veredlungsware, siehe unter Veredlungsunterlagen. | | | | | |
| **viticella** | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 14,— | 120,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—60 | 16,50 | 150,— |
| **Parthenocissus** (Ampelopsis), Wilder Wein | | | | | |
| **quinquefolia** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—60 | 9,40 | 75,— |
| „ **engelmannii** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—60 | 12,60 | 105,— |
| **Periploca,** Baumschlinge | | | | | |
| **graeca** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 13,50 | |
| | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | 15—30 | 26,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 26,— | |

# III. Laubgehölze

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acer,** Ahorn | | | | | |
| **campestre, Feldahorn** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 3,40 | 22,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 6,75 | 56,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 12,40 | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 16,50 | 150,— |
| | 4j. 2 × verpfl. buschig | | 80—100 | 34,— | 300,— |
| | 4j. 2 × verpfl. buschig | | 100—125 | 41,— | 375,— |
| **dasycarpum,** siehe A. saccharinum | | | | | |
| **davidii** | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 12,50 | |
| **ginnala** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,90 | 37,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,75 | 56,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 13,50 | 124,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 17,— | 150,— |
| **negundo, Eschenahorn** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 3,— | 18,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 3,40 | 22,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 60—100 | 4,90 | 37,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 4,90 | 37,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 6,75 | 56,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 7,90 | 67,50 |
| **platanoides, Spitzahorn** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 10—20 | 1,70 | 13,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 20—40 | 2,40 | 19,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F 40—60 | 4,10 | 30,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 40—65 | 6,80 | 54,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 65—100 | 10,— | 78,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 100—140 | 14,50 | 116,— |
| **pseudoplatanus, Bergahorn** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 10—20 | 1,70 | 13,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 20—40 | 2,25 | 18,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F 40—60 | 3,40 | 27,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 40—65 | 6,80 | 54,— |
| | 3j v. S. | 1/2 | F 65—100 | 10,— | 78,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 100—140 | 14,50 | 116,— |
| **saccharinum** (dasycarpum), **Silberahorn** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 6,75 | 56,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 10,50 | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 12,— | 116,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 15,— | 135,— |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aesculus,** Kastanie | | | | | |
| **hippocastanum, Roßkastanie** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 4,10 | 30,— |
| | 2j. S. | 2/0 | 20—40 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. S. | 2/0 | 40—60 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. S. | 2/0 | 60—80 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 oder 2/1 | 20—40 | 7,10 | 60,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 40—65 | 10,— | 90,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 65—100 | 16,50 | 150,— |
| **Ailantus,** Götterbaum | | | | | |
| **altissima** (glandulosa) | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 3,75 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 5,25 | 41,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 50—80 | 8,25 | 71,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 80—120 | 11,25 | 100,— |
| **Alnus,** Erle | | | | | |
| **glutinosa, Schwarzerle** (nur aus anerkannter Saat) | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 7—15 | 1,50 | 7,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 15—25 | 1,70 | 13,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 25—50 | 2,80 | 22,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 40—65 | 5,80 | 46,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 65—100 | 8,— | 64,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 100—140 | 9,20 | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 140—180 | 12,20 | 97,50 |
| **incana, Weißerle, aus anerkannter** Saat + 10 % Aufschlag | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 7—15 | 1,90 | 10,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 15—25 | 2,25 | 18,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F 25—50 | 3,40 | 26,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 40—65 | 5,40 | 43,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 65—100 | 7,20 | 64,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 100—140 | 8,50 | 67,50 |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 140—180 | 9,40 | 75,— |
| **viridis, Grünerle** | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | 20—40 | 3,40 | 25,— |
| | 2j. S. | 2/0 | 40—60 | 5,25 | 41,— |
| **Amelanchier,** Felsenbirne | | | | | |
| **canadensis** (Med.) | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 8—15 | 11,25 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 13,50 | 120,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 15,— | |
| **ovalis** | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 6,75 | 56,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—25 | 9,— | 81,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 8—15 | 11,25 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 13,50 | 120,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 15,— | 135,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 19,— | 170,— |
| **Amorpha,** Bastardindigo | | | | | |
| **canescens** | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | | 30,— | |
| **fruticosa** | 1j. S. | 1/0 | 25—50 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. kr. pik. S. | 1x0 | 15—25 | 7,50 | 64,— |
| **Andromeda,** Lavendelheide | | | | | |
| **japonica** | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—18 | 45,— | |
| | 4j. v. St. | 0/1/3 | 18—25 | 60,— | |
| **Azalea,** Azalee | | | | | |
| **mollis** | 4j. v. S. | 2/2 | 15—25 | 30,— | 270,— |
| **pontica** | 2j. S. | 2/0 | 10—15 | 9,75 | 82,50 |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 25—40 | 30,— | 270,— |
| **Japanische Azaleen** | | | | | |
| **Alice, arendsii** (rosa-lila), **Beethoven, Favorite, Hatsugiri, New Red,** obt. **amoenum, White Lady** | | | | | |
| | 3j. v. St. buschig | 0/1/2 | 12—20 | 75.— | |
| **Berberis,** Berberitze, Sauerdorn | | | | | |
| **buxifolia nana** (dulcis nana) | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—12 | 9,40 | 82,50 |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—18 | 15,— | 135,— |
| **candidula** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—12 | 45,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—20 | 60,— | |
| | 3j. v. St. m. Topfb. | 0/1/2 | 12—20 | 75,— | |

| Berberis (Fortsetzung) | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| gagnepainii | 2j. v. S. | 1/1 | 10—15 | 34,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 15—30 | 45,— | |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 25—40 | 60,— | |
| „ hybrida | 2j. v. S. | 1/1 | 10—15 | 34,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 15—25 | 45,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—25 | 60,— | |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 25—40 | 60,— | |
| hookeri | 2j. v. S. | 1/1 | 12—18 | 45,— | 405,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 18—25 | 60,— | |
| stenophylla | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 15—25 | 105,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 25—40 | 112,— | |
| „ Hybride | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 12—20 | 45,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 20—30 | 60,— | |
| thunbergii | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 5,25 | 41,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 10,50 | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | 30—40 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | 40—60 | 33,— | 300,— |
| „ atropurpurea | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 5,25 | 41,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 10,50 | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | 30—40 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | 40—60 | 33,— | 300,— |
| verruculosa | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—12 | 45,— | |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 8—12 | 60,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—20 | 60,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 12—20 | 75,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 20—30 | 120,— | |
| vulgaris atropurpurea | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,25 | 41,— |
| wilsoniae subcaulialata | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 7—15 | 9,— | 75,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—25 | 13,50 | 124,— |

## Betula, Birke

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| albosinensis septentrionalis | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 45,— | |
| papyrifera | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 26,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 34,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 45,— | |
| pubescens, Moorbirke | | | | | |
| Größen und Preise wie Betula verrucosa | | | | | |
| verrucosa (pendula), Sandbirke, aus anerkannter Saat + 10 % Aufschlag | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 7—15 | 2,— | 11,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 15—25 | 2,25 | 15,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F 25—50 | 2,60 | 20,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 40—65 | 6,40 | 52,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 65—100 | 9,— | 72,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 100—140 | 11,20 | 90,— |

## Buddleia, Fliederspeer, Schmetterlingsbusch

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| davidii | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 4,90 | 37,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 6,75 | 56,— |
| | 1j. kr. pik. | 1x0 | 30—50 | 10,50 | 94,— |
| | 1j. kr. pik. | 1x0 | 50—80 | 12,75 | 116,— |

| | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buxus**, Buchsbaum | | | | | | |
| **sempervirens arborescens** | | | | | | |
| | 2j. St. | 0/2/0 | | | 7,10 | 60,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 10—15 | 10,— | 90,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 15—25 | 15,— | 135,— |
| **bis unten voll garnierte, geschnittene, buschige Heckenware** | | | | | | |
| | 5j. v. St. | | | 15—20 | 22,50 | 200,— |
| **Kugeln zur Weiterkultur** | | | mit Ballen | 20—25 | 75,— | |
| | | | | 25—30 | 98,— | |
| | | | | 30—40 | 120,— | |
| **Pyramiden zur Weiterkultur** | | | mit Ballen | 40—60 | 100,— | |
| | | | | 60—80 | 150,— | |
| **Calluna**, Besenheide | | | | | | |
| **vulgaris** | | 8—12 cm ø m. Ballen | | | 11,50 | 100,— |
| „ in Sorten: **alba**, weiß; **alportii** dunkelrot | 2j. v. St. | 0/1/1 | | | 15,— | 135,— |
| **Calycanthus**, Gewürzstrauch, Kelchblume | | | | | | |
| **floridus** | 3j. v. S. | 1/2 | | 30—50 | 60,— | |
| **Caragana**, Erbsenstrauch | | | | | | |
| **arborescens** | 1j. S. | 1/0 | | 10—20 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 20—40 | 6,— | 49,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 40—60 | 7,50 | 56,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 40—65 | 7,50 | 56,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 65—100 | 10,— | 90,— |
| **Carpinus**, Hainbuche, Weißbuche, aus anerk. Saat + 10 % Aufschlag | | | | | | |
| **betulus** | 1j. S. | 1/0 | | F 5—10 | 2,50 | 17,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | F 10—20 | 2,50 | 20,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | F 20—40 | 3,75 | 30,— |
| | 2j. S. | 2/0 | | F 20—40 | 4,50 | 33,— |
| | 2j. S. | 2/0 | | F 40—60 | 7,— | 55,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | F 20—40 | 5,75 | 45,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | F 40—65 | 11,25 | 90,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | F 65—100 | 15,50 | 125,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | F 100—140 | 22,50 | 180,— |
| **für Hecken gezogene, buschige Ware aus weiterem Stand** | | | | | | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 40—60 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 60—80 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 80—100 | 30,— | 270,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 100—125 | 41,— | 375,— |
| „ **pyramidalis** | | | | | | |
| | 2j. Vg. | x/2/0 | | 50—80 | 150,— | |
| **Castanea**, Eßbare Kastanie | | | | | | |
| **sativa (vesca)** | 1j. S. | 1/0 | | 10—20 | 16,50 | |
| | 1j. S. | 1/0 | | 20—40 | 19,— | |
| **Catalpa**, Trompetenbaum | | | | | | |
| **bignonioides** | 1j. S. | 1/0 | | 20—40 | 7,50 | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 40—65 | 15,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 65—100 | 19,— | |
| **Cercidiphyllum**, Judasbaumblatt | | | | | | |
| **japonicum** | 1j. S. | 1/0 | | 8—15 | 6,75 | 60,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 8,25 | 75,— |
| | 1j. kr. pik. S. | 1x0 | | 8—15 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 30—50 | 15,— | 135,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 50—80 | 22,50 | 200,— |
| **Cercis**, Judasbaum | | | | | | |
| **siliquastrum** | 1j. S. | 1/0 | | | 8,60 | 75,— |
| **Chaenomeles**, Scheinquitte | | | | | | |
| **japonica (C. jap. Maulei)** | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 30—50 | 4,90 | 37,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 25—50 | 10,50 | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 40—70 | 12,50 | 112,— |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaenomeles (Fortsetzung) | | | | | |
| lagenaria (Cydonia japonica) | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 4,90 | 37,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 10,50 | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 40—70 | 12,50 | 112,— |
| „ atrosanguinea | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,75 | 56,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 13,50 | 120,— |
| Sämlinge v. Andenken an Karl Ramcke | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,75 | 56,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 13,50 | 120,— |
| | 3j. v. S., 5—8 Triebe | 1/2 | 40—60 | 25,— | 225,— |
| **Cladrastis,** Gelbholz | | | | | |
| lutea | 3j. v. S. | 1/2 | 20—25 | 30,— | |
| **Colutea,** Blasenstrauch | | | | | |
| arborescens | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,40 | 52,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 7,90 | 67,50 |
| **Cornus,** Hartriegel | | | | | |
| alba | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 6,— | 49,— |
| | 2j. v. S. od. 1j. bew. St. | 1/1 oder 0/1/0 | 40—65 | 7,50 | 64,— |
| | 3j. v. S. od. 1j. bew. St. | 1/2 oder 0/1/0 | 65—100 | 9,40 | 82,50 |
| „ elegans | 2j. v. St. | 0/1/1 | 25—50 | 26,— | |
| „ flaviramea | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—60 | 15,— | 135,— |
| „ spaethii | 2j. v. St. | 0/1/1 | 25—50 | 26,— | |
| mas, Kornelkirsche | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 13,50 | 120,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 16,50 | 150,— |
| sanguinea | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 13,50 | 120,— |
| **Corylus,** Haselnuß | | | | | |
| avellana | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 20,— | 188,— |
| **Cotinus,** Perückenstrauch | | | | | |
| coggygria | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 11,50 | 100,— |
| **Cotoneaster,** Felsenmispel | | | | | |
| acutifolia | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 13,50 | 120,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 19,— | 170,— |
| adpressa | 2j. v. St. | 0/1/1 | 6—10 | 30,— | 270,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 10—15 | 41,— | 375,— |
| | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | 15—20 | 49,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 15—20 | 64,— | |
| bullata | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 10,— | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 12,50 | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 19,— | 173,— |
| dammeri (humifusa) | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—15 | 34,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—20 | 45,— | |
| „ radicans | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—15 | 34,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—20 | 45,— | |
| dielsiana (applanata) | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 10,— | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 12,50 | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 19,— | 173,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem Stand, 5—8 Triebe | | 30—40 | 20,— | 188,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem Stand, 5—8 Triebe | | 40—60 | 25,— | 225,— |
| | 4j. 2 × verpfl., buschig | | 60—100 | 30,— | 270,— |

| Cotoneaster (Fortsetzung) | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **divaricata** | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 10,— | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 12,50 | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 19,— | 173,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | 30—40 | 20,— | 188,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | 40—60 | 25,— | 225,— |
| **franchetii** | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 15,— | 135,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 21,— | 195,— |
| **horizontalis** | 1j. S. | 1/0 | | 5,60 | 45,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 10—15 | 8,60 | 75,— |
| | 2j. v. S. m. Topfb. | 1/1 | 10—15 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 15—20 | 12,50 | 112,— |
| | 3j. v. S. m. Topfb. | 1/2 | 15—20 | 29,— | 262,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 20—30 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. m. Topfb. | 1/2 | 20—30 | 33,— | 300,— |
| **microphylla schneideri** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 6—10 | 30,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 10—15 | 41,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—20 | 49,— | |
| **praecox** | 2j. v. S. | 1/1 | 10—15 | 8,60 | 75,— |
| | 2j. v. S. m. Topfb. | 1/1 | 10—15 | 26,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—20 | 12,50 | 112,— |
| | 2j. v. S. m. Topfb. | 1/1 | 15—20 | 30,— | |
| **„ hessei** | 3j. v. St. | 0/1/2 | 10—15 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. St. m. Topfb. | 0/1/2 | 10—15 | 26,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—20 | 13,50 | 120,— |
| | 3j. v. St. m. Topfb. | 0/1/2 | 15—20 | 30,— | |
| **rotundifolia** | 3j. v. S. | 1/2 | 20—30 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. m. Topfb. | 1/2 | 20—30 | 33,— | 300,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—40 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. S. m. Topfb. | 1/2 | 30—40 | 45,— | |
| **salicifolia floccosa** | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 8—15 | 10,— | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 19,— | 170,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 26,— | |
| **„ pendula** | 3j. v. St. m. Topfb. | 0/1/2 | 30—50 | 75,— | |
| **simonsii** | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 12,50 | 112,— |
| **tomentosa** | 3j. v. S. | 1/2 | 15—30 | 15,— | 135,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 30—50 | 22,50 | 200,— |
| **vulgaris** | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 22,50 | 200,— |
| **Crataegus,** Dorn | | | | | |
| **coccinea** | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 17,— | 150,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 50—80 | 25,— | 225,— |
| **monogyna, Weißdorn** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 2,40 | 12,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—60 | 3,— | 19,— |
| | 2j. S. 4—6 mm ø | 2/0 | 40—60 | 4,10 | 30,— |
| | 2j. S. 6—9 mm ø | 2/0 | 50—90 | 5,25 | 41,— |
| | 2j. v. S. 4—6 mm ø | 1/1 | 40—60 | 5,25 | 41,— |
| | 3j. v. S. 6—9 mm ø | 1/2 | 60—90 | 7,10 | 60,— |
| | 4j. v. S. 9—12 mm ø | 1/3 oder 2/2 | 60—100 | 9,40 | 82,50 |
| Veredlungsware, siehe unter Veredlungsunterlagen. | | | | | |
| **für Hecken gezogene, buschige Ware aus weiterem Stand** | | | | | |
| | 4j. 2 × verpfl. | | 40—60 | 16,50 | 150,— |
| | 4j. 2 × verpfl. | | 60—80 | 25,— | 225,— |
| | 4j. 2 × verpfl. | | 80—100 | 30,— | 270,— |
| **Cydonia,** siehe Chaenomeles | | | | | |
| **Cytisus,** Geißklee, Ginster | | | | | |
| **praecox,** Elfenbeinginster | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—30 | 22,50 | |
| **scoparius, Besenginster** | | | | | |
| | 1j. v. S., mehrtriebig, mit Topfballen | 1x0 | 20—40 | 37,50 | 340,— |
| **Daphne,** Seidelbast | | | | | |
| **mezereum rubrum** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/1 | | 19,— | |

| | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Decaisnea,** Blauschote | | | | | | |
| fargesii | 2j. v. S. | 1/1 | | 25—50 | 34,— | |
| **Deutzia,** Deutzie | | | | | | |
| gracilis, Maiblumenstrauch | | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 10—15 | 12,40 | 112,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 20—40 | 19,— | 165,— |
| magnifica eburnea | | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| scabra rosea plena | | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| **Diervilla,** siehe Weigela | | | | | | |
| **Elaeagnus,** Ölweide | | | | | | |
| angustifolia | 1j. S. | 1/0 | | 25—50 | 7,50 | 64,— |
| **Escallonia** | | | | | | |
| Donard Seedling | | | | | | |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | | 20—40 | 49,— | |
| **Erica,** Heide | | | | | | |
| carnea in Sorten: alba, atrorubra, rubra, vivellii, Winter Beauty | | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | | | 13,— | 120,— |
| **Evonymus,** Spindelbaum, Pfaffenhütchen | | | | | | |
| alata | 4j. 2 × verpfl. S. | 1/1/2 | | 20—40 | 34,— | |
| | 4j. 2 × verpfl. S. | 1/1/2 | | 40—60 | 45,— | |
| europaea | 1j. S. | 1/0 | | 7—15 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 30—60 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 15—30 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 30—50 | 15,— | 135,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 50—80 | 19,— | 170,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | | 40—60 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | | 60—80 | 27,— | 250,— |
| | 3j. v. S. aus halbweitem | Stand, 5—8 Triebe | | 80—100 | 34,— | 300,— |
| radicans | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 8—15 | 10,— | 90,— |
| „ argenteo-variegata | | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 8—15 | 12,50 | 112,— |
| „ vegeta | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 10—20 | 16,50 | 150,— |
| **Fagus,** Buche | | | | | | |
| silvatica, Rotbuche, aus anerk. Saat + 10 % Aufschlag | | | | | | |
| | 2j. S. | 1/1 | F | 15—30 | 4,75 | 37,50 |
| | 2j. S. | 1/1 | F | 20—40 | 7,10 | 56,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—50 | 9,20 | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 13,50 | 108,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 80—100 | 23,75 | 190,— |
| „ atropurpurea macrophylla | | | | | | |
| | 2j. v. Vg. | x/1/1 | | 30—50 | 135,— | |
| | 2j. v. Vg. | x/1/1 | | 50—80 | 165,— | |
| „ purpurea | 3j. v. S. | 1/2 | | 50—80 | 36,— | |
| **Forsythia,** Goldglöckchen | | | | | | |
| intermedia | 1j. bew. St. od. 2j. v. St. | 0/1/0 oder 0 1/1 | | 20—40 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. od. 3j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/2 | | 40—70 | 15,— | 135,— |
| „ spectabilis | 1j. bew. St. od. 2j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/1 | | 20—40 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. od. 3j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/2 | | 40—70 | 15,— | 135,— |
| „ vitellina | 1j. bew. St. od. 2j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/1 | | 20—40 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. od. 3j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/2 | | 40—70 | 15,— | 135,— |
| **Fraxinus,** Esche | | | | | | |
| excelsior, aus anerkann. Saat + 10 % Aufschlag | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 10—20 | 1,70 | 13,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 20—40 | 2,25 | 18,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 40—65 | 6,20 | 49,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 65—100 | 9,40 | 73,50 |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 100—140 | 15,— | 120,— |
| pennsylvanica, Rotesche | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | | 10—20 | 1,70 | 13,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | | 20—40 | 2,25 | 18,— |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Genista,** Ginster | | | | | |
| **tinctoria, Färberginster** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 25—50 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 12,50 | 112,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 15,— | 135,— |
| **Gleditsia,** Christusdorn | | | | | |
| **triacanthos** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 6,— | |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 7,50 | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 13,50 | |
| **Gymnocladus,** Geweihbaum | | | | | |
| **dioicus** (canadensis) | | | | | |
| | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | 8—12 | 50,— | |
| **Hedera,** Efeu | | | | | |
| **helix minima** | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 8—12 | 18,— | |
| **Hippophae,** Sanddorn | | | | | |
| **rhamnoides** | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 11,50 | 100,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 20,— | 180,— |
| **Holodiscus,** Scheinspiere | | | | | |
| **discolor ariaefolius** | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 13,50 | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 50—80 | 19,— | |
| **Hydrangea,** Hortensie | | | | | |
| **arborescens grandiflora** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—30 | 13,— | 120,— |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 30—50 | 20,— | |
| **serrata Blue Bird** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 20—40 | 27,— | |
| **Hypericum,** Johanniskraut, Hartheu | | | | | |
| **calycinum** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 25,— | |
| **patulum henryi** | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 13,50 | |
| **Ilex,** Hülse, Stechpalme | | | | | |
| **aquifolium** | 2j. S. | 2/0 | 7—15 | 11,50 | 100,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 12—30 | 30,— | |
| **„ longifolia pyramidalis** | | | | | |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 10—15 | 37,50 | |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 15—20 | 52,50 | |
| **Juglans.** Walnuß | | | | | |
| **nigra** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 12,50 | 112,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 15,— | 135,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 19,— | 170,— |
| **regia** | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 17,50 | 160,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 22,— | 200,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 30,— | 270,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 30,— | 270,— |
| | 2—3j. v. S. | 1/1 — 1/2 | 40—60 | 36,— | 330,— |
| | 2—3j. v. S. | 1/1 — 1/2 | 60—80 | 44,— | 400,— |
| **sieboldiana cordiformis** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 15,— | |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 19,— | |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 26,— | |
| **Kalmia,** Berglorbeer | | | | | |
| **latifolia** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—15 | 37,50 | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—20 | 60,— | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 20—30 | 75,— | |
| **Koelreuteria,** Blasenbaum | | | | | |
| **paniculata** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 9,40 | 82,50 |
| **Laburnum,** Goldregen | | | | | |
| **alpinum** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 7,50 | 56,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 10,— | 94,50 |

| Laburnum (Fortsetzung) | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| vulgare | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,90 | 37,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—60 | 6,40 | 52,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 60—100 | 8,60 | 75,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 10,— | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 12,50 | 112,— |
| **Ligustrum**, Liguster, Rainweide | | | | | |
| lodense | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 10—25 | 6,— | 49,— |
| | 2j. bew. St. | 0/2/0 | 20—40 | 10,— | 90,— |
| ovalifolium | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 15—30 | 3,40 | 25,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—50 | 4,10 | 33,— |
| | 2j. bew. St. 2—4 Triebe | 0/2/0 | 30—50 | 5,60 | 50,— |
| | 2j. bew. St. 2—4 Triebe | 0/2/0 | 50—80 | 7,90 | 67,50 |
| vulgare | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 15—30 | 3,40 | 25,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—50 | 4,10 | 33,— |
| | 2j. bew. St. 2—4 Triebe | 0/2/0 | 30—50 | 5,60 | 50,— |
| | 2j. bew. St. 2—4 Triebe | 0/2/0 | 50—80 | 7,90 | 67,50 |
| „ atrovirens | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 10—20 | 4,50 | 33,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 20—40 | 6,40 | 54,— |
| | 2j. bew. St. 2—4 Triebe | 0/2/0 | 30—50 | 7,90 | 67,50 |
| | 2j. bew. St. 2—4 Triebe | 0/2/0 | 50—80 | 10,— | 90,— |
| **Liquidambar**, Amberbaum | | | | | |
| stryraciflua | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 19,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 34,— | |
| **Liriodendron**, Tulpenbaum | | | | | |
| tulipifera | 1j. S. | 1/0 | | 30,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 49,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 75,— | |
| **Lonicera**, Heckenkirsche | | | | | |
| maackii | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 8,60 | |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 12,50 | |
| pileata | 2j. v. St. | 0/1/1 | 10—20 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 20—40 | 15,— | 135,— |
| „ yunnanensis | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 10—20 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 20—40 | 15,— | 135,— |
| tatarica | 2j. S. | 2/0 | 15—30 | 4,50 | 34,— |
| | 2j. S. | 2/0 | 30—50 | 6,— | 49,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—70 | 11,50 | 100,— |
| xylosteum | 2j. S. | 2/0 | 15—25 | 4,50 | 34,— |
| | 2j. S. | 2/0 | 25—50 | 6,— | 49,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—50 | 12,50 | 112,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 50—80 | 15,— | 135,— |
| **Lycium**, Bocksdorn | | | | | |
| chinense ovatum | | | | | |
| | 1j. bew. St. oder 1j. S. | 0/1/0 oder 1/0 | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. oder 1j. S. | 0/1/0 oder 1/0 | 60—100 | 13,50 | 120,— |
| halimifolium | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 60—100 | 13,50 | 120,— |
| **Magnolia**, Magnolie | | | | | |
| hypoleuca | 2j. v. S. | 1/1 | 10—20 | 75,— | |
| kobus | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 37,50 | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 56,— | |
| soulangeana | 2j. v. S. m. Topfb. | 1/1 | 12—20 | 75,— | |
| **Mahonia**, Fiederberberitze | | | | | |
| aquifolium | 1j. S. | 1/0 | | 2,60 | 15,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 12—25 | 8,60 | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 15—30 | 11,90 | 105,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 20—40 | 19,— | 170,— |
| **Malus**, Zierapfel | | | | | |
| sargentii | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,50 | 34,— |
| **Morus**, Maulbeerbaum | | | | | |
| alba | 2j. v. S. | 1/1 | 30—60 | 10,50 | 94,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 60—100 | 13,— | 120,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 17,— | 150,— |

**Nyssa**, Tupelobaum, Nyssaceae

**silvestris**, östl. Nordamerika, bis 30 m hoher, geradschäftiger, ausgesprochen schattenverträglicher Baum mit hängenden Zweigen und glänzendgrüner, sich zum Herbst **scharlachrot bis blaurot färbender Belaubung.** Verträgt sowohl Hitze und Frost als auch extrem trockene und feuchte Böden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | 20—30 | 120,— | |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ostrya,** Hopfenbuche | | | | | |
| **carpinifolia** | 3j. v. S. | 1/2 | 30—50 | 25,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 33,— | |
| **Phellodendron,** Korkbaum | | | | | |
| **japonicum** | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 7,50 | 64,— |
| **Philadelphus,** Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch | | | | | |
| **coronarius** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—70 | 11,50 | 100,— |
| **inodorus grandiflorus** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—70 | 11,50 | 100,— |
| **lemoinei Bouquet blanc** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—30 | 11,50 | 100,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 30—50 | 13,50 | 124,— |
| **„ Dame blanche** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—30 | 11,50 | 100,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 30—50 | 13,50 | 124,— |
| **„ erectus** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—30 | 11,50 | 100,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 30—50 | 13,50 | 124,— |
| **pubescens** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—70 | 11,50 | 100,— |
| **virginalis** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 15—30 | 13,50 | 120,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—50 | 16,50 | 150,— |
| **zeyheri** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—70 | 11,50 | 100,— |
| **Physocarpus,** Blasenspiere | | | | | |
| **opulifolius** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 3,75 | 26,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 5,60 | 45,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 7,90 | 67,50 |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—60 | 10,— | 90,— |
| **Platanus,** Platane | | | | | |
| **occidentalis acerifolia** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 15—30 | 22,50 | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—60 | 37,50 | |
| **Populus,** Pappel | | | | | |
| **bachelieri** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **berolinensis** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **gelrica** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **marilandica** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **nigra** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| **„ pyramidalis, Italienische Pyramidenpappel** | 2j. | | 40—65 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. | | 65—100 | 9,40 | 82,50 |
| | 2j. | | 100—140 | 11,60 | 105,— |
| **regenerata** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **robusta** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **serotina erecta** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |
| **simonii, Birkenpappel** | 2j. | | 40—65 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. | | 65—100 | 9,40 | 82,50 |
| | 2j. | | 100—140 | 11,60 | 105,— |
| **vernirubens** | 2j. | | F 65—100 | 10,— | 80,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 16,— | 128,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 22,— | 176,— |

| Populus (Fortsetzung) | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Neueinführungen!** Nur in geringen Mengen vorrätig. | | | | | |
| **Goedestorfer-Robustapappel, Grafhorster Pappel** (robusta-ähnlich), **Jacometti-Pappel** (robusta-ähnlich), **Lampertheimer-Robustapappel, Oxford-Pappel** (Balsamifera-Kreuzung) | | | | | |
| | 2j. | | F 65—100 | 15,— | 120,— |
| | 2j. | | F 100—140 | 24,— | 192,— |
| | 2j. | | F 140—180 | 30,— | 264,— |
| **Potentilla,** Fünffingerstrauch | | | | | |
| **arbuscula** | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 9,— | 75,— |
| **fruticosa** | 1j. S. | 1/0 | 8—15 | 3,75 | 25,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,50 | 34,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 9,— | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 40—60 | 11,50 | 100,— |
| „ **farreri** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 12—25 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 20—40 | 13,— | 116,— |
| **hybrida sulphurea** | | | | | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 25—40 | 13,— | 116,— |
| **Prunus,** Kirschlorbeer, Traubenkirsche und Zierkirsche | | | | | |
| **laurocerasus herbergii** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—20 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 20—40 | 37,50 | 340,— |
| „ **schipkaensis** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—20 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 20—40 | 37,50 | 340,— |
| „ „ **macrophylla** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—20 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 20—40 | 37,50 | 340,— |
| „ **zabeliana** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—20 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 20—40 | 37,50 | 340,— |
| **padus, Traubenkirsche** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 7,90 | 67,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 10,— | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 13,50 | 120,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 16,50 | 150,— |
| **serotina, Späte Traubenkirsche** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 10—20 | 1,50 | 12,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F 20—40 | 2,25 | 18,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F 40—60 | 3,40 | 26,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F 40—65 | 6,— | 48,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 65—100 | 8,25 | 66,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 100—140 | 12,— | 95,— |
| **spinosa, Schlehe, Schwarzdorn** | | | | | |
| | 1j. S | 1/0 | 15—30 | 5,— | 37,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,— | 49,— |
| | 1j S. | 1/0 | 50—80 | 9,40 | 82,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 13,50 | 120,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 16,50 | 150,— |
| **virginiana, Virginische Traubenkirsche** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 60—80 | 7,10 | 60,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 12,40 | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 15,— | |
| **Japanische Blütenkirschen** | | | | | |
| **albo rosea** | 1j. HV. | x/1/0 | 30—50 | 60,— | |
| | 1j. HV. | x/1/0 | 50—80 | 75,— | |
| **Hisakura** | 1j. HV. | x/1/0 | 30—50 | 50,— | |
| | 1j. HV. | x/1/0 | 50—80 | 60,— | |
| **incisa moerheimii** | | | | | |
| | 2j. v. HV. | x/1/1 | 40—60 | 60,— | |
| **Ptelea,** Lederblume | | | | | |
| **trifoliata** | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 10,50 | |
| **Pterostyrax,** Flügelstorax (Styracaceae) | | | | | |
| **hispida** | | | | | |
| China, Japan, bei uns bis 10 m hoher, sommergrüner Baum mit lockerer Krone, die im Juni reich mit duftenden, rahmweißen, 10—20 cm langen Blütenrispen bedeckt ist. | | | | | |
| | 1j. kr. pik. S. | 1x0 | 5—10 | 26,— | |
| | 1j. v. S. m. Topfb. | 1x0 | 10—15 | 37,50 | |

| | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyracantha**, Feuerdorn | | | | | | |
| **coccinea lalandi major** | | | | | | |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | | 15—25 | 45,— | |
| | 3j. v. St. m. Topfb. | 0/1/2 | | 25—35 | 64,— | |
| **Quercus**, Eiche | | | | | | |
| **cerris, Zerreiche** | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | | 10—20 | 6,— | 52,50 |
| **pedunculata, Stieleiche, a. anerk. Saat** + 10 % Aufschlag | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 10—25 | 1,70 | 13,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 15—30 | 2,40 | 19,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—50 | 7,50 | 60,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 10,— | 82,50 |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 80—100 | 15,— | 116,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 100—140 | 24,— | 188,— |
| **rubra, Amerikanische- oder Roteiche** | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 15—30 | 2,80 | 22,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 20—40 | 3,75 | 30,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—50 | 9,60 | 77,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 16,— | 127,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 80—100 | 20,— | 162,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 100—140 | 26,50 | 212,— |
| **sessiliflora, Traubeneiche**, aus anerkannter Saat | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 7—15 | 3,— | 24,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 15—30 | 4,— | 32,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 15—30 | 9,50 | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—50 | 14,— | 115,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 20,— | 160,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 80—100 | 24,— | 190,— |
| **Rhamnus**, Faulbaum, Kreuzdorn | | | | | | |
| **cathartica** | 1j. S. | 1/0 | | 8—15 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 6,— | 49,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 20—40 | 7,50 | 64,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 40—65 | 8,60 | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 65—100 | 11,60 | 105,— |
| **frangula** | 1j. S. | 1/0 | | 8—15 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 6,— | 49,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 40—65 | 8,60 | 75,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 65—100 | 11,60 | 105,— |
| **imeretina** | 2j. bew. Abl. | —2/0 | | 50—80 | 37,50 | |
| **Rhododendron**, Alpenrose | | | | | | |
| **praecox** | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 15—25 | 75,— | |
| **Rhodotypus**, Scheinkerrie | | | | | | |
| **kerrioides** | 1j. S. | 1/0 | | 20—40 | 6,75 | 56,— |
| **Rhus**, Sumach | | | | | | |
| **silvestris** | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 19,— | |
| **Ribes**, Johannis- und Stachelbeere | | | | | | |
| **alpinum** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 15—30 | 16,50 | 150,— |
| **aureum Brechts Erfolg** | | | | | | |
| | 1j. Abr. | —1/0 | | 80—120 | 7,10 | 60,— |
| siehe auch unter Veredlungsunterlagen Seite 172 | | | | | | |
| **divaricatum** | 2j. bew. St. | 0/2/0 | | 50—80 | 7,90 | 67,50 |
| | 3j. bew. St. | 0/3/0 | | 80—125 | 10,— | 90,— |
| siehe auch unter Veredlungsunterlagen Seite 172 | | | | | | |
| **floridum** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 40—70 | 11,50 | 100,— |
| **sanguineum** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 60—100 | 13,50 | 120,— |
| **„ atrorubens** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 65—100 | 13,50 | 120,— |
| **Robinia**, Robinie, Scheinakazie | | | | | | |
| **pseudoacacia** | 1j. S. | 1/0 | F | 30—50 | 2,80 | 22,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 50—80 | 4,30 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 80—100 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 40—65 | 5,75 | 45,— |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 65—100 | 7,— | 55,— |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 100—140 | 10,75 | 85,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 40—65 | 7,— | 55,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 65—100 | 10,75 | 85,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 100—140 | 15,75 | 125,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 140—180 | 19,50 | 155,— |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rosa**, Rose | | | | | |
| **blanda** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 5,60 | 45,— |
| **canina** | 1j. S. | 1/0 | 25—50 | 3,40 | 30,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 25—50 | 7,90 | 67,50 |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 50—80 | 10,— | 90,— |
| **rubiginosa** (eglanteria) | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 25—40 | 4,10 | 30,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 40—60 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—50 | 7,90 | 75,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 50—80 | 11,60 | 105,— |
| **rubrifolia** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 7,90 | 67,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 11,50 | 100,— |
| **rugosa** | 1j. S. | 1/0 | 7—15 | 3,40 | 22,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,10 | 30,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 6,40 | 52,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 10,50 | 94,— |
| **virginiana** | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 20—40 | 6,40 | 52,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 10,50 | 94,— |
| **Rubus**, Brombeere, Japanische Weinbeere | | | | | |
| **fruticosus, Wildbrombeere** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,25 | 41,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 11,50 | 100,— |
| **phoenicolasius** | 1j. kr. pik. | 1x0 | 10—20 | 19,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 15—30 | 15,— | 135,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 30—60 | 22,50 | 200,— |
| **Salix**, Weide | | | | | |
| **alba, Baumweide, Silberweide, Weißweide** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—60 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 60—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| **„ vitellina pendula, Trauerweide** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 9,40 | 82,50 |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 13,50 | 120,— |
| **americana** (Amerikaweide) | | | | | |
| Eine der neuesten und wertvollsten Bindeweiden, die bei einem Pflanzversuch im Jahre 1949 an der Wesermündungen gezeigt hat, daß sie temporäre Brackwasserüberflutungen sehr gut vertragen kann. | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 60—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 11,50 | 100,— |
| **aurita, Ohrweide** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 10,— | 90,— |
| **caprea hybrida** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 11,50 | 100,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 12,— | 108,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 13,— | 120,— |
| **daphnoides pommeranica mas** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| **„ praecox** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| **„ ruberrima** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| **incana** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 8,60 | |
| **pendulifolia** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| **pentandra** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| **purpurea** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 5,60 | 45,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |

| | | | Höhe ca. cm | DM 100 St. | DM 1000 St. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Salix purpurea** (Fortsetzung) | | | | | |
| „ **gracilis** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| „ **nana** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—60 | 8,60 | 75,— |
| **repens argentea** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—60 | 8,60 | 75,— |
| **smithiana** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| **viminalis** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| „ **mas** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 7,10 | 60,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 100—140 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 140—180 | 10,— | 90,— |
| **Sambucus,** Holunder | | | | | |
| **canadensis lutea** | | | | | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—70 | 16,50 | 150,— |
| **nigra, Schwarzer Holunder** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,— | 49,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 8,60 | 75,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 11,50 | 100,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 13,50 | 120,— |
| „ **laciniata** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—70 | 16,50 | 150,— |
| „ **macrocarpa** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,— | 49,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 16,50 | |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 65—100 | 19,— | |
| „ **praecox** | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 6,— | 49,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 40—65 | 16,50 | |
| **racemosa, Traubenholunder** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 15—30 | 5,25 | 41,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 30—50 | 7,90 | 67,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | 50—80 | 10,50 | 94,— |
| **Sophora,** Schnurbaum | | | | | |
| **japonica** | 1j. S. | 1/0 | 30—60 | 9,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 40—65 | 15,— | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 65—100 | 19,— | |
| **Sorbaria,** Fiederspiere | | | | | |
| **aitchisonii** | 1j. S. | 1/0 | | 5,60 | 45,— |
| **sorbifolia** | 1j. S. | 1/0 | | 4,90 | 37,50 |
| „ **stellipila** | 1j. S. | 1/0 | | 5,60 | 45,— |
| **Sorbus,** Eberesche, Vogelbeere, Mehlbeere | | | | | |
| **aucuparia, Eberesche, Vogelbeere** | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F 10—20 | 1,90 | 14,50 |
| | 1j. S. | 1/0 | F 20—40 | 2,80 | 22,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 40—65 | 7,— | 56,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 65—100 | 10,50 | 85,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F 100—140 | 14,— | 115,— |
| **domestica** (L.) | | | | | |
| Bis 20 m hoher Baum mit 10 cm breiten, filzigen Doldentrauben im Mai. Die birnenförmigen, bis 3 cm langen Früchte werden gern für Mostbereitung verwendet. | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | 5—10 | 6,75 | 56,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 8,60 | 75,— |
| | 1j. S. | 1/0 | 20—40 | 10,— | 90,— |
| **suecica, Nordische Mehlbeere** | | | | | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 40—65 | 7,90 | 67,50 |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 65—100 | 11,50 | 100,— |
| | 4j. v. S. | 1/2 | 100—140 | 15,— | 135,— |
| **Spiraea,** Spierstrauch | | | | | |
| **albiflora** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—25 | 12,40 | 112,— |
| **arguta** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—30 | 19,— | 170,— |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 30—50 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. 2 × v. St. | 0/1/1/1 | 30—50 | 30,— | 270,— |
| **bumalda Anthony Waterer** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 15—25 | 12,40 | 112,— |
| „ **froebelii** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 20—40 | 10,50 | 94,— |
| **douglasii** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | 30—50 | 9,40 | 82,50 |

| | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spieraea** (Fortsetzung) | | | | | | |
| **menziesii triumphans** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—50 | 9,40 | 82,50 |
| **nobleana** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—50 | 12,40 | |
| **vanhouttei** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 25—50 | 12,40 | 112,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 40—70 | 14,50 | 130,— |
| **Stranvaesia** | | | | | | |
| **davidiana** | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 25—40 | 60,— | |
| **Symphoricarpus**, Schneebeere | | | | | | |
| **chenaultii** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| **occidentalis** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| **orbiculatus** | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—60 | 11,50 | 100,— |
| **racemosus** | 1j. S. | 1/0 | | 15—30 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 30—60 | 6,75 | 56,— |
| | 1j. bew. St. od. 2j. v. S. | 0/1/0 oder 1/1 | | 30—50 | 10,— | 90,— |
| | 1j. bew. St. od. 3j. v. S. | 0/1/0 oder 1/2 | | 50—80 | 14,50 | 130,— |
| **Syringa**, Flieder | | | | | | |
| **amurensis japonica** | 2j. S. | 2/0 | | | 7,90 | 60,— |
| **chinensis** (rothomagensis) | 1j. HV. | x/1/0 | | 20—40 | 45,— | 405,— |
| **josikaea** | 2j. v. S. | 1/1 | | 8—15 | 10,— | 90,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 20—40 | 12,40 | 112,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 40—65 | 15,— | 135,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 65—100 | 20,— | 188,— |
| | 4j. 2 × verpfl., buschig, aus halbweitem Stand | | | 65—100 | 30,— | 270,— |
| **reflexa** | 2j. v. S. | 1/1 | | 20—40 | 15,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 40—60 | 19,— | |
| **sweginzowii** | 3j. v. S. | 1/2 | | 40—65 | 15,— | |
| **vulgaris** | 2j. S. oder 2j. v. S. | 2/0 oder 1/1 | | 20—40 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. S. oder 2j. v. S. | 2/0 oder 1/1 | | 40—60 | 7,10 | 60,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 oder 2/1 | | 60—80 | 13,50 | 120,— |
| | 6j. 2 × verpfl., ab 3 Grundtrieben | | | 70—100 | 30,— | 270,— |
| Veredlungsware siehe Veredlungsunterlagen Seite 172 | | | | | | |
| „ **alba** | 2j. v. S. | 1/1 | | 40—60 | 10,— | 90,— |
| **Tamarix**, Tamariske, Ericastrauch | | | | | | |
| **parviflora** (tetrandra purpurea) | 1j. bew. St. | 0/1/0 | | 30—50 | 7,90 | 75,— |
| **Tilia**, Linde | | | | | | |
| **parvifolia, Winterlinde** | 1j. S. | 1/0 | F | 10—20 | 2,40 | 19,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 20—40 | 3,75 | 30,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 15—30 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 30—50 | 9,20 | 74,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 13,50 | 108,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 80—120 | 17,— | 145,— |
| | 3j. v. S. a. halbw. Stand | | | 50—80 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. S. a. halbw. Stand | | | 80—125 | 30,— | 270,— |
| **platyphyllos** (grandifolia), **Sommerlinde** | 1j. S. | 1/0 | | 10—20 | 4,50 | 34,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 20—40 | 5,60 | 45,— |
| | 2j. S. | 2/0 | | 30—50 | 13,— | 120,— |
| | 2j. S. | 2/0 | | 50—80 | 19,50 | 180,— |
| **Ulmus**, Ulme, Rüster | | | | | | |
| **campestre, Feldulme** | 1j. S. | 1/0 | F | 10—20 | 2,— | 16,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 20—40 | 3,40 | 26,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 40—65 | 8,— | 64,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 65—100 | 10,70 | 85,50 |
| **scabra** (montana), **Bergulme** | 1j. S. | 1/0 | F | 10—20 | 2,50 | 19,— |
| | 1j. S. | 1/0 | F | 20—40 | 4,— | 31,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 40—65 | 9,70 | 76,50 |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 65—100 | 12,80 | 102,— |
| **Viburnum**, Schneeball | | | | | | |
| **opulus** | 1j. S. | 1/0 | | 5—10 | 5,25 | 41,— |
| | 1j. S. | 1/0 | | 10—20 | 6,75 | 56,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 25—50 | 16,50 | 150,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 50—80 | 25,— | 225,— |

| | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Viburnum opulus** (Fortsetzung) | | | | | | |
| „ **sterile** | 1j. bew. Abl. | —1/0 | | 25—50 | 16,50 | 150,— |
| | 1j. bew. Abl. | —1/0 | | 50—80 | 19,— | 170,— |
| | 3j. v. Abl. | —1/2 | | 30—60 | 25,— | 225,— |
| **tomentosum** | 3j. v. St. buschig | 0/1/2 | | 25—35 | 45,— | |
| **Weigela** (Diervilla) Weigelie | | | | | | |
| **Eva Rathke** | 2j. v. St., 1—3 Triebe | 0/1/1 | | 40—60 | 34,— | |
| **rosea** in Sorten | 1j. bew. St. od. 2j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/1 | | 15—30 | 13,— | 120,— |
| | 1j. bew. St. od. 2j. v. St. | 0/1/0 oder 0/1/1 | | 30—60 | 15,— | 135,— |

# IV. Nadelgehölze (Koniferen)

**Abies**, Weiß- oder Edeltanne

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **alba** (pectinata) **Weißtanne** | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | F | | 1,90 | 15,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | | 4,70 | 37,50 |
| siehe auch Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| **cilicica** (Carr.) | | | | | | |
| Cilicische, bis 30 m hohe, schmal kegelförmige Tanne, die vom Boden an gleichmäßig beastet ist. Von A. nordmanniana unterscheidet sie sich durch ihre langen, schmalen Nadeln und übertrifft diese in der Wüchsigkeit. | | | | | | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 8—12 | 13,50 | 124,— |
| **concolor** | 2j. S. | 2/0 | | 6—10 | 9,75 | 86,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 10—15 | 16,50 | 150,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 15—20 | 27,— | |
| **grandis, Große Küstentanne** | | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 8—15 | 14,— | 112,— |
| **homolepis** (brachyphylla) | | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | | 19,— | 170,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 8—12 | 22,50 | |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 12—20 | 30,— | |
| **nordmanniana** | 2j. v. S. | 1/1 | | | 11,50 | 100,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 8—12 | 13,50 | 124,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 12—25 | 20,— | 188,— |
| | 5j. 2 × v. S. | 1/2/2 | | 15—25 | 34,— | |
| | 6j. 2 × v. S. | 2/2/2 | | 20—30 | 45,— | |
| siehe auch Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| **numidica** | 3j. v. S. | 1/2 | | 6—12 | 22,50 | |
| **veitchii** | 2j. S. | 2/0 | | | 11,50 | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 8—15 | 19,— | |
| | 4j. 2 × v. S. m. Topfb. | 1/2/1 | | 12—20 | 41,— | |
| **Cedrus**, Zeder | | | | | | |
| **atlantica** | 2j. v. S. | 1/1 | | 10—20 | 30,— | |
| **deodara** | 2j. v. S. | 1/1 | | 10—20 | 30,— | |
| | 2j. v. S. m. Topfb. | 1/1 | | 10—20 | 45,— | |
| siehe auch Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| **Chamaecyparis**, Lebensbaumzypresse | | | | | | |
| **lawsoniana** | 2j. S. | 2/0 | | | 3,40 | 22,50 |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 15—30 | 7,10 | 60,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 20—40 | 8,60 | 75,— |
| Veredlungsware, siehe Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| „ **alumii** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 12—25 | 20,— | 180,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 20—30 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 30—40 | 34,— | 300,— |
| „ **ellwoodii** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 10—20 | 20,— | 180,— |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | | 10—20 | 37,50 | 340,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 20—30 | 34,— | 300,— |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | | 20—30 | 52,50 | 490,— |
| „ **fletcheri** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 10—20 | 20,— | 180,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 15—25 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 25—40 | 37,50 | 340,— |
| „ **glauca argentea** | | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | | 15—20 | 45,— | |
| „ **hollandica** | 1j. Vg. | x/1/0 | | 15—20 | 45,— | |
| „ **intertexta** | 1j. Vg. | x/1/0 | | 15—20 | 45,— | |
| „ **lombardtii aurea** | | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | | 15—20 | 45,— | |
| „ **minima glauca** | | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | | 10—15 | 45,— | |
| „ **monumentalis nova** | | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | | 15—20 | 45,— | |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chamaecyparis lawsoniana** (Fortsetzung) | | | | | |
| „ **Silver Queen** | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | 15—20 | 45,— | |
| „ **stewartii** | 1j. Vg. | x/1/0 | 15—20 | 45,— | |
| „ **tharandtensis caesia** | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | 10—15 | 45,— | |
| „ **wisselii** | 1j. Vg. | x/1/0 | 15—20 | 45,— | |
| **obtusa pygmaea** | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | 8—12 | 60,— | |
| **pisifera filifera aurea** | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | 15—20 | 52,50 | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—20 | 56,— | |
| „ **nana** | 3j. v. St. | 0/1/2 | 4—8 | 22,50 | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 4—8 | 37,50 | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 8—12 | 52,50 | |
| „ **plumosa** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 12—20 | 20,— | 180,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—30 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 20—40 | 34,— | 300,— |
| „ „ **aurea** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 12—20 | 20,— | 180,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—30 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 20—40 | 34,— | 300,— |
| „ **squarrosa** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 12—20 | 20,— | 180,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—30 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 20—40 | 34,— | 300,— |
| **Cryptomeria,** Sicheltanne | | | | | |
| **japonica** | 2j. v. S. | 1/1 | 8—12 | 16,50 | |
| | 3j. v. S. | 2/1 | 20—30 | 19,— | |
| **Ginkgo,** Fächerblattbaum | | | | | |
| **biloba** | 1j. S. | 1/0 | 10—20 | 16,50 | 135,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | 10—20 | 26,— | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | 15—30 | 37,50 | |
| **Juniperus,** Wacholder | | | | | |
| **chinensis pfitzeriana** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 10—20 | 25,— | 225,— |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | 10—20 | 41,— | 375,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—25 | 34,— | 300,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—25 | 52,50 | 475,— |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 25—35 | 75,— | |
| **communis compacta** | | | | | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—25 | 25,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—25 | 45,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 25—35 | 60,— | |
| „ **cracovica** | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—30 | 45,— | |
| „ **hibernica** | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—30 | 25,— | 225,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 30—40 | 33,— | 300,— |
| „ **hornibrookii** | | | | | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 12—18 | 75,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 18—24 | 100,— | |
| „ **repanda** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—12 | 30,— | 270,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—18 | 45,— | 405,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 12—18 | 64,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 18—24 | 80,— | |
| | 5j. 3 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1/1 | 24—30 | 120,— | |
| „ **suecica** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 10—20 | 20,— | 180,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—30 | 25,— | 225,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—25 | 45,— | 405,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 30—40 | 33,— | 300,— |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 25—40 | 60,— | 540,— |
| **horizontalis** | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 20—30 | 100,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 30—40 | 120,— | |
| „ **glauca** | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 12—20 | 75,— | |
| | 5j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/2 | 20—30 | 100,— | |
| „ **plumosa** | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 20—30 | 75,— | |
| | 5j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/2 | 30—40 | 100,— | |
| „ **sabina femina** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—15 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 15—20 | 34,— | 300,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | 15—20 | 52,50 | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 20—30 | 41,— | 375,— |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 20—30 | 60,— | |
| „ **hicksii** | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—15 | 25,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | 20—30 | 60,— | |

| | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Juniperus sabina** (Fortsetzung) | | | | | | |
| „ **mas** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 8—15 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 15—20 | 34,— | 300,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | | 15—20 | 52,50 | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 20—30 | 41,— | 375,— |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | | 20—30 | 60,— | |
| | 6j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/2/2/2 | | 30—40 | 100,— | |
| **squamata meyeri** | | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 8—12 | 25,— | 225,— |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | | 8—12 | 41,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 10—15 | 34,— | 300,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 15—20 | 41,— | 375,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 20—30 | 50,— | 450,— |
| **virginiana** | 2j. v. S. | 1/1 | | 15—30 | 9,40 | 82,50 |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 20—40 | 14,50 | 130,— |
| Veredlungsware, siehe Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| **Larix**, Lärche | | | | | | |
| **decidua** (L. europaea) **anerkannt** | | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 20—40 | 8,— | 63,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—50 | 10,80 | 85,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 14,— | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 80—120 | 17,— | 135,— |
| **leptolepis, Japanische Lärche** aus anerkannter Saat + 10 % Aufschl. | | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 20—40 | 8,— | 63,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 25—50 | 9,— | 72,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—50 | 10,80 | 85,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 50—80 | 14,— | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 80—120 | 17,— | 135,— |
| **Picea**, Fichte | | | | | | |
| **alba**, siehe P. glauca | | | | | | |
| **excelsa, Fichte, Rottanne** | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 7—20 | 0,75 | 6,— |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 10—25 | 0,95 | 7,50 |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | 12—25 | 2,80 | 22,50 |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | 15—35 | 3,40 | 27,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | 20—40 | 4,10 | 33,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 25—50 | 5,40 | 44,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 30—60 | 6,— | 48,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 40—70 | 6,75 | 54,— |
| Veredlungsware, siehe Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| „ **maxwellii** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 4—8 | 34,— | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 8—12 | 49,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | | 8—12 | 67,50 | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | | 12—18 | 67,50 | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | | 12—18 | 86,— | |
| „ **nidiformis** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 8—12 | 34,— | 300,— |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | | 8—12 | 49,— | 450,— |
| | 3j. 2 × v. St. | 0/1/1/1 | | 12—18 | 37,50 | 340,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | | 12—18 | 56,— | 510,— |
| | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | | 18—24 | 52,50 | 475,— |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | | 18—20 | 71,— | |
| „ **pumila glauca** | | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 4—8 | 34,— | 300,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 8—12 | 37,50 | 340,— |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | | 8—12 | 56,— | 510,— |
| | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | | 12—18 | 52,50 | 475,— |
| | 4j. 3 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1/1 | | 12—18 | 71,— | |
| „ **pygmaea** | 2j. v. St. | 0/1/1 | | 8—12 | 34,— | |
| | 2j. v. St. m. Topfb. | 0/1/1 | | 8—12 | 52,50 | |
| | 3j. 2 × v. St. | 0/1/1/1 | | 12—18 | 45,— | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | | 12—18 | 64,— | |
| **glauca** (P. alba, P. canadensis) | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 7—20 | 0,80 | 6,40 |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | 15—35 | 3,60 | 29,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | 20—40 | 4,40 | 35,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 25—50 | 5,70 | 46,— |
| „ **conica** | 3j. v. St. | 0/1/2 | | 8—12 | 52,50 | |
| | 3j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/1/1 | | 8—12 | 67,50 | |
| | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | | 12—18 | 75,— | |
| | 4j. 2 × v. St. m. Topfb. | 0/1/2/1 | | 12—18 | 94,— | |
| **omorika** | 2j. S. | 2/0 | | | 5,— | 37,50 |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 10—20 | 12,40 | 112,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 20—40 | 19,— | 170,— |

| Picea (Fortsetzung) | | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **orientalis** | 2j. S. | 2/0 | | | 5,60 | 45,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 12—20 | 19,— | 170,— |
| **pungens** | 2j. S. | 2/0 | | 8—15 | 5,60 | 45,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 10—20 | 10,— | 90,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 12—25 | 13,50 | 120,— |
| siehe auch Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| „ **glauca** | 2j. S. | 2/0 | | 8—15 | 7,10 | 60,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 10—20 | 12,40 | 112,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 12—25 | 19,— | 170,— |
| „ „ **in veredelten Sorten** | | | | | | |
| | 1j. Vg. | x/1/0 | | | 135,— | |
| **sitchensis, Sitkafichte** | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 7—20 | 2,— | 16,— |
| | 2j. S. | 2/0 | F | 10—25 | 2,50 | 19,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | 15—35 | 6,25 | 50,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 25—50 | 9,— | 72,— |
| **Pinus,** Kiefer | | | | | | |
| **contorta murrayana** | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | | | 1,90 | 15,— |
| **excelsa, Tränenkiefer** | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | | | 10,50 | 86,— |
| **montana, Berg- oder Krummholzkiefer** | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | F | | 1,20 | 9,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | F | | 2,80 | 22,50 |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 12—25 | 3,75 | 30,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 15—30 | 4,50 | 36,— |
| | mehrmals verpflanzt | | | 20—30 | 25,— | 225,— |
| siehe auch Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| „ **mughus** | 2j. S. | 2/0 | | | 2,60 | 15,— |
| | 3j. v. S. | 2/1 | | 8—15 | 5,— | 37,50 |
| | 4j. v. S. | 2/2 | | 12—20 | 11,50 | 100,— |
| | mehrmals verpflanzt | | | 20—30 | 33,— | 300,— |
| | mehrmals verpflanzt | | | 30—40 | 52,50 | 475,— |
| **nigra austriaca, Schwarzkiefer** | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | | 1,— | 7,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | | 3,— | 24,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 12—25 | 4,30 | 35,— |
| **silvestris, Waldkiefer** | | | | | | |
| **Höhenkiefer anerkannt,** Schwarzwald über 700 m | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | | 1,25 | 9,— |
| | 1j. S. Auslese | 1/0 | F | | 1,50 | 11,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | | 3,50 | 28,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | | 4,25 | 34,— |
| **Höhenkiefer anerkannt,** 300—600 m | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | | 1,— | 7,— |
| | 1j. S. Auslese | 1/0 | F | | 1,25 | 8,50 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | | 3,— | 24,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | | 4,— | 32,— |
| **Tieflandkiefer anerkannt** | | | | | | |
| | 1j. S. | 1/0 | F | | 0,75 | 6,— |
| | 1j. S. Auslese | 1/0 | F | | 0,90 | 7,20 |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | | 2,50 | 20,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | | 3,40 | 27,— |
| **strobus, Weymouthskiefer** | | | | | | |
| aus anerkannter Saat + 10 % Aufschl. | | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | F | | 2,— | 16,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | | 2,60 | 21,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 oder 2/1 | F | | 3,60 | 28,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | F | 20—40 | 6,— | 48,— |
| siehe auch Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | | |
| **Pseudotsuga,** Douglasie, Douglastanne | | | | | | |
| **taxifolia viridis** | | | | | | |
| aus anerkannter Saat + 10 % Aufschl. | | | | | | |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 15—25 | 11,25 | 90,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 20—40 | 15,— | 120,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | F | 25—50 | 17,50 | 140,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 | F | 30—60 | 22,50 | 180,— |
| **Taxodium,** Sumpfzypresse | | | | | | |
| **distichum** | 1j. S. | 1/0 | | 20—30 | 15,— | 135,— |
| | 2j. v. S. | 1/1 | | 30—40 | 22,50 | |
| | 3j. v. S. | 1/2 | | 40—70 | 34,— | |

| | | | Höhe ca. cm | 100 St. DM | 1000 St. DM |
|---|---|---|---|---|---|
| **Taxus,** Eibe | | | | | |
| **baccata** | 1j. S. | 1/0 | | 9,40 | 82,50 |
| | 2j. S. | 2/0 | | 12,40 | 112,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 oder 2/1 | 8—12 | 21,— | 195,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 12—20 | 30,— | 270,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 15—25 | 37,50 | 340,— |
| | mehrmals verpflanzt | | 20—30 | 90,— | |
| | mehrmals verpflanzt | | 30—40 | 120,— | |
| | mehrmals verpflanzt | | 40—60 | 165,— | |
| Veredlungsunterlagen, siehe Seite 173 | | | | | |
| **„ erecta overeynderi** | | | | | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 8—12 | 45,— | 405,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 12—18 | 60,— | |
| | 5j. 2 × v. St. | 0/1/2/2 | 18—24 | 90,— | |
| | 5j. 2 × v. St. | 0/1/2/2 | 24—30 | 120,— | |
| **„ fastigiata** | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | 12—18 | 75,— | |
| | 5j. 2 × v. St. | 0/1/2/2 | 18—24 | 100,— | |
| | 5j. 2 × v. St. | 0/1/2/2 | 24—30 | 135,— | |
| **„ „ aureo-marginata** | | | | | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 8—12 | 52,50 | |
| | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | 12—18 | 82,50 | |
| **cuspidata hicksii** (verträgt Kälte unter — 30° Celsius) | | | | | |
| | 4j. 2 × v. St. | 0/1/2/1 | 12—18 | 75,— | |
| | 5j. 2 × v. St. | 0/1/2/2 | 18—24 | 100,— | |
| | 6j. 2 × v. St. | 0/2/2/2 | 24—35 | 135,— | |
| **Thuja,** Lebensbaum | | | | | |
| **occidentalis** | 2j. S. | 2/0 | | 2,60 | 15,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 oder 2/1 | 15—30 | 6,75 | 56,— |
| | 3j. v. S. | 1/2 oder 2/1 | 20—35 | 7,50 | 64,— |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 25—50 | 7,90 | 67,50 |
| | 4j. v. S. | 2/2 | 30—60 | 8,60 | 75,— |
| | 4j. v. S. umstochen | 2/2 | 25—50 | 9,40 | 82,50 |
| | 4j. v. S. umstochen | 2/2 | 30—60 | 10,— | 90,— |
| | mehrmals verpflanzt | | 30—40 | 22,50 | 195,— |
| | mehrmals verpflanzt | | 40—60 | 27,— | 240,— |
| | mehrmals verpflanzt | | 60—80 | 34,— | 285,— |
| Veredlungsware, siehe Veredlungsunterlagen Seite 173 | | | | | |
| **„ ellwangeriana Rheingold** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 8—12 | 22,50 | 200,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 10—15 | 30,— | 270,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 12—20 | 37,50 | 340,— |
| **„ fastigiata** | 3j. v. St. | 0/1/2 | 12—18 | 25,— | 225,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 18—24 | 30,— | 270,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 25—40 | 37,50 | 340,— |
| **„ globosa compacta** | | | | | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 12—20 | 37,50 | 340,— |
| | 6j. 2 × v. St. | 0/2/2/2 | 20—30 | 30,— | 270,— |
| **„ recurva nana** | | | | | |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 10—15 | 30,— | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 12—20 | 37,50 | |
| **„ umbraculifera** | | | | | |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 12—20 | 37,50 | |
| **plicata aurescens** | | | | | |
| | 2j. v. St. | 0/1/1 | 10—20 | 19,— | 170,— |
| | 3j. v. St. | 0/1/2 | 20—35 | 22,50 | 200,— |
| | 4j. v. St. | 0/2/2 | 25—40 | 25,— | 225,— |
| **Thujopsis,** Hibalebensbaum | | | | | |
| **dolabrata** | 4j. v St. | 0/2/2 | 12—20 | 37,50 | |
| **Tsuga,** Hemlockstanne | | | | | |
| **canadensis** | 2j. v. S. m. Topfb. | 0/1/1 | 5—10 | 29,— | |
| **heterophylla** (Sargent) | | | | | |
| **Syn.** Tsuga mertensiana, Carr.; T. non. mert. (Sargent) Westamerika. 30 m hoher, aufrechtwachsender Baum, der sich von der nahen Verwandten T. canadensis durch besonders zierliche Bezweigung unterscheidet. | | | | | |
| | 2j. S. | 2/0 | | 13,50 | 120,— |

# Veredlungsunterlagen

## I. Sämlingsunterlagen

## Grahams Jubiläumsapfel

Den langjährigen Bemühungen des Obstbauversuchsringes Jork im Alten Lande unter Leitung von Herrn Dr. Löwel ist es jetzt gelungen, dem deutschen Obstbau eine hervorragende wertvolle Apfelunterlage zur Verfügung zu stellen. Die Wildlinge zeichnen sich durch eine 100prozentige Reinheit aus und durch einen auffallend gleichmäßigen, gesunden Wuchs, der auch unter Befall von Fusikladium nicht zu leiden hat. Diese guten Eigenschaften werden sichtbar auch auf die darauf veredelten Sorten übertragen, so daß wir die schönsten und gleichmäßigsten Quartiere in der Baumschule damit erreichen wie nie zuvor.

Die kostspielige Saatgewinnung hat sich durch den Zusammenschluß verschiedener Wildlingsanbauer und durch den Einsatz einer neuzeitlichen, leistungsfähigen Entkernungsmaschine erheblich verbilligt, so daß wir erfreulicherweise heute in der Lage sind, Ihnen eine **Spitzenleistung der Wildlingszucht** zu einem annehmbaren Preise anzubieten. Machen Sie bitte davon Gebrauch, und Sie werden den besten Erfolg damit haben.

**J. Timm & Co.**

| Altersbezeichnungen | Neue Jungpflanzen-Altersbezeichnungen | Durchm. | DM per 100 St. | DM per 1000 St. |
|---|---|---|---|---|
| **Grahams Jubiläumsapfel** und Sämlinge aus reinen Saaten mit Sortennachweis. | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 4—6 mm | 4,— | 25,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 6—7 mm | 6,— | 45,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 8,50 | 70,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 9—12 mm | 11,50 | 100,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 4—6 mm | 4,50 | 30,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 6—7 mm | 7,50 | 60,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 7—9 mm | 11,50 | 100,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 9—12 mm | 14,50 | 130,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 7—8 mm | 7,50 | 60,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 8—10 mm | 11,50 | 100,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 10—12 mm | 14,50 | 130,— |
| **Malus communis,** Sämlinge aus handelsüblichem Mischsaatgut 25 % Nachlaß. | | | | |
| **Pirus communis,** Birnensämlinge aus reinen Saaten mit Sortennachweis. | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 6—7 mm | 6,50 | 50,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 10,— | 85,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 9—12 mm | 13,50 | 120,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 6—7 mm | 8,50 | 70,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 7—9 mm | 14,50 | 130,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 9—12 mm | 16,50 | 150,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 7—8 mm | 8,50 | 70,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 8—10 mm | 14,50 | 130,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 10—12 mm | 16,50 | 150,— |
| **Birnensämlinge** aus Mischsaat 25 % Nachlaß. | | | | |
| **Prunus avium,** Vogelkirschen, hellrindige | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 5—7 mm | 7,— | 55,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 10,— | 85,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 9—12 mm | 11,50 | 100,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 5—7 mm | 8,— | 65,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 7—9 mm | 11,— | 95,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 9—12 mm | 13,50 | 120,— |
| **Prunus mahaleb,** Steinweichsel oder Weichselkirsche | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 4—5 mm | 4,50 | 30,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 5—7 mm | 7,— | 55,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 9,50 | 80,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 4—5 mm | 5,50 | 40,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 5—7 mm | 7,— | 55,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 7—9 mm | 10,50 | 90,— |
| **Prunus** St. Julien damascena, schwarz und weiß, und ähnl. Pflaumenunterlagen aus Samen. | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 6—7 mm | 10,50 | 90,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 13,50 | 120,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 9—12 mm | 15,— | 135,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 6—7 mm | 11,50 | 100,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 7—9 mm | 16,50 | 150,— |
| 1jähr. krautartig pik | 1x0 | 9—12 mm | 19,50 | 180,— |
| **Prunus dam. Orleans** + 10 % Aufschlag. | | | | |

| Altersbezeichnungen | Neue Jungpflanzen-Altersbezeichnungen | Durchm. | DM per 100 St. | DM per 1000 St. |
|---|---|---|---|---|
| **Prunus cerasifera myrobalana,** Myrobalanen | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 4—5 mm | 5,— | 35,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 5—7 mm | 8,50 | 70,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 10,50 | 90,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 4—5 mm | 5,50 | 40,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 5—7 mm | 9,50 | 80,— |
| 1jähr. krautartig pik. | 1x0 | 7—9 mm | 11,50 | 100,— |
| **Prunus persica,** Pfirsich | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 5—7 mm | 9,50 | 80,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 7—9 mm | 10,50 | 90,— |
| **Crataegus monogyna,** Weißdorn für Veredlungszwecke | | | | |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 7—8 mm | 10,50 | 90,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 8—10 mm | 12,50 | 110,— |
| **Juglans regia,** Walnüsse | | Höhe ca. cm | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 10—20 | 17,50 | 160,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 20—40 | 22,— | 200,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 40—60 | 30,— | 270,— |
| 2jähr. verpflanzt | 1/1 | 20—40 | 30,— | 270,— |
| 2—3jähr. verpflanzt | 1/1—1/2 | 40—60 | 36,— | 330,— |
| 2—3jähr. verpflanzt | 1/1—1/2 | 60—80 | 44,— | 400,— |
| **Syringa vulgaris,** Flieder | | | | |
| 2j. S. oder 2—3j. verpfl. | 2/0 oder 1/1—1/2 | 7—8 mm | 9,50 | 80,— |
| 2j. S. oder 2—3j. verpfl. | 2/0 oder 1/1—1/2 | 8—10 mm | 12,50 | 110,— |
| 2j. S. oder 2—3j. verpfl. | 2/0 oder 1/1—1/2 | 10—12 mm | 15,50 | 140,— |

## II. Vegetativ vermehrbare Unterlagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Malus EM. II** (Echter Doucin), **EM. IV** (Holsteiner Doucin), **EM. IX** (Gelber Metzer Paradies) | | | | |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 6—7 mm | 8,— | 65,— |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 7—9 mm | 10,— | 85,— |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 9—12 mm | 11,50 | 100,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 6—8 mm | 10,50 | 90,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 8—10 mm | 13,50 | 120,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 10—12 mm | 15,50 | 140,— |
| **Malus EM. I** (Breitbl. engl. Paradies), **EM XI** (Grüner Doucin) | | | | |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 6—7 mm | 7,— | 55,— |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 7—9 mm | 8,50 | 70,— |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 9—12 mm | 10,— | 85,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 6—8 mm | 9,— | 75,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 8—10 mm | 11,50 | 100,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 10—12 mm | 13,50 | 120,— |
| **Quitte EM. A** auf Anfrage | | | | |
| **Pflaume,** Kroosjes, Prunus Ackermann (Marunke) | | | | |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 7—9 mm | 17,50 | 160,— |
| 1jähr. Abrisse | —1/0 | 9—12 mm | 20,— | 185,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 6—8 mm | 17,— | 155,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 8—10 mm | 21,50 | 200,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 10—12 mm | 24,— | 225,— |
| **Pflaume,** Brompton. | | | | |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 6—8 mm | 24,— | 225,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 8—10 mm | 27,50 | 260,— |
| 2jähr. verpflanzt | —1/1 | 10—12 mm | 30,— | 285,— |
| **Stachelbeere und Johannisbeere** | | | | |
| Ribes aureum (Brechts Erfolg) | | Höhe ca. cm | | |
| 1—2jähr. bew. Abrisse | —1/0 | 100—120 | 12,50 | 110,— |
| 1—2jähr. bew. Abrisse | —1/0 | 120—140 | 16,50 | 150,— |
| 1—2jähr. bew. Abrisse | —1/0 | 140 und höher | 19,— | 175,— |
| Ribes divaricata (arboreum) | | | | |
| 1—2jähr. bew. Steckl. | 0/1/0 | 120—140 | 21,50 | 200,— |
| 1—2jähr. bew. Steckl. | 0/1/0 | 140 und höher | 24,— | 225,— |

## III. Rosenveredlungsunterlagen

**Preisgruppe I**

Rosa canina, Bröghs, laxa, multiflora, rubiginosa, Schmidts Ideal, stachell. multiflora.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 2—3 mm | 2,50 | 8,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 2—4 mm | 3,— | 12,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 3—4 mm | 3,50 | 20,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 3—5 mm | 4,50 | 30,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 5—8 mm | 6,50 | 50,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 4—6 mm | 5,50 | 40,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 6—8 mm | 7,— | 55,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 8—12 mm | 8,50 | 70,— |

| Altersbezeichnungen | Neue Jungpflanzen-Altersbezeichnungen | Durchm. | DM per 100 St. | DM per 1000 St. |
|---|---|---|---|---|
| **Preisgruppe I I** | | | | |
| Rosa canina inermis, multiflora stachellose Koopmann II (beste winterharte Sorte, die hervorragend die Veredlungen annimmt), Pfänders, Heinsohns Rekord. | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 2—3 mm | 2,50 | 10,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 2—4 mm | 3,— | 14,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 3—4 mm | 4,— | 25,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 3—5 mm | 5,50 | 40,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 5—8 mm | 7,50 | 57,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 4—6 mm | 6,50 | 50,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 6—8 mm | 8,— | 65,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 8—12 mm | 9,50 | 80,— |
| Rosa multiflora stachellos. | | | | |
| 1jähr. bew. Steckl. | 0/1/0 | 4—6 mm | 6,— | 45,— |
| 1jähr. bew. Steckl. | 0/1/0 | 6—10 mm | 7,— | 55,— |
| **Preisgruppe III** | | | | |
| Rosenwildstämme | | | | |
| Veredlungshöhe 80—100 cm | | | 30,— | 275,— |
| „ 100—120 cm | | | 39,— | 350,— |
| „ 120—140 cm | | | 45,— | 400,— |
| „ 140—160 cm | | | 60,— | 550,— |
| „ 160—200 cm | | | 66,— | 600,— |

# IV. Clematisveredlungsunterlagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Clematis vitalba** | | | | |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 3—4 mm | 6,20 | 50,— |
| 1jähr. Sämlinge | 1/0 | 4—6 mm | 9,50 | 82,— |

# V. Koniferenveredlungsunterlagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abies,** Tanne | | | | |
| alba (pectinata) | | | | |
| 6jähr. 2 × verpflanzt | 2/2/2 | 8—10 mm | 30,— | |
| nordmanniana | | | | |
| 6jähr. 2 × verpflanzt | 2/2/2 | 8—10 mm | 40,— | |
| **Cedrus,** Zeder | | | | |
| deodara | | | | |
| 4jähr. verpfl. Säml. | 2/2 | 8—10 mm | 45,— | |
| **Chamaecyparis,** Scheinzypresse | | | | |
| lawsoniana | | | | |
| 3jähr. verpfl. Säml. | 2/1 | 4—6 mm | 15,— | 135,— |
| 3jähr. verpfl. Säml. | 2/1 | 6—8 mm | 18,— | 160,— |
| laws. ellwoodii (Unterlage für obtusa-Varietäten) | | | | |
| 4jähr. verpfl. Stecklinge | 0/2/2 | 6—8 mm | 35,— | |
| **Juniperus,** Wacholder | | | | |
| virginiana | | | | |
| 3jähr. verpfl. Säml. | 2/1 | 4—6 mm | 20,— | |
| 3jähr. verpfl. Säml. | 2/1 | 6—8 mm | 30,— | |
| **Picea,** Fichte | | | | |
| excelsa (abies) | | | | |
| 3jähr. verpfl. Sämlinge | 2/1 | 6—8 mm | 8,50 | 75,— |
| 3jähr. verpfl. Sämlinge | 2/1 | 8—10 mm | 10,— | 90,— |
| pungens | | | | |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 6—8 mm | 15,— | 135,— |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 8—10 mm | 20,— | 180,— |
| **Pinus,** Kiefer | | | | |
| montana (Unterlage für 2—3nadelige Arten und Varietäten) | | | | |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 6—8 mm | 10,— | 90,— |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 8—10 mm | 15,— | 135,— |
| strobus (Unterlage für 5nadelige Arten und Varietäten) | | | | |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 8—10 mm | 15,— | 135,— |
| **Taxus,** Eibe | | | | |
| baccata | | | | |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 6—8 mm | 50,— | 450,— |
| **Thuja,** Lebensbaum | | | | |
| occidentalis | | | | |
| 4jähr. verpfl. Sämlinge | 2/2 | 6—8 mm | 13,— | 120,— |

# Alphabetische Zusammenstellung der Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten unserer wichtigsten Gehölze und Koniferen

## *A. Besondere Eigenschaften*

### 1. Buntlaubige Gehölze und Koniferen:

**Gehölze:**

Acer japonica aurea — Acer laetum rubrum — Acer negundo Varietäten — Acer palmatum Varietäten — Acer plat. drummondii — Acer plat. reitenbachii — Acer plat. schwedleri — Acer pseudoplatanus Varietäten — Acer saccharinum lutescens — Actinidia kolomikta — Alnus incana aurea — Berberis thunb. atropurpurea — Betula verrucosa purpurea — Buxus jap. aurea — Calluna vulg. aurea — Cornus alba Varietäten — Corylus avellana aurea — Corylus maxima atropurpurea — Corylus Rotblättrige Zellernuß — Cotinus coggygria rubrifolia — Elaeagnus in Arten — Evonymus radic. arg. var. — Fagus silvatica atropurpurea macrophylla — Fagus silvatica zlatia — Ilex aquifolium White (Golden) Queen — Malus floribunda purpurea — Populus alba Varietäten — Salix alba argentea — Salix incana — Salix repens argentea — Sambucus canadensis lutea — Sorbus aria lutescens — Symphoricarpus orb. aureo varieg. — Tilia tomentosa — Ulmus camp. damp. wredei.

**Koniferen:**

Abies arizonica — Abies concolor — Cedrus atlantica glauca — Cham. laws. Silver Queen — Cham. laws. stewartii — Cham. pis. aurea — Cham. pis. plumosa aurea — Cham. pis. squarrosa sulphurea — Juniperus chin. Blaauw's Varietät — Juniperus chin. pfitz. aurea — Juniperus hor. glauca — Juniperus squamata meyeri — Juniperus virg. glauca — Picea orientalis aureo-spicata — Picea pung. glauca u. Vg. — Pinus parviflora glauca — Pinus silv. wateriana — Taxus fast. aureo-marginata — Taxus bacc. washingtonii — Thuja occ. albo spica — Thuja occ. aurea compacta — Thuja ellw. Rheingold — Thuja plicata aurescens.

### 2. Gehölze mit schönen Herbstfärbungen:

Acer ginnala — Acer laetum rubrum — Acer negundo — Acer palmatum Varietäten — Acer platanoides Varietäten — Acer saccharinum — Aesculus hippocastanum — Amelanchier Arten — Azalea pontica u. Hybriden — Berberis thunbergii — Berberis wilsoniae — Betula Arten — Catalpa Arten — Cercidiphyllum — Cornus florida — Cornus tat. sibirica — Cotoneaster Arten — Crataegus carrierei — Crataegus coccinea — Crataegus prunifolia — Evonymus alata — Evonymus planipes — Fraxinus excelsior aurea — Ginkgo — Gleditsia — Hamamelis Arten — Koelreuteria — Larix — Liriodendron — Liquidambar — Mahonia aquifolium — Malus cor. charlottae — Parrotia — Parthenocissus Arten — Quercus coccinea — Quercus palustris — Quercus rubra — Rhus Arten — Ribes floridum — Rosa virginiana — Spiraea prunifolia plena — Viburnum opulus — Viburnum tomentosum und Varietäten — Vitis coignetiae.

### 3. Immergrüne Gehölze:

Andromeda floribunda — Andromeda japonica — Arundinaria murielae — Aukuba japonica — Azalea amoena — Azalea hatsugiri — Azalea hinodegiri — Azalea hinemayo — Berberis buxifolia nana — Berberis candidula — Berberis gagnepainii — Berberis hookeri — Berberis julianae — Berberis lologensis — Berberis stenophylla — Berberis verruculosa — Buxus Arten — Calluna Arten — Cotoneaster dammeri — Cotoneaster microphylla — Cotoneaster salicifolia floccosa — Daphne cneorum — Erica Arten — Evonymus radic. arg. var. — Evonymus radicans vegeta — Gaultheria procumbens — Hedera Arten — Helianthemum — Ilex aquifolium Varietäten — Ilex crenata — Ilex fargesii — Ilex pernyi — Kalmia Arten — Ledum Arten — Leucothoe catesbaei — Ligustrum coriaceum — Lonicera nitida — Lonicera pileata u. yunnanensis — Mahonia — Osmanthus illicifolia — Pachysandra terminalis — Pernettya mucronata — Phillyrea decora — Prunus laur. Varietäten — Pyracantha Arten — Quercus pseudoturneri — Rhododendron Arten und Hybriden — Skimmia Arten — Stranvaesia — Viburnum burkwoodii — Viburnum carlesii — Viburnum juddii — Viburnum rhytidophyllum — Viburnum utile — Vinca Arten.

### 4. Säulenförmig wachsende Gehölze und Koniferen:

**Gehölze:**

Betula verrucosa fastigiata — Carpinus betulus columnaris — Populus berolinensis — Populus nigra fastigiata — Populus simonii fastigiata — Quercus ped. fastigiata — Ulmus camp. dampieri wredei — Ulmus montana fastigiata.

**Koniferen:**

Abies sibirica — Cham. laws. alumii — Cham. laws. ellwoodii — Cham. laws. fletcheri — Cham. laws. monumentalis nova — Cham. laws. wisselii — Cryptomeria japonica — Juniperus comm. hibernica — Juniperus comm. suecica — Juniperus pseudocupressus — Juniperus virg. pyramidalis — Libocedrus decurrens — Taxus bacc. erecta overeynderi — Taxus bacc. fastigiata — Thuja occ. columna — Thuja occ. fastigiata — Thuja occ. pyramidalis — Thuja occ. spiralis — Thuja plicata excelsa.

## 5. Schöne Rindenfärbungen und zierende Korkbildungen:

Acer laetum rubrum — Acer pennsylvanicum — Alnus incana aurea — Betula koehnei — Betula maximowicziana — Betula nigra — Betula papyrifera — Cornus flaviramea — Cornus kesselringii — Cornus tatarica sibirica — Corylus colurna — Evonymus alata — Liquidambar — Platanus acerifolia — Populus alba bolleana — Populus alba nivea — Prunus piss. nigra — Rubus lasiostylus — Rubus phoenicolasius — Salix daphnoides pommeranica mas — Salix pendulifolia — Salix purpurea — Ulmus campestris.

## 6. Schöne Wuchsformen und dekorative Belaubung:

Acer ginnala — Acer japonica Varietäten — Acer palmatum Varietäten — Acer saccharinum wieri — Aesculus parviflora — Aesculus pavia — Ailantus altissima — Amelanchier Arten — Andromeda Arten — Aralia chin. mandschurica — Berberis in immergrünen Arten — Betula Arten — Buddleia alternifolia — Castanea sativa — Catalpa Arten — Cercidiphyllum jap. — Chionanthus virg. — Cladrastis lutea — Cornus alternifolia — Cornus florida — Cornus kousa — Cornus mas — Corylopsis Arten — Corylus colurna — Cotinus Arten — Cotoneaster Arten — Crataegus carrierei — Decaisnea farg. — Enkianthus camp. — Evonymus alata — Exochorda Arten — Forsythia susp. fortunei — Gleditsia triacanthos — Halesia Arten — Hamamelis Arten — Holodiscus Arten — Hydrangea petiolaris — Ilex fargesii — Ilex pernyi — Juglans nigra — Juglans sieboldiana cordiformis — Koelreuteria pan. — Kolkwitzia amabilis — Ligustrum regelianum — Liquidambar — Liriodendron tulipifera — Lonicera korolkowii floribunda — Lonicera maackii — Maackia amurensis — Malus Arten — Parrotia persica — Paulownia tom. — Prunus albo rosea — Prunus incisa moerheimii — Prunus Shidare Sakura — Prunus laur. zabeliana — Pterocarya Arten — Quercus pseudoturneri — Rhus Arten — Rubus henryi — Salix alba — Sambucus nigra laciniata — Sophora jap. — Sorbaria Arten — Sorbus foliolosa — Spiraea prunifolia plena — Stephanandra incisa — Syringa swegiflexa — Viburnum rhytidophyllum — Viburnum tomentosum Varietäten — Vitis coignetiae — Zenobia pulverulenta.

## 7. Schönfrüchtige Gehölze und Koniferen:

**Gehölze:**

Alnus incana aurea — Berberis aggregata — Berberis polyantha — Berberis notabilis — Berberis vernae — Berberis wilsoniae — Celastrus orbiculata — Chaenomeles japonica — Clematis recta hybrida — Clematis tangutica — Cornus florida — Cornus mas — Cornus tatarica sibirica — Cotinus coggygria — Cotoneaster bullata — Cotoneaster dielsiana — Cotoneaster divaricata — Cotoneaster frigida vicaryi — Cotoneaster horizontalis — Cotoneaster multiflora — Cotoneaster praecox — Cotoneaster rotundifolia — Cotoneaster salicifolia floccosa — Cotoneaster salicifolia rugosa — Crataegus carrierei — Crataegus coccinea — Crataegus prunifolia — Daphne mezereum — Decaisnea fargesii — Evonymus alata — Evonymus europaea — Evonymus planipes — Evonymus radicans vegeta — Hippophae rhamnoides — Ilex Arten — Lonicera coerulea — Lonicera maackii — Lycium europaeum — Malus Arten — Pterocarya fraxinifolia — Pyracantha Arten — Rhus Arten — Rosa multibracteata — Rosa rugosa — Rosa setipoda — Rubus phoenicolasius — Sambucus canad. maxima — Sambucus racemosa — Skimmia Arten — Sorbus aucuparia — Sorbus aucuparia moravica — Sorbus latifolia — Symphoricarpus Arten — Stranvaesia davidiana — Viburnum opulus — Viburnum lantana.

**Koniferen:**

Abies Arten — Cedrus Arten — Juniperus virg. canaertii — Juniperus virg. glauca — Picea excelsa — Picea orientalis — Pinus cembra — Pinus excelsa — Pinus nigra austriaca — Pinus parviflora glauca — Sequoia gigantea — Taxus Arten.

## 8. Trauer- und Hängeformen:

**Gehölze:**

Acer saccharinum wieri — Betula verr. tristis — Betula verr. youngii — Fagus silvatica pendula — Fraxinus excelsior pendula — Malus Elise Rathke — Prunus Shidare Sakura — Salix vitellina pendula nova.

**Koniferen:**

Cedrus deodara — Cham. laws. intertexta — Cham. laws. nootkatensis pendula — Taxus dovastonii pendula — Thuja standishii — Tsuga canadensis.

# B. Verwendungsmöglichkeiten:

## 1. Blühkalender

**Januar:** Ende — Hamamelis japonica — Hamamelis mollis — Hamamelis japonica zuccariniana — Salix Arten.

**Februar:** Jasminum nudiflorum

**März:** Mitte — Erica carnea i. Sorten — Daphne mezereum — Cornus mas — Rhododendron praecox — Erica mediterranea — Andromeda japonica — Corylopsis pauciflora und a. Arten.

**April:** Mitte — Forsythien i. Arten — Ribes sanguineum, aureum — Magnolia stellata — Andromeda floribunda — Rubus spectabilis — Vinca — Prunus, frühblühend wie cerasifera, subhirtella, incisa moerheimii usf. — Skimmia — Rhododendron, kleinbleibende Arten und Formen wie makinoi, williamsianum, hippophaeoides usf. — Paulownia tomentosa — Lonicera ledebouri, involucrata — Prunus, mittelfrühe wie Shidare Sakura, triloba usf. — Spiraea prunifolia — Chaenomeles in Arten und Varietäten — Viburnum burkwoodii, carlesii, juddii — Prunus, späte wie Hisakura, nana georgica usf. — Magnolia kobus — Amelanchier in Arten — Spiraea arguta — Fothergilla major — Magnolia speciosa, soulangeana — Sambucus racemosa — Mahonia aquifolium

**Mai:** Mitte — Clematis alpina — Ledum palustre, groenlandicum — Daphne cneorum — Cytisus ratisbonensis — Azalea i. Arten u. Formen — Prunus padus — Malus in Arten und Sorten — Rhodotypus kerrioides — Berberis in Arten und Sorten — Potentilla in Arten — Spiraea vanhouttei — Cytisus praecox — Exochorda in Arten — Staphylea colchica — Colycanthus floridus — Caragana arborescens — Staphylea pinnata — Iberis sempervirens — Crataegus in Arten — Kerria japonica — Lonicera xylosteum — Prunus glandulosa plena — Halesia — Aesculus carnea, hippocastanum — Cercis siliquastrum — Cytisus decumbens — Sorbus aucuparia — Syringen — Rosa, frühblühende wie Frühlingsgold, Austrian Yellow usf. — Berberis, frühblühende z. B. vernae, lycium — Cornus alba sibirica — Laburnum in Arten — Viburnum, mittelfrühe wie tomentosum, rhytidophyllum — Cotoneaster in Arten — Wistaria sinensis — Rhododendron, immergrüne, großblumige — Nepeta mussinii — Viburnum, späte wie opulus usf. — Dryas — Leucothoe in Arten — Genista radiata — Lonicera tatarica, maackii — Robina in Arten — Kolkwitzia amabilis — Chionanthus virginica — Enkianthus campanulatus — Physocarpus opulifolius — Rosa rugosa, omeiensis usf. — Akebia quinata — Aesculus pavia nana — Cytisus scoparius in Sorten — Hydrangea petiolaris — Weigela in Arten und Sorten — Stephanandra incisa — Lonicera spinosa albertii, morrowii, korolkowii florib. — Deutzia gracilis — Syringa reflexa, swegiflexa usf. — Genista sagittalis — Kalmia angustifolia — Helianthemum in Arten und Sorten — Lycium in Arten

**Juni:** Mitte — Clematis montana — Zenobia pulverulenta — Rubus odoratus — Rosen — Clematis, großblumige — Kalmia latifolia — Liriodendron tulipifera — Pernettya mucronata — Stranvaesia davidiana — Pyracantha in Arten und Sorten — Deutzia in Arten und Sorten — Philadelphus in Arten und Sorten — Escallonia hybr. — Cotinus coggygria — Syringa amurensis japonica — Sorbaria in Arten — Ligustrum in Arten — Actinidia in Arten — Spiraea margaritae, nobleana, bum. Ant. Waterer, bum. froebelii — Catalpa in Arten — Genista tinctoria — Colutea arborescens — Hypericum in Arten und Sorten — Symphoricarpus — Ailantus — Cytisus supinus — Ceanothus hybr. in Sorten — Lonicera, schlingende — Decaisnea — Lavandula officinalis — Clematis recta, tangutica — Cladrastis

**Juli:** Mitte — Holodiscus discolor — Cornus alternifolia — Hydrangea in Arten und Sorten — Erica tetralix — Hypericum — Buddleia in Arten und Sorten — Callicarpa giraldiana — Amorpha fruticosa — Indigofera gerardiana — Calluna vulg. tenuis — Calluna vulg. tetragona — Rhus — Cornus amomum — Lespedeza — Tamarix in Arten — Campsis — Calluna in Arten und Sorten — Hibiscus syriacus in Sorten — Clethra alnifolia

**August:** Koelreuteria — Sophora — Polygonum — Aralia — Erica vagans in Sorten — Caryopteris

**September:** Calluna vulg. H. E. Beale

**Oktober:** Hamamelis virginiana

## 2. Bienennährpflanzen:

**Acer platanoides** — Acer plat. reitenbachii — **Acer pseudoplatanus** — Acer saccharinum — **Aesculus** — Ailantus — Amelanchier — Amorpha — Azalea mollis — Azalea pontica — Azalea amoena — **Berberis** — Buxus — **Calluna** — **Caragana** — **Castanea** — Catalpa — Cercis — **Chaenomeles** — **Colutea** — **Cornus mas** — **Corylus avellana** — **Cotoneaster** — Crataegus coccinea — Cytisus — Daphne mezereum — Dryas — Elaeagnus angustifolia — **Erica** — Exochorda — **Forsythia** — Genista — **Hedera helix (hibernica)** — Ilex aquifolium — **Laburnum** — **Ligustrum** — **Lonicera** — **Mahonia aquifolium** — **Malus** — Paulownia — **Philadelphus** — Populus — Potentilla — **Prunus (Blütenkirschen)** — Prunus spinosa — **Rhamnus** — Rhododendron ferrugineum — **Robinia** — **Rubus (Himbeere)** — **Salix** — **Sophora** — Sorbaria — Sorbus — Stephanandra tanakae — Stranvaesia — **Symphoricarpus** — **Syringa** — **Tilia** — Viburnum — Wistaria — Außerdem **einfachblühende Rosen** sowie sämtliche **Obstgehölze.**

## 3. Bodenbedeckungspflanzen und Pflanzen mit kriechendem Wuchs:

**Gehölze:**

Calluna Arten und Sorten — Cotoneaster adpressa — Cotoneaster dammeri — Cotoneaster dammeri radicans — Daphne cneorum — Dryas octopetala — Dryas suendermannii — Erica Arten — Evonymus nana koopmannii — Evonymus radicans — Evonymus radicans minima — Evonymus radicans vegeta — Gaultheria procumbens — Hedera helix conglomerata — Helianthemum — Hypericum in Arten — Iberis — Pachysandra terminalis — Potentilla fruticosa mandschurica — Salix simulatrix — Vinca minor.

**Koniferen:**

Juniperus comm. hornibrookii — Juniperus comm. repanda — Juniperus horizontalis — Juniperus horizontalis douglasii — Juniperus horizontalis glauca — Juniperus horizontalis plumosa — Juniperus virg. reptans.

## 4. Deckgehölze und Deckkoniferen für größere Anlagen:

**Gehölze:**

Acer campestre — Alnus glutinosa — Alnus incana — Betula pubescens — Betula verrucosa — Caragana arborescens — Carpinus — Chaenomeles lagenaria — Colutea arborescens — Cornus alba — Cornus sanguinea — Corylus avellana — Cotoneaster in hochw. Sorten — Crataegus monogyna — Deutzia in starkw. Sorten — Elaeagnus angustifolia — Evonymus europaea — Fagus silvatica — Forsythia interm. spectabilis — Fraxinus excelsior — Hippophae — Laburnum vulgare u. alpinum — Ligustrum vulgare — Lonicera tatarica — Lonicera xylosteum — Lycium ch. ovatum — Malus communis — Malus sargentii — Physocarpus — Populus in Arten — Prunus avium — Prunus cerasifera — Prunus mahaleb — Prunus serotina — Prunus spinosa — Prunus virginiana — Quercus pedunculata — Quercus rubra — Rhamnus cathartica — Rhamnus frangula — Ribes aureum — Ribes divaricatum — Robinia pseudoacacia — Rosa blanda — Rosa canina — Rosa multiflora — Rosa rubiginosa — Rosa rugosa — Rubus fruticosa — Rubus spectabilis — Salix Arten — Sambucus Arten — Sorbus aucuparia — Spiraea in starkw. Sorten — Symphoricarpus racemosus — Syringa vulgaris — Tamarix parviflora — Tilia Arten — Ulmus camprestris — **Ulmus pumila arborea!** — Viburnum opulus.

**Koniferen:**

Larix Arten — Picea excelsa — Picea glauca — Picea pungens — Picea sitchensis — Pinus montana — Pinus silvestris — Pseudotsuga taxifolia.

## 5. Gehölze und Koniferen für niedrige Einfassungen: (bis 70 cm hoch)

**Gehölze:**

Berberis buxifolia nana — Berberis thunbergii atrop. nana — Berberis wilsoniae — Berberis in immergrünen Sorten — Buxus suffruticosa — Cotoneaster adpressa — Cotoneaster dammeri — Cotoneaster praecox hessei — Dryas octopetala — Erica carnea Varietäten — Evonymus radicans — Lonicera pileata und yunnanensis — Mahonia — Potentilla arbuscula — Potentilla farreri — Pyracantha Arten — Spiraea albiflora — Spiraea bullata — Spiraea bum. Anth. Waterer — Spiraea bum. froebelii — Teucrium chamaedrys — Vinca Arten.

**Koniferen:**

Pinus montana pumilio — Picea Zwergsorten.

## 6. Gehölze und Koniferen für niedrige Hecken: (70 cm - 2 m hoch)

**Gehölze:**

Berberis thunbergii — Berberis thunbergii atropurpurea — Berberis wilsoniae subcaulialata — Buxus semp. arborescens — Chaenomeles japonica — Cotoneaster acutifolia — Cotoneaster franchetii — Cotoneaster nitens — Cotoneaster zabelii — Deutzia gracilis und niedrige Ar-

ten — Ilex crenata — Ligustrum lodense — Ligustrum regelianum — Mahonia — Neilla affinis — Philadelphus in niedrigen Arten — Potentilla fruticosa — Ribes alpinum — Ribes grossularia — Ribes grossularia uva crispa — Rosa blanda — Rosa rugosa — Rosa spinosissima — Rosa virginiana — Salix purp. nana — Spiraea arguta — Spiraea thunbergii — Stephanandra incisa — Weigela Eva Rathke.

**Koniferen:**

Pinus montana mughus.

## 7. Gehölze und Koniferen für mittelhohe Hecken: (2-4 m hoch)

**Gehölze:**

Acanthopanax pentaphyllus — Amelanchier ovalis — Chaenom. lagenaria — Cotoneaster bullata — Cotoneaster dielsiana — Cotoneaster divaricata — Cotoneaster multiflora — Cotoneaster simonsii — Deutzia in hochwachsenden Arten — Forsythia Arten — Ilex Arten — Ligustrum ovalifolium — Ligustrum vulgare — Lonicera tatarica — Lonicera xylosteum — Malus sargentii — Morus alba — Philadelphus in hochw. Arten — Prunus laur. herbergii — Prunus spinosa — Ribes aureum — Ribes divaricatum — Ribes sang. atrorubens — Rosa multiflora — Rosa rubiginosa — Spiraea in hochw. Arten — Syringa chinensis — Syringa josikaea — Syringa vulgaris und marlyi — Viburnum opulus.

**Koniferen:**

Juniperus chin. pfitzeriana — Taxus bacc. — Taxus bacc. erecta overeynderi.

## 8. Gehölze und Koniferen für hohe Hecken: (3-9 m hoch)

**Gehölze:**

Acer campestre — Carpinus betulus — Cornus mas — Cornus sanguinea — Corylus avellana — Crataegus coccinea — Crataegus monogyna — Crataegus prunifolia — Elaegnus angustifolia — Fagus silvatica — Gleditsia — Pirus pashia — Populus berolinensis — Populus nigra pyramidalis — Prunus cerasifera — Prunus mahaleb — Prunus padus — Prunus serotina — Prunus virginiana — Robina pseudoacacia — Sambucus nigra — Syringa vulgaris — Tilia parvifolia — Ulmus pumila arborea.

**Koniferen:**

Chamaecyparis lawsoniana alumii — Chamaecyparis pisifera — Chamaecyparis pisifera plumosa — Larix decidua — Larix leptolepis — Picea excelsa — Picea glauca — Picea omorika — Picea pungens — Picea sitchensis — Pseudotsuga taxifolia — Thuja occidentalis und Varietäten — Thuja plicata und Varietäten — Tsuga canadensis.

## 9. Gehölze und Koniferen für leicht sandigen Boden:

**Gehölze:**

Ailantus — Alnus incana — Amorpha fruticosa — Berberis Arten — Betula verrucosa — Caragana Arten — Chaenomeles Arten — Colutea Arten — Cytisus Arten — Elaeagnus angustifolia — Fraxinus ornus — Genista tinctoria — Gleditsia triacanthos — Hippophae — Lycium Arten — Potentilla Arten — Prunus serotina — Prunus spinosa — Rhamnus frangula — Ribes divaricatum — Robinia pseudoacacia — Rosa rugosa — Rosa rubiginosa — Rosa spinosissima — Rosa virginiana — Rubus fruticosus — Rubus spectabilis — Spiraea arguta — Symphoricarpus Arten — Tamarix Arten — Viburnum lantana.

**Koniferen:**

Abies concolor — Juniperus comm. Varietäten — Picea excelsa — Picea glauca (alba) — Picea pungens und glauca — Picea sitchensis — Pinus montana — Pinus nigra — Pinus silvestris.

## 10. Gehölze zur Trümmerbegrünung:

Acer platanoides — Ailantus glandulosa — Alnus glutinosa — Ampelopsis quinquefolia — Betula verrucosa — Clematis vitalba — Colutea — Caragana — Crataegus monogyna — Elaeagnus — Hedera helix — Hippophae — Ligustrum vulgare — Lycium europaeum — Populus canadensis — Polygonum aubertii — Populus tremula — Prunus mahaleb — Prunus serotina — Quercus rubra — Rhamnus cathartica — Robinia pseudoacacia — Rosa canina — Rosa rubiginosa — Rosa rugosa — Rubus fruticosus — Rubus spectabilis — Sambucus racemosa — Sorbus aucuparia — Symphoricarpus — Ulmus campestre — Ulmus montana.

## 11. Gehölze zur Bepflanzung und Berankung von Mauern und Laubengängen:

Actinidia arguta — Actinidia kolomikta — Akebia quinata — Aristolochia durior — Campsis — Clematis Arten und Hybriden — Cotoneaster horizontalis — Evonymus radicans vegeta — Hedera Arten — Hydrangea petiolaris — Jasminum nudiflorum — Lonicera Arten — Menispermum — Parthenocissus Arten — Polygonum — Pyracantha Arten — Rosen, Schling- und Kletterrosen — Rubus henryi — Vitis Arten — Wistaria Arten.

## 12. Kleinkronige Alleebäume:

Acer campestre — Acer plat. globosum — Aesculus carnea — Aesculus carnea briotii — Corylus colurna — Crataegus carrierei — Crataegus monogyna kerm. plena — Fraxinus excelsior globosum — Fraxinus ornus — Malus floribunda purpurea — Malus purpurea aldenhamensis — Malus purpurea lemoinei — Prunus Hisakura — Robinia bessoniana — Robinia inermis — Sorbus aucuparia moravica.

## 13. Rauchharte Gehölze und Koniferen für Industriegebiete und Großstädte:

**Nach Erfahrungen von Herrn Gartendirektor i. R. Richard Nose, Witten - Bommern. Erfahrungsgemäß haben sich alle immergrünen Gehölze mit glänzenden Blättern sehr widerstandsfähig gezeigt.**

Acer campestre — Acer ginnala — Acer laetum rubrum — Acer negundo — Acer platanoides — **Acer pseudoplatanus** — Acer saccharinum — Actinidia arguta — Aesculus carnea — Aesculus parviflora — Ailantus altissima — Alnus Arten — Amelanchier Arten — **Andromeda jap. u. floribunda** — Aristolochia durior — Azalea mollis — Azalea pontica — Azalea japonica — Berberis in laubabwerfenden und **in immergrünen Formen** — Betula Arten — Buddleia variabilis — Buxus Arten — Calycanthus — Carpinus betulus — **Castanea sativa** — Catalpa bignonioides — Celastrus — Chaenomeles — Clematis vitalba — Colutea arb. — Cornus alba — Cornus sanguinea — **Corylus avellana — Corylus colurna** — Cotoneaster in laubabwerfenden Arten — **Cotoneaster in immergrünen Arten — Crataegus carrierei** — Crataegus monogyna — Crataegus prunifolia — Deutzia Arten — Elaeagnus angustifolia — Elaeagnus multiflora — Evonymus alata — Evonymus europaea — **Evonymus rad. vegeta** — Fagus silvatica u. Varietäten — Forsythia in Arten — **Fraxinus americana — Fraxinus excelsior — Fraxinus ornus** — Hamamelis Arten — **Hedera helix Formen** — Hydrangea Arten — **Ilex Arten** — Jasminum nudiflorum — **Juglans nigra — Juglans regia — Juglans sieboldiana cordiformis** — Kalmia angustifolia — Kalmia latifolia — Kerria japonica — **Leucothoe catesbaei — Ligustrum Arten — Liquidambar** — Liriodendron — Lonicera Arten — Lonicera heckrottii — **Lonicera henryi — Lonicera periclymenum** — Magnolia kobus — Magnolia stellata — Magnolia soulangeana — **Mahonia** — Malus Arten — Morus alba — Pachysandra — Parrotia — Parthenocissus — **Philadelphus Arten — Physocarpus — Platanus acerifolia — Populus Arten — Prunus avium — Prunus laurocerasus Varietäten** — Prunus padus — **Prunus serotina** — Prunus triloba — Prunus Zierkirschen in Sorten — Pterocarya — Pyracantha Arten — Quercus coccinea — Quercus palustris — **Quercus rubra** — Rhamnus Arten — Rhododendron Hybriden, davon **am besten catawbiense und Caractacus** — Rhus Arten — Ribes alpinum — **Robinia Arten** — Rosen in Wildarten — **Rosen in Sorten mit glänzenden Blättern** — Rubus laciniata — Rubus odoratus — Salix Arten — **Sambucus nigra** — Sambucus racemosa — Sorbaria — Sorbus aucuparia — **Sorbus suecica** — Spiraea Arten — Stephanandra Arten — Symphoricarpus Arten — Syringa chinensis — **Syringa reflexa — Tilia tomentosa** — Viburnum burkwoodii — Viburnum carlesii — **Viburnum lantana** — Viburnum lentago — **Viburnum opulus** — Viburnum rhytidophyllum — Vinca minor — Weigela Arten — Wistaria.

**Koniferen:**

**Abies concolor** — Abies nordmanniana — Chamaecyparis Arten — Juniperus sabina — Juniperus chin. pfitzeriana — Larix Arten — Picea omorika — Picea orientalis — Picea pungens und glauca — **Pinus nigra austriaca** — Pinus montana — Pseudotsuga dougl. — **Taxus baccata.**

## 14. Schattenverträgliche Gehölze und Koniferen:

**Gehölze:**

Acer campestre — Alnus — Amelanchier — Andromeda — Aukuba — Buxus — Carpinus betulus — Clematis — Clethra — Cornus alba — Cornus mas — Cornus sanguinea — Corylus avellana — Crataegus monogyna — Enkianthus — Evonymus europaea — Fraxinus ornus — Gaultheria — Hypericum — Ilex — Kalmia — Kerria — Ledum — Leucothoe — Ligustrum — Lonicera — Mahonia — Osmanthus — Pachysandra — Parthenocissus — Pernettya — Philadelphus Arten — Phillyrea — Physocarpus — Prunus laurocerasus — Prunus padus — Prunus serotina — Prunus virginiana — Rhamnus — Rhododendron — Ribes alpinum — Ribes sanguineum — Rosa multiflora — Sambucus nigra — Sambucus racemosa — Skimmia — Sorbaria —Sorbus — Spiraea vanhouttei — Stephanandra — Syringa vulgaris — Viburnum lantana — Viburnum opulus — Weigela.

**Koniferen:**

Chamaecyparis obt. nana gracilis — Juniperus horizontalis — Juniperus sabina cupressifolia — Juniperus sabina femina — Juniperus sabina mas — Juniperus sabina tamariscifolia — Picea orientalis — Taxus baccata — Thujopsis dolabrata — Tsuga canadensis.

## 15. Gehölze für Treiberei und Dekorationszwecke:

**B** = Blüte zierend, **F** = Früchte zierend, **L** = Laub zierend

**a) für Treiberei:**

Acer japonicum, **L** — Acer negundo in buntblättrigen Varietäten, **L** — Aesculus,**B, L** — Amelanchier, **B** — Berberis stenophylla, **B** — Betula jap. mandschurica, **L** — Cytisus praecox, **B** — Deutzia gracilis, **B** — Deutzia lemoinei-Formen, **B** — Erica carnea-Formen, **B** — Forsythia, **B** — Jasminum, **B** — Laburnum, **B** — Magnolia stellata, **B** — Malus hillieri, scheideckeri, **B** — Prunus glandulosa, **B** — Prunus lannesiana - Formen, **B** — Prunus serrulata - Formen, **B** — Prunus subhirtella, **B** — Prunus triloba plena, **B** — Rhododendron, **B** — Rosen, **B** — Spiraea arguta, **B** — Spiraea prunifolia plena, **B** — Spiraea thunbergii, **B** — Syringa, **B** — Viburnum opulus sterile, **B** — Viburnum tomentosum, **B** — Wistaria, **B.**

**b) für Dekorationszwecke:**

Alnus incana aurea, **B** — Amelanchier, **B** — Berberis, **F** — Buddleia, **B** — Celastrus, **F** — Chaenomeles, **B, F** — Clematis, großblumige, **B** — Clematis tangutica, **F** — Callicarpa, **F** — Cotinus, **F** — Corylopsis, **B** — Cotoneaster, **F** — Crataegus, **B, F** — Cytisus praecox, **B** — Decaisnea, **F** — Deutzia, gefüllte Sorten, **B** — Erica carnea, **B** — Evonymus, **F** — Hamamelis, **B** — Hippophae, **F** — Holodiscus, **B** — Hydrangea arb. grandflora, **B** — Hypericum, **B** — Ilex, **F** — Kerria jap. plena, **B** — Laburnum, **B** — Malus (Zieräpfel) **B, F** — Magnolia, **B** — Philadelphus, großblumige Sorten, **B** — Prunus in großblumigen Sorten, **B** — Pyracantha, **F** — Rhododendron, **B** — Salix, **B** — Sorbus, **F** — Spiraea, Frühblüher, **B** — Symphoricarpus, **F** — Syringa, **B** — Tamarix, **B** — Viburnum opulus, **F** — Vib. opulus sterile, **B** — Vib. tomentosum sterile, **B** — Weigela styriaca, **B.**

## 16. Vogelschutz- und Nährgehölze:

Acer campestre — Acer plat. globosum — Berberis Arten — Carpinus betulus — Chaenomeles Arten — Clematis vitalba — Colutea — Cotoneaster Arten — Crataegus coccinea — Crataegus monogyna — Crategus prunifolia — Evonymus europaea — Fagus silvatica — Gleditsia triacanthos — Hedera helix — Hippophae rhamnoides — Ilex Arten — Lonicera Arten — Pirus malus — Prunus mahaleb — Prunus serotina — Prunus spinosa — Prunus virginiana — Quercus pedunculata — Rhamnus frangula — Ribes divaricatum — Robinia pseudoacacia — Rosa rugosa — Rubus spectabilis — Sambucus Arten — Sorbus aucuparia — Symphoricarpus Arten — Syringa vulgaris.

## 17. Windschutzgehölze (Bodenschutzgehölze) und -koniferen:

**Gehölze:**

Acer platanoides — Alnus glutinosa — Betula verrucosa — Carpinus betulus — Chaenomeles lagenaria — Corylus avellana — Crataegus monogyna — Evonymus europaea — Fagus silvatica — Fraxinus excelsior — Hippophae rhamnoides — Ligustrum vulgare — Ligustrum vulgare glaucum — Lycium europaeum — Malus sargentii — Populus alba nivea — Populus canadensis — Populus tremula — Prunus mahaleb — Prunus myrobalana — Prunus serotina — Prunus padus — Quercus pedunculata — Rhamnus frangula — Ribes divaricatum — Robinia pseudoacacia — Rosa rugosa — Rubus spectabilis — Salix alba — Salix aurita — Salix daphnoides — Salix nigricans — Salix viminalis — Sambucus canadensis — Sorbus aucuparia — Sorbus suecica — Syringa vulgaris — Tilia parvifolia — Ulmus campestris — Ulmus pumila arborea.

**Koniferen:**

Picea alba (P. canadensis) — Picea pungens und pungens glauca — Picea sitchensis — Pinus montana und montana mughus — Pinus nigra — Pinus silvestris.

*Unsere Firma ist vom Bund deutscher Baumschulen als QUALITÄTSBAUMSCHULE anerkannt und zur Führung des gesetzlich geschützten Markenetiketts, welches die Gewähr für gute Qualität und Sortenechtheit bietet, berechtigt.*

# Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen
## 50—1000 kg und 50—1000 km

| km | 50 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 500 kg | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.30 | 3.60 | 5.20 | 6.60 | 8.20 | 9.20 | 11.20 | 12.40 | 13.50 | 13.50 | 50 |
| 100 | 3.40 | 5.70 | 8.20 | 10.80 | 13.50 | 15.50 | 18.30 | 20.50 | 22.60 | 22.60 | 100 |
| 150 | 4.— | 7.30 | 10.40 | 13.70 | 17.— | 19.50 | 23.40 | 26.— | 28.50 | 28.50 | 150 |
| 200 | 5.10 | 9.20 | 13.50 | 17.70 | 22.20 | 25.70 | 30.70 | 34.20 | 37.50 | 37.50 | 200 |
| 250 | 5.70 | 10.40 | 15.30 | 20.— | 25.50 | 29.40 | 35.10 | 38.90 | 42.90 | 42.90 | 250 |
| 300 | 6.60 | 12.40 | 18.10 | 23.80 | 30.— | 34.60 | 41.60 | 46.20 | 50.50 | 50.50 | 300 |
| 350 | 7.— | 13.50 | 19.50 | 26.— | 32.90 | 37.70 | 45.50 | 50.60 | 55.30 | 55.30 | 350 |
| 400 | 7.90 | 15.— | 22.10 | 29.10 | 36.90 | 42.60 | 51.10 | 56.70 | 62.— | 62.— | 400 |
| 450 | 8.50 | 16.— | 23.40 | 30.90 | 39.10 | 45.40 | 54.50 | 60.30 | 66.— | 66.— | 450 |
| 500 | 9.10 | 17.30 | 25.50 | 33.70 | 42.80 | 49.40 | 59.30 | 66.— | 72.30 | 72.30 | 500 |
| 550 | 9.60 | 18.20 | 27.20 | 35.80 | 45.40 | 52.40 | 62.80 | 69.90 | 76.30 | 76.30 | 550 |
| 600 | 10.10 | 19.20 | 28.50 | 37.60 | 47.60 | 55.10 | 66.— | 73.30 | 80.40 | 80.40 | 600 |
| 650 | 10.40 | 20.— | 29.60 | 39.10 | 49.50 | 57.30 | 68.80 | 76.40 | 83.60 | 83.60 | 650 |
| 700 | 10.90 | 20.90 | 30.70 | 40.80 | 51.90 | 59.80 | 71.90 | 79.80 | 87.30 | 87.30 | 700 |
| 750 | 11.20 | 21.50 | 31.70 | 42.— | 53.30 | 61.50 | 74.— | 82.— | 89.90 | 89.90 | 750 |
| 800 | 11.40 | 21.80 | 32.50 | 43.— | 54.60 | 63.10 | 75.50 | 84.— | 92.— | 92.— | 800 |
| 850 | 11.60 | 22.20 | 33.— | 43.70 | 55.60 | 64.20 | 76.80 | 85.50 | 93.80 | 93.80 | 850 |
| 900 | 11.80 | 22.80 | 33.70 | 44.60 | 56.40 | 65.40 | 78.40 | 87.10 | 95.30 | 95.30 | 900 |
| 950 | 11.80 | 22.90 | 34.20 | 45.40 | 57.60 | 66.40 | 79.70 | 88.80 | 96.90 | 96.90 | 950 |
| 1000 | 12.40 | 23.80 | 35.10 | 46.50 | 59.— | 68.10 | 81.80 | 90.90 | 99.50 | 99.50 | 1000 |

| km | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 750 kg | 800 kg | 850 kg | 900 kg | 950 kg | 1000 kg | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14.50 | 15.60 | 17.10 | 18.10 | 19.50 | 20.50 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 50 |
| 100 | 24.30 | 25.90 | 28.50 | 30.10 | 32.80 | 34.50 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 100 |
| 150 | 30.60 | 33.10 | 36.30 | 38.40 | 41.60 | 43.80 | 46.— | 46.— | 46.— | 46.— | 150 |
| 200 | 40.30 | 43.— | 47.40 | 50.30 | 54.50 | 57.40 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 200 |
| 250 | 46.10 | 49.30 | 54.30 | 57.40 | 62.40 | 65.50 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 250 |
| 300 | 54.50 | 58.50 | 64.40 | 68.10 | 74.— | 77.80 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 300 |
| 350 | 59.60 | 63.90 | 70.10 | 74.40 | 80.90 | 84.90 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 350 |
| 400 | 66.90 | 71.60 | 78.80 | 83.50 | 90.60 | 95.40 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 400 |
| 450 | 71.30 | 76.30 | 83.80 | 89.— | 96.60 | 101.60 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 106.90 | 450 |
| 500 | 77.80 | 83.50 | 91.60 | 97.10 | 105.50 | 111.— | 117.— | 117.— | 117.— | 117.— | 500 |
| 550 | 82.40 | 88.— | 96.90 | 102.90 | 111.60 | 117.50 | 123.60 | 123.60 | 123.60 | 123.60 | 550 |
| 600 | 86.60 | 92.80 | 102.— | 108.30 | 117.50 | 123.80 | 130.20 | 130.20 | 130.20 | 130.20 | 600 |
| 650 | 90.— | 96.50 | 106.30 | 112.80 | 122.40 | 128.80 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 650 |
| 700 | 94.10 | 100.80 | 110.90 | 117.50 | 127.80 | 134.50 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 700 |
| 750 | 96.60 | 103.90 | 114.10 | 121.— | 131.40 | 138.30 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 750 |
| 800 | 99.10 | 106.10 | 116.90 | 123.90 | 134.50 | 141.50 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | 800 |
| 850 | 100.80 | 108.10 | 118.90 | 126.— | 137.— | 144.10 | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 850 |
| 900 | 102.80 | 110.— | 121.— | 128.50 | 139.40 | 146.80 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 900 |
| 950 | 104.40 | 111.90 | 123.10 | 130.60 | 141.60 | 149.10 | 157.— | 157.— | 157.— | 157.— | 950 |
| 1000 | 107.— | 114.80 | 126.40 | 133.90 | 145.40 | 153.10 | 160.80 | 160.80 | 160.80 | 160.80 | 1000 |

# Ausgerechnete Frachten für Waggon-

| zwischen Elmshorn und | Entfernung km | F 5 Einf. Waggonlad. von 5000 Kilo ℳ | F 10 Waggonlad. von 10000 Kilo ℳ | F Waggonlad. von 15000 Kilo ℳ | zwischen Elmshorn und | Entfernung km | F 5 Einf. Waggonlad. von 5000 Kilo ℳ | F 10 Waggonlad. von 10000 Kilo ℳ | F Waggonlad. von 15000 Kilo ℳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen Eilg | 504 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Friedrichshafen | 875 | 294.15 | 497.70 | 684.15 |
| Altenburg (Thür.) | 444 | 222.10 | 375.90 | 523.— | Fulda | 445 | 225.80 | 383.25 | 527.70 |
| Amberg | 736 | 277.70 | 470.40 | 647.80 | Gelsenkirchen Hbf. | 382 | 204.05 | 347.55 | 478.75 |
| Anklam | 340 | 189.20 | 322.35 | 444.— | Gera Hbf. | 455 | 227.40 | 387.45 | 534.05 |
| Ansbach | 647 | 262.90 | 446.25 | 613.05 | Gießen | 479 | 230.— | 390.60 | 538.80 |
| Augsburg Hbf. | 775 | 283.55 | 479.85 | 660.45 | Görlitz | 531 | 238.— | 404.25 | 556.15 |
| Baden-Baden | 707 | 274.55 | 464.10 | 638.35 | Göttingen | 308 | 175.95 | 300.30 | 413.95 |
| Bad Pyrmont | 264 | 159.— | 270.90 | 371.30 | Gotha | 410 | 213.05 | 362.25 | 500.85 |
| Bamberg | 606 | 255.45 | 432.60 | 597.25 | Hagen Hbf. | 378 | 200.90 | 342.30 | 474.— |
| Basel Bad-Bf. | 867 | 292.55 | 495.60 | 682.55 | Halberstadt | 289 | 168.— | 285.60 | 393.40 |
| Bayreuth Hbf. | 637 | 261.30 | 443.10 | 609.90 | Halle (Saale) | 370 | 199.30 | 340.20 | 467.70 |
| Berlin H. u. L. Bf. | 325 | 184.45 | 315.— | 431.35 | Hamburg Hgbf. | 36 | 38.70 | 66.15 | 90.05 |
| Berlin-Charlb. Gbf. | 319 | 180.20 | 304.50 | 425.— | Hamburg-Altona | 30 | 33.90 | 57.75 | 80.60 |
| Bernburg | 333 | 185.— | 316.05 | 436.10 | Hmbg.-Harburg | 48 | 45.05 | 75.60 | 105.85 |
| Bielefeld Hbf. | 264 | 159.— | 270.90 | 371.30 | Hameln | 245 | 151.60 | 259.30 | 358.65 |
| Bitterfeld | 370 | 199.30 | 340.20 | 467.70 | Hamm (Westf.) | 330 | 185.— | 316.05 | 436.10 |
| Bocholt | 401 | 210.95 | 358.05 | 492.95 | Hanau Hbf. | 533 | 238.— | 404.25 | 556.15 |
| Bochum Hbf. | 381 | 204.05 | 347.55 | 478.75 | Hannover Hgbf. | 198 | 129.85 | 222.60 | 306.50 |
| Bonn | 481 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Heide (Holst.) | 89 | 69.45 | 118.65 | 162.75 |
| Bottrop Hbf. | 388 | 204.60 | 348.60 | 480.30 | Heidelberg Hbf. | 628 | 259.70 | 439.95 | 605.15 |
| Brandenburg Rb. | 297 | 172.80 | 295.05 | 407.65 | Heilbronn Hbf. | 669 | 267.— | 450.45 | 622.50 |
| Braunlage | 384 | 204.05 | 347.55 | 478.75 | Hildesheim Hbf. | 222 | 140.45 | 239.40 | 333.40 |
| Braunschweig Hbf. | 218 | 139.40 | 238.35 | 330.20 | Ingolstadt Hbf. | 753 | 280.90 | 475.65 | 654.15 |
| Bregenz Hbf. | 906 | 296.30 | 501.90 | 690.45 | Innsbruck Hbf. | 953 | 301.05 | 510.30 | 701.50 |
| Bremen Hbf. | 153 | 106.55 | 181.65 | 254.40 | Jena Saalbf. | 452 | 226.30 | 385.35 | 529.30 |
| Bremerhaven (L.) | 161 | 111.30 | 190.05 | 265.45 | Kaiserslautern Hbf. | 663 | 266.60 | 450.45 | 622.50 |
| Celle | 172 | 116.60 | 201.60 | 279.65 | Karlsruhe Hbf. | 674 | 268.20 | 454.65 | 625.70 |
| Chemnitz Hbf. | 485 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Kassel Hbf. | 366 | 198.75 | 339.15 | 466.10 |
| Coburg | 554 | 242.75 | 412.65 | 565.65 | Kempten (All.) Hbf. | 862 | 292.55 | 495.60 | 682.55 |
| Cottbus | 438 | 221.— | 374.85 | 516.65 | Kiel Hbf. | 75 | 61.50 | 105.— | 145.35 |
| Darmstadt Hbf. | 569 | 246.45 | 417.90 | 576.70 | Koblenz Hbf. | 543 | 240.10 | 406.35 | 560.90 |
| Dessau Hbf. | 345 | 189.75 | 324.45 | 445.55 | Köln Hbf. | 459 | 227.40 | 387.45 | 534.05 |
| Dortmund Hbf. | 361 | 195.60 | 332.85 | 458.20 | Köthen | 333 | 185.— | 316.05 | 436.10 |
| Dresden-Altstadt | 497 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Konstanz | 915 | 297.35 | 502.95 | 692.05 |
| Düren | 484 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Krefeld | 423 | 217.30 | 368.55 | 510.35 |
| Düsseldorf Hbf. | 423 | 217.30 | 368.55 | 510.35 | Küstrin, Neust. Hbf. | 408 | 212.— | 360.15 | 496.10 |
| Duisburg Hbf. | 401 | 210.95 | 358.05 | 492.95 | Landshut (Bay.) Hbf. | 824 | 289.40 | 490.35 | 674.65 |
| Eckernförde | 106 | 81.65 | 139.65 | 194.35 | Leipzig M.Th.Bf. | 404 | 210.95 | 358.05 | 492.95 |
| Eisenach | 417 | 216.80 | 360.15 | 505.60 | Lindau Hbf. | 898 | 295.20 | 499.80 | 687.30 |
| Erfurt | 425 | 218.35 | 371.70 | 511.95 | Ludwigshafen (Rh) Hbf. | 625 | 259.70 | 439.95 | 605.15 |
| Erlangen | 646 | 262.90 | 446.25 | 613.05 | Ludwigslust | 153 | 106.55 | 181.65 | 254.40 |
| Essen Hbf. | 393 | 206.20 | 350.70 | 485.05 | Lübeck Hbf. | 77 | 62.— | 107.10 | 146.95 |
| Flensburg | 144 | 100.20 | 173.25 | 240.15 | Lüneburg | 85 | 66.25 | 113.40 | 159.60 |
| Frankfurt (M) Hbf. | 543 | 240.10 | 406.35 | 560.90 | Magdeburg Hbf. | 283 | 166.45 | 283.50 | 391.85 |
| Frankfurt (Oder) | 407 | 212.— | 360.15 | 496.10 | Mainz Hbf. | 579 | 248.60 | 421.05 | 579.85 |
| Freiburg (Breisg.) | 806 | 286.75 | 486.15 | 669.90 | Mannheim Hbf. Eilg | 624 | 259.70 | 439.95 | 605.15 |

# ladungen. Gültig für lebende Pflanzen.

| zwischen Elmshorn und | Entfernung km | F 5 Einf. Waggonlad. von 5000 Kilo ℳ | F 10 Waggonlad. von 10000 Kilo ℳ | F Waggonlad. von 15000 Kilo ℳ | zwischen Elmshorn und | Entfernung km | F 5 Einf. Waggonlad. von 5000 Kilo ℳ | F 10 Waggonlad. von 10000 Kilo ℳ | F Waggonlad. von 15000 Kilo ℳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiningen | 476 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Salzwedel | 170 | 116.60 | 201.60 | 279.65 |
| Minden (Westf.) | 219 | 139.40 | 238.35 | 330.20 | Schleswig-Altst. | 107 | 81.65 | 139.65 | 194.35 |
| Mühlhausen (Th.) | 370 | 199.30 | 340.20 | 467.70 | Schweinfurt Hbf. | 564 | 244.85 | 415.80 | 573.55 |
| Mülheim (Ruhr) | 399 | 209.35 | 354.90 | 489.80 | Schwerin (Meckl.) Hbf | 157 | 110.25 | 186.90 | 259.15 |
| München Hbf. | 833 | 290.45 | 491.40 | 676.25 | Rostock Hbf. | 211 | 136.75 | 234.15 | 322.35 |
| M.-Gladbach Hbf. | 441 | 222.10 | 375.90 | 523.— | Bad Segeberg | 69 | 56.20 | 96.60 | 134.30 |
| Münster (Westf.) Hbf. | 309 | 175.95 | 300.30 | 413.95 | Soest | 334 | 185.— | 316.05 | 436.10 |
| Nauen | 280 | 166.45 | 283.50 | 391.85 | Soltau (Han.) | 113 | 85.85 | 145.95 | 200.65 |
| Naumburg (Saale) Hbf. | 416 | 216.80 | 360.15 | 505.60 | Staßfurt | 320 | 180.75 | 307.65 | 426.60 |
| Neubrandenburg | 282 | 166.45 | 283.50 | 391.85 | Stendal | 227 | 144.15 | 245.70 | 339.70 |
| Neustadt (Aisch) Bf. | 618 | 257.60 | 434.70 | 600.40 | Stuttgart Hbf. | 721 | 276.65 | 469.35 | 646.25 |
| Neustrelitz Hbf. | 278 | 163.80 | 278.25 | 387.10 | Trier Hbf. | 628 | 259.70 | 439.95 | 605.15 |
| Nordhausen | 347 | 189.75 | 324.45 | 445.55 | Ülzen | 119 | 87.45 | 149.10 | 208.55 |
| Nürnberg Hbf. | 659 | 264.50 | 448.35 | 617.80 | Ulm Hbf. | 772 | 283.55 | 479.85 | 660.45 |
| Offenbach (Main) | 546 | 241.70 | 408.45 | 564.05 | Weimar | 446 | 225.80 | 383.25 | 527.70 |
| Oldenburg (Oldb) | 199 | 129.85 | 222.60 | 306.50 | Weißenfels | 402 | 210.95 | 358.05 | 492.95 |
| Oldesloe | 53 | 49.30 | 82.95 | 115.35 | Werdau | 497 | 230.— | 390.60 | 538.80 |
| Osnabrück | 261 | 159.— | 270.90 | 371.30 | Wiesbaden Hbf. | 580 | 250.15 | 423.15 | 584.60 |
| Paderborn Hbf. | 308 | 175.95 | 300.30 | 413.95 | Wilhelmshaven | 251 | 153.70 | 261.45 | 365.— |
| Parchim | 178 | 118.70 | 203.70 | 281.25 | Seestadt Wismar | 156 | 110.25 | 186.90 | 259.15 |
| Passau Hbf. | 880 | 294.70 | 498.75 | 685.75 | Wittenberg (Pr.S.) | 371 | 199.30 | 340.20 | 467.70 |
| Pforzheim | 703 | 274.55 | 464.10 | 638.35 | Wittenberge | 188 | 124.55 | 212.10 | 295.45 |
| Plauen (Vgtl.) o.Bf. | 513 | 233.20 | 394.80 | 546.10 | Wuppertal- | | | | |
| Plön | 76 | 62.— | 107.10 | 146.95 | „ Barmen | 401 | 210.95 | 358.05 | 492.95 |
| Potsdam | 315 | 180.20 | 304.50 | 425.— | „ Elberfeld | 405 | 212.— | 360.15 | 496.10 |
| Recklinghausen Hbf. | 366 | 198.75 | 339.15 | 466.10 | „ Vohwinkel | 410 | 213.05 | 362.25 | 500.85 |
| Regensburg | 762 | 281.45 | 477.75 | 657.30 | Würzburg Hbf. | 558 | 243.80 | 414.75 | 571.95 |
| Saalfeld (Saale) | 484 | 230.— | 390.60 | 538.80 | Zwickau (Sachs.) Hbf. | 489 | 230.— | 390.60 | 538.80 |
| Saarbrücken Hbf. | 715 | 275.10 | 465.15 | 641.50 | | | | | |

**Betr.: Behandlung der Sendungen nach Eintreffen.**

**Es ist unbedingt notwendig, daß die Pflanzen nach Eintreffen sofort ausgepackt und gepflanzt werden. Schlechtes Anwachsen ist erfahrungsgemäß durchweg darauf zurückzuführen, daß die Wurzeln der Sonne oder trockenen Winden ausgesetzt waren. Sollten die Pflanzen infolge plötzlich auftretenden Frostes durchfroren eintreffen, so dürfen die Packstücke nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit niedriger Temperatur unterzubringen. Frostschäden sind bei einer derartigen Behandlung so gut wie ausgeschlossen. Trotzdem muß die Bahn und — sofern die Versicherung von uns gedeckt wurde — die Versicherungsgesellschaft sofort verständigt werden, damit die Regreßansprüche voll gewahrt bleiben. Dies gilt auch für alle anderen Schäden (Erhitzung, Beraubung und dergl.), die die Sendung während des Transportes erlitten hat.**

# Verkaufs- und Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

### Allgemeines

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
**Bei Begleichung von Rechnungsbeträgen darf ein Zahlungsziel von 30 Tagen ab Lieferung der Ware nicht überschritten werden. Erfolgt Barzahlung innerhalb 7 Tagen nach Lieferung der Ware, so werden 2 % Skonto auf den Netto-Rechnungsbetrag gewährt. Wird das Zahlungsziel von 30 Tagen überschritten, so ist der Lieferbetrieb berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Diskontsatz der Landeszentralbanken zu verlangen.**

### Versand und Verpackung

4. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
5. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen- oder Wagenladungen nicht eintreten können.
6. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen zu werden.

### Rollgeld und Verpackungskosten

7. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten können nachgenommen werden.

### Gewährleistung

8. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachsgewähr, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden.
9. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
10. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlagen wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen. Bei Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen übernimmt der Lieferant für die Echtheit der gelieferten Sorten Gewähr nur bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Tage der Lieferung.

### Mängelrügen

11. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

### Ersatz

12. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
13. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt.
14. Bei allen Baumschulpflanzen, **ausgenommen Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen,** können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

### Muster und Maße

15. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
16. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang **oder um solche für Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen handelt,** nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind zulässig.
17. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Gütebestimmungen des BdB bindend.

### Erfüllungsort, Gerichtsstand

18. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Ort der Niederlassung des Lieferbetriebes, sofern in den Lieferbedingungen des einzelnen Lieferbetriebes keine besonderen Bestimmungen hierfür getroffen sind.

### Schiedsgericht

19. Bei fachlichen Streitigkeiten (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des BdB entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig. Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.

20. Weitere Lieferbedingungen können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden, sind aber vorstehenden Bestimmungen auzuhängen.

# Ergänzende Lieferbedingungen

### Allgemeines

Diese Preisliste stellt ein unverbindliches Angebot dar, Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Der Stückpreis versteht sich bei Abnahme bis 9 Stück, der 10-Stückpreis bei Abnahme von 10—49 Stück, der 100-Stückpreis bei Abnahme von 50—499 Stück, jedoch nur, soweit für die einzelnen Pflanzenarten in unserem Katalog ein 10-, bzw. 100-, bzw. 1000-Stückpreis genannt ist, und zwar innerhalb ein und derselben Pflanzenart, Sorte und Wuchsform. Für Güteklasse B ermäßigen sich die im Katalog genannten Preise um 20 %.

Auch Aufträge, die uns durch unsere Vertreter erteilt werden, gelten nur dann als angenommen, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Erhalt von uns bestätigt worden sind. Mündliche Abreden zwischen unseren Vertretern und den Auftraggebern bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

Wir sind berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis Zahlung oder Sicherheit für dieselbe geleistet ist, wenn sich nach Erteilung bzw. Bestätigung des Auftrages herausstellt, daß auf Grund der ungünstigen Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gefährdet ist. Kommt der Käufer dem Verlangen nach Sicherstellung bzw. Vorauszahlung nicht nach, so können wir nach Ablauf einer von uns zu setzenden Frist von mindestens 8 Tagen vom Verkauf zurücktreten. Wir haben ferner das Recht, einen bereits abgeschlossenen Verkauf einseitig aufzulösen, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen aus früheren Lieferungen im Zeitpunkt der Ausführung des neuen Auftrages noch nicht nachgekommen ist. Ist der Auftrag bereits ausgeführt, steht es uns frei, eingeräumte Zahlungstermine abzukürzen und sonstige zugesagte Vergünstigungen zu widerrufen. **In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.**

Erfolgt die Zahlung mittels Akzeptes, gehen die Diskontspesen zu Käufers Lasten. Wünsche um Verlängerung sind spätestens 10 Tage vor Fälligkeit zu äußern. In jedem Falle ist eine angemessene Abschlagzahlung erforderlich. Ausländische Zahlungsmittel werden, sofern nicht in ausländischer Währung fakturiert, nach dem am Zahlungstage in Hamburg notierten Briefkurs der betr. Währung in D-Mark umgerechnet.

Unsere Vertreter sind nur berechtigt, Zahlungen zu fordern oder entgegenzunehmen, wenn sie eine entsprechende Vollmacht vorlegen können.

Unsere Angebote verstehen sich stets freibleibend; sie sind als geschlossenes Ganzes zu betrachten. Teilposten können zu den angebotenen Preisen nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung abgegeben werden. Dies gilt insbesondere von Angeboten, die „frachtfrei" kalkuliert sind.

### Versand und Verpackung

Der Käufer ist verpflichtet, genaue Versandvorschriften, insbesondere bezüglich der Bestimmungsstation usw., zu erteilen. Geschieht dies nicht, sind wir berechtigt, den Versand nach eigenem besten Ermessen auf dem uns am günstigsten erscheinenden Wege vorzunehmen, ohne damit eine Verantwortung zu übernehmen. Bei Verkäufen auf Abruf haben wir das Recht, Herbstlieferungen nach dem 15. November, Frühjahrslieferungen nach dem 15. April ohne weiteres abzusenden.

Für alle im Auftrag des Bestellers durchgeführten Sammelladungen lehnen wir jede Verantwortung ab, und zwar sowohl für die eigene, als auch für die fremde Ware.

Ballentücher, Drahtgeflecht für Ballenumhüllung und Töpfe aller Art werden — sofern nicht einschl. Verpackung angeboten oder ausdrücklich anders vereinbart — zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn gesondert berechnet. Diese Bedingung gilt also auch bei Angebot frei Empfangsstation oder Verwendungsstelle.

### Ersatz

Ein Ersatz in der nächst höheren oder niedrigeren Stärke bzw. Größe ist ebenfalls erlaubt, vorausgesetzt, daß sie sich der Käufer nicht verbeten hat und — im Falle der Lieferung einer höheren Stärke oder Größe — der Mehrpreis nur unerheblich ist.

### Güteklassen, Muster und Maße

Abweichend von obiger Ziffer 17 gelten für Forstpflanzen — mit „F" gekennzeichnet — die besonderen Bedingungen des Zentralverbandes der Forstsamen- und Forstpflanzenbetriebe, Halstenbek, die wir auf Wunsch bekanntgeben.

# Alphabetisches Sachregister


Seite

**A**bies 135, 166
Acanthopanax 49
Acer 49, 151
Actinidia 126
Aesculus 53, 152
Adiantum 132
Ahorn 49, 151
Ailantus 54, 152
Akebia 126
Alleebäume 48—125
Almenrausch 107
Alnus 54, 152
Alpengoldregen 86
Alpenjohannisbeere 109
Alpenrose 107
Alpenwaldrebe 127
Amberbaum 88, 159
Amelanchier 54, 152
Amerikan. Eiche 106, 162
Amerikanische Gebirgsstachelbeere 6, 109
Amerik. Sandbrombeere 7
Amerikanische Wildstachelbeere 109
Amorpha 55, 152
Ampelopsis 130, 151
Andromeda 55, 152
Apfel 4, 8—17, 91
Aprikose 5, 29
Aralia 56
Aristolochia 126
Arundinaria 56
Arve 143
Aschweide 113
Aspidium 132
Azalea 56, 152

**B**ambus, winterharter 56
Bartblume 64
Bastardindigo 55, 152
Baumhasel 69
Baumpaeonie 94
Baumschlinge 151
Baumweide 163
Baumwürger 127, 151
Becherfarn 132
Beerenobst 6—7, 31—34, 150
Befruchtungsverhältnisse
- Äpfel 15—16
- Aprikosen 29
- Beerenobst 34
- Birnen 21
- Haselnüsse 35
- Kirschen 27
- Pfirsiche 29
- Pflaumen, Zwetschen Mirabellen und Renekloden 24
- Quitten 30

Berberis 58, 152
Berberitze 58, 152
Bergahorn 51, 151
Bergkiefer 144, 169
Berglorbeer 85, 158
Bergulme 123, 165
Berliner Lorbeer-pyramidenpappel 97
Besenginster 73, 156
Besenheide 63, 154
Betula 59, 153
Bibernellrose 111
Bienennährpflanzen 177
Binsenpfriemen 116
Birke 59, 153
Birkenpappel 160
Birne 4, 18—20, 96
Blasenbaum 86, 158
Blasenspiere 96, 160
Blasenstrauch 67, 155
Blaufichte 143
Blauglockenbaum 94
Blauschote 74, 157
Blautanne 143
Blühkalender 176
Blütenkirschen 99—104
Blumenesche 80
Blumenhartriegel 68
Blutbuche 79
Blutjohannisbeere 110
Blut-Lamberthasel 69
Bocksdorn 89, 159
Bodenbedeckungs-pflanzen 177
Bodenschutzgehölze 180
Boysenbeere 7
Brombeere 7, 32, 111, 150, 163
Buche 78, 157
Buchsbaum 62, 154
Buddleia 61, 153
Buntbl. Gehölze 48—125
Buntlaubige Koniferen 174
Buschklee 87
Buxus 62, 154

**C**alluna 63, 154
Calycanthus 63, 154
Campsis 127, 150
Caragana 63, 154
Carpinus 64, 154
Caryopteris 64
Castanea 64, 154
Catalpa 65, 154
Ceanothus 65
Cedrus 135, 166
Celastrus 127, 151
Cercidiphyllum 65, 154
Cercis 66, 154

Chaenomeles 66, 154
Chamaecyparis 136, 166
Chinesicher Flieder 119
Chionanthus 66
Christusdorn 81, 158
Cladrastis 155
Clematis 127, 151
Clerodendron 67
Clethra 67
Colutea 67, 155
Cornus 67, 155
Corylopsis 68
Corylus 68, 155
Cotinus 69, 155
Cotoneaster 69, 155
Crataegus 72, 156
Cryptomeria 137, 167
Cydonia 73, 156
Cytisus 73, 156

**D**aphne 74, 156
Davidia 74
Decaisnea 74, 157
Decksträucher 48—125
Dekorationsgehölze 180
Desmodium 74
Deutsche Eiche 105
Deutzia 74, 157
Diervilla 125, 157
Dikanthere 133
Dorn 72, 156
Douglastanne 145, 169
Dryas 75
Dryopteris 132
Duftblüte 94

**E**beresche 115, 164
Ebereschenspiere 115
Edelkastanie 64
Edelrosen 38—40
Edeltanne 135, 166
Efeu 82, 129, 158
Eibe 145, 170
Eibisch 82
Eiche 105, 162
Einblattesche 80
Einfassungsbuchsbaum 63
Einfassungspflanzen 177
Eingrifflig. Weißdorn 72
Elaeagnus 75, 157
Elfenbeinginster 73, 156
Eller 54
Engelsüß 132
Enkianthus 75
Erbsenstrauch 63, 154
Erdbeere 7, 33
Erica 76, 157
Ericastrauch 165

Seite

Erle 54, 152
Escallonia 76, 157
Esche 79, 157
Eschenahorn 50, 151
Espe 98
Eßbare Eberesche 116
Eßbare Kastanie 64, 154
Essigbaum 109
Europäische Lärche 141, 168
Evodia 76
Evonymus 76, 157
Exochorda 78

Fächerahorn 50
Fächerblattbaum 137, 167
Färberginster 80, 158
Fagus 78, 157
Farne 132
Faulbaum 106, 162
Feldahorn 49, 151
Feldulme 165
Felsenbirne 54, 152
Felsenefeu 82
Felsenmispel 69, 155
Feuerdorn 105, 162
Fichte 141, 168
Fiederberberitze 90, 159
Fiederspiere 115, 164
Fingerkraut 99
Flieder 119, 165
Fliederspeer 61, 153
Floribundarosen 41—43
Flügelnuß 105
Flügelstorax 161
Flußzeder 141
Föhre 144
Forsythia 79, 157
Fraxinus 79, 157
Fruchtsträucher 4—7
Fünffingerstrauch 99, 161
Funkia 133

Gamander 133
Gaultheria 80
Geflügelter Spindelbaum 76
Gefüllter Rotdorn 72
Gehölze mit schönen Herbstfärbungen 174
Geißblatt 129
Geißklee 73, 156
Gelbholz 155
Gemeiner Flieder 119
Genista 80, 158
Geweihbaum 81, 158
Gewürzstrauch 63, 154
Ginkgo 137, 167
Ginster 73, 80, 156, 158
Gleditsia 81, 158
Glockenheide 76
Glyzine 131
Götterbaum 54, 152

Seite

Goldglöckchen 79, 157
Goldhasel 68
Goldjohannisbeere 109
Goldregen 86, 158
Goldulme 123
Grauerle 54
Grautanne 135
Großblättr. Linde 122
Großblum. Edelrosen 38—40
Gruppenrosen 38—40
Grünerle 152
Gymnocladus 81, 158

Hängeblutbuche 78
Halbsträucher 133
Halesia 81
Halimodendron 81
Hamamelis 81
Hainbuche 64, 154
Hartheu 83, 158
Hartriegel 67, 155
Haselnuß 7, 35, 68, 150, 155
Heckenkirsche 88, 159
Heckenpflanzen 48—170, 177—178
Hedera 82, 129, 158
Heide 63, 76, 157
Heidekraut 76
Helianthemum 82
Hemlockstanne 149, 170
Hibalebensbaum 148, 170
Hibiscus 82
Himbeere 7, 33, 111
Hippophae 83, 158
Hirschzunge 132
Hochstammrosen 36, 38—42
Holodiscus 83, 158
Holunder 114, 164
Hopfenbuche 160
Hortensie 83, 129, 158
Hosta 133
Hülse 84, 158
Hundsrose 111
Hydrangea 83, 129, 158
Hypericum 83, 158

Iberis 133
Ilex 84, 158
Immergrün 133
Immergrüne Gehölze 174
Indigofera 85
Indigostrauch 85
Irländisch. Säulentaxus 146
Italienische Pyramidenpappel 97, 160

Japanische Apfelrose 111
Japanische Azaleen 57, 152
Jap. Blütenkirschen 99, 161
Jap. Fächerahorn 50
Jap. Lärche 141, 168
Jap. Nelkenkirsche 101

Seite

Jap. Scheinquitte 66
Jap Schirmtanne 145
Jap. Schlitzahorn 50
Jap. Weinbeere 112, 163
Jasmin, echter 85
Jasmin, falscher 95, 160
Jasminum 85
Jelängerjelieber 129
Johannisbeere 6, 31, 109, 150
Johanniskraut 83, 158
Judasbaum 66, 154
Judasbaumblatt 65, 154
Judasblatt 65
Juglans 85, 158
Jg. Kletterpflanzen 150—151
Junge Laubgehölze 151—166
Junge Nadelhölzer 166—170
Jungfernrebe 130
Juniperus 138, 167

Kätzchenweiden 112, 163
Kaiserlinde 121
Kaliforn. Flußzeder 141
Kalmia 85, 158
Kartoffelrose 111
Kastanie 53, 152
Kegelfichte 142
Kelchblume 63, 154
Kernobst 4—6
Kerria 86
Kiefer 143, 169
Kirschapfel 91—93
Kirsche 5, 25—27, 99
Kirschlorbeer 103, 161
Kirschpflaume 102
Kleinblättr. Linde 122, 165
Kleinkron. Alleebäume 179
Kletterhortensie 129
Kletterpflanzen 126—131, 150
Kletterrosen 46—47
Knöterich 131
Koelreuteria 86, 158
Königsfarn 132
Kolkwitzia 86
Koloradotanne 135
Koniferen 134—149, 166—170
Kopfweide 112
Korallenbeere 118
Korbweide 114
Korkbaum 95, 160
Korktanne 135
Kornelkirsche 68, 155
Kranzspiere 118
Kreuzdorn 106, 162
Kriechwacholder 139
Krimlinde 120
Krummholzkiefer 144, 169
Kryptomerie 137
Küstentanne 166
Kugelesche 80

| | Seite |
|---|---|
| Kugelrobinie | 110 |
| Kugelspitzahorn | 51 |
| Kurume Azaleen | 57 |
| **L**aburnum | 86, 158 |
| Lambertianarosen | 44—46 |
| Lärche | 141, 168 |
| Larix | 141, 168 |
| Latsche | 144 |
| Laubgehölze | 48—125 |
| Lavandula | 133 |
| Lavendelheide | 55, 152 |
| Lebensbaum | 147, 170 |
| Lebensbaumzypresse | 135, 166 |
| Lederblume | 161 |
| Lederhülsenbaum | 81 |
| Ledum | 87 |
| Legföhre | 144 |
| Lespedeza | 87 |
| Leucothoe | 87 |
| Libocedrus | 141 |
| Lieferungsbedingungen | 184 |
| Ligustrum | 87, 159 |
| Linde | 120, 165 |
| Liquidambar | 88, 159 |
| Liriodendron | 88, 159 |
| Lonicera | 88, 129, 159 |
| Lorbeerkrüglein | 87 |
| Lorbeerpyramidenpappel | 97 |
| Lorbeerrose | 85 |
| Lorbeerweide | 113 |
| Losbaum | 67 |
| Lycium | 89, 159 |
| **M**aackia | 90 |
| Magnolia | 90, 159 |
| Mahonia | 90, 159 |
| Maiblumenstrauch | 74, 157 |
| Malus | 91, 159 |
| Mammutbaum | 145 |
| Mandel | 99 |
| Mandelblüte | 104 |
| Mannaesche | 80 |
| Matteucia | 132 |
| Maulbeerbaum | 93, 159 |
| Mehlbeere | 115, 164 |
| Menispermum | 130 |
| Mespilus | 93 |
| Mirabelle | 5, 22—24 |
| Mispel | 6, 30, 93 |
| Monatserdbeeren | 34 |
| Mondsame | 130 |
| Moorbirke | 60, 153 |
| Moosrosen | 44—46 |
| Morus | 93, 159 |
| Mughuskiefer | 144 |
| **N**adelgehölze | 134—149 |
| Neillia | 93 |
| Nepeta | 133 |
| Nikkotanne | 135 |
| Nordmannstanne | 135 |
| Nord. Mehlbeere | 164 |
| Nothofagus | 94 |
| Nyssa | 159 |
| **O**bstbäume | 4—6 |
| Oelweide | 75, 157 |
| Österreichische Schwarzkiefer | 144 |
| Ohrweide | 113, 163 |
| Onoclea | 132 |
| Orientalische Fichte | 143 |
| Osmanthus | 94 |
| Osmunda | 132 |
| Ostrya | 160 |
| Oxelbeere | 116 |
| **P**achysandra | 133 |
| Paeonia | 94 |
| Papierbirke | 60 |
| Pappel | 96, 160 |
| Parkrosen | 44—46 |
| Parrotia | 94 |
| Parthenocissus | 130, 151 |
| Paulownia | 94 |
| Periploca | 151 |
| Pernetianarosen | 38—40 |
| Pernettya | 94 |
| Perückenstrauch | 69, 155 |
| Pfaffenhütchen | 77, 157 |
| Pfeifenblume | 126 |
| Pfeifenstrauch | 95, 160 |
| Pfeifenwinde | 126 |
| Pfeilginster | 80 |
| Pfingstrose | 94 |
| Pfirsich | 6, 29, 99 |
| Pflaume | 5, 22—24, 99 |
| Phellodendron | 95, 160 |
| Philadelphus | 95, 160 |
| Phillyrea | 96 |
| Phyllitis | 132 |
| Physocarpus | 96, 160 |
| Picea | 141, 168 |
| Pimpernuß | 118 |
| Pinus | 143, 169 |
| Pirus | 96 |
| Platane | 96, 160 |
| Polyantharosen | 41—43 |
| Polygonum | 131 |
| Polypodium | 132 |
| Polystichum | 132 |
| Populus | 96, 160 |
| Porst | 87 |
| Potentilla | 99, 161 |
| Prachtglocke | 75 |
| Prunkspiere | 78 |
| Prunus | 99, 161 |
| Pseudotsuga | 145, 169 |
| Ptelea | 161 |
| Pterocarya | 105 |
| Pterostyrax | 161 |
| Pulverholz | 106 |
| Punktfarn | 132 |
| Purpurweide | 113 |
| Pyracantha | 105, 162 |
| Pyramideneiche | 106 |
| Pyramidenhainbuche | 64 |
| Pyramidenpappel | 97, 160 |
| Pyramidensilberpappel | 96 |
| Pyramidenweißbuche | 64 |
| **Q**uercus | 105, 162 |
| Quitte | 6, 30, 73 |
| **R**ainweide | 87, 159 |
| Rankrosen | 46—47 |
| Ranunkelstrauch | 86 |
| Rauchharte Gehölze | 179 |
| Rauchharte Koniferen | 179 |
| Reifweide | 113 |
| Remontantrosen | 38—40 |
| Renekloden | 5, 22—24 |
| Rhabarber | 7, 35 |
| Rhamnus | 106, 162 |
| Rhododendron | 107, 162 |
| Rhodotypus | 108, 162 |
| Rhus | 108, 162 |
| Ribes | 109, 162 |
| Rispenfarn | 132 |
| Rispenhortensie | 83 |
| Robinia | 110, 162 |
| Rosa | 110, 163 |
| Rosen | 36—47 |
| Rosmarinseidelbast | 74 |
| Roßkastanie | 53, 152 |
| Rotblättr. Fächerahorn | 50 |
| Rotblättr. Zellernuß | 69 |
| Rotbuche | 78, 157 |
| Rotdorn | 72 |
| Roteiche | 106, 162 |
| Roterle | 54 |
| Rotfichte | 142, 168 |
| Rottanne | 142, 168 |
| Rubus | 111, 131, 163 |
| Rüster | 123, 165 |
| Rumelische Kiefer | 144 |
| Rundbl. Schneebeere | 118 |
| **S**adebaum | 140 |
| Säckelblume | 65 |
| Sämlingsblutbuche | 79 |
| Säulenformen | 174 |
| Säulenwacholder | 139 |
| Salix | 112, 163 |
| Salzstrauch | 81 |
| Sambucus | 114, 164 |
| Sandbirke | 60 |
| Sanddorn | 83, 158 |
| Sarcococca | 114 |
| Sauerdorn | 58, 152 |
| Sauerkirsche | 5, 27 |
| Schalenobst | 7, 35, 150 |

| | Seite |
|---|---|
| Scharlachdorn | 72 |
| Scharlacheiche | 105 |
| Schattenmorelle | 5, 27 |
| Schattenverträgliche Gehölze | 179 |
| Schattenverträgliche Koniferen | 179 |
| Scheinakazie | 110, 162 |
| Scheinbeere | 80 |
| Scheinbuche | 94 |
| Scheineller | 67 |
| Scheinhasel | 68 |
| Scheinkerrie | 108, 162 |
| Scheinquitte | 66, 154 |
| Scheinspiere | 83, 158 |
| Scheinzypresse | 135 |
| Schildfarn | 132 |
| Schirmtanne | 145 |
| Schlangenhautkiefer | 144 |
| Schlehdorn | 104, 161 |
| Schlehe | 104, 161 |
| Schleierfarn | 132 |
| Schleifenblume | 133 |
| Schleimbeere | 114 |
| Schlingpflanzen | 126—131, 150 |
| Schlingrosen | 46—47 |
| Schmetterlingsbusch | 61, 153 |
| Schneeball | 123, 165 |
| Schneebeere | 118, 165 |
| Schneeblume | 66 |
| Schneeflockenbaum | 66 |
| Schneeglöckchenbaum | 81 |
| Schneeheide | 76 |
| Schnittgrün | 149 |
| Schnittrosen | 38—43 |
| Schnurbaum | 115, 164 |
| Schottische Zaunrose | 111 |
| Schwarzbirke | 59 |
| Schwarzdorn | 104, 161 |
| Schwarzer Holunder | 6, 114, 164 |
| Schwarzerle | 54, 152 |
| Schwarzkiefer | 144, 169 |
| Schwarznuß | 85 |
| Schwarzpappel | 97 |
| Schwedische Mehlbeere | 116 |
| Schwedischer Säulenwacholder | 139 |
| Sciadopitys | 145 |
| Seidelbast | 74, 156 |
| Selbstklimmer | 130 |
| Sequoia | 145 |
| Serbische Fichte | 143 |
| Sicheltanne | 137, 167 |
| Silberahorn | 52, 151 |
| Silberglocke | 81 |
| Silberkriechweide | 112 |
| Silberlinde | 122 |
| Silberpappel | 96 |
| Silberweide | 163 |
| Silberwurz | 75 |
| Sinngrün | 133 |
| Sitkafichte | 143, 169 |
| Skimmia | 114 |
| Sommerflieder | 61 |
| Sommerlinde | 122, 165 |
| Sonnenröschen | 82 |
| Sophora | 115, 164 |
| Sorbaria | 115, 164 |
| Sorbus | 115, 164 |
| Späte Traubenkirsche | 104, 161 |
| Spartium | 116 |
| Spargel | 7 |
| Speierling | 115 |
| Spierstrauch | 117, 164 |
| Spindelbaum | 76, 157 |
| Spiraea | 117, 164 |
| Spitzahorn | 51, 151 |
| Stachelbeere | 6, 31, 109 |
| Stachelkraftwurz | 49 |
| Staphylea | 118 |
| Stauden | 133 |
| Stechginster | 123 |
| Stechpalme | 84, 158 |
| Steinlinde | 96 |
| Steinobst | 5—6 |
| Steinweichsel | 104 |
| Stephanandra | 118 |
| Sternblütige Magnolie | 90 |
| Stieleiche | 105, 162 |
| Strahlenginster | 80 |
| Strahlengriffel | 126 |
| Stranvaesia | 118, 165 |
| Strauchhortensie | 83 |
| Strauchpäonie | 94 |
| Strauchrosen | 44—46, 110 |
| Struthiopteris | 132 |
| Süßkirsche | 5, 25—26 |
| Sumach | 108, 162 |
| Sumpfeiche | 105 |
| Sumpffarn | 132 |
| Sumpfporst | 87 |
| Sumpfzypresse | 145, 169 |
| Symphoricarpus | 118, 165 |
| Syringa | 119, 165 |
| **T**afeleibe | 146 |
| Tamariske | 120, 165 |
| Tamarix | 120, 165 |
| Tanne | 135 |
| Taxodium | 145, 169 |
| Taxus | 145, 170 |
| Tecoma | 131 |
| Teehybridrosen | 38—40 |
| Teerosen | 47 |
| Teucrium | 133 |
| Thuja | 147, 170 |
| Thujopsis | 148, 170 |
| Tilia | 120, 165 |
| Topffichten | 142 |
| Topfrosen | 36, 41—43 |
| Torfmyrte | 94 |
| Tränenkiefer | 144, 169 |
| Traubeneiche | 162 |
| Traubenholunder | 114, 164 |
| Traubenkirsche | 104, 161 |
| Traubenspiere | 93 |
| Trauerbirke | 61 |
| Trauerblutbuche | 78 |
| Trauerbuche | 79 |
| Trauerescche | 80 |
| Trauer- u. Hängeformen | 175 |
| Trauergoldweide | 112, 163 |
| Trauerrosen | 46—47 |
| Treibgehölze | 180 |
| Treibrosen | 38—40 |
| Trichterfarn | 132 |
| Trichterlilie | 133 |
| Trompetenbaum | 65, 154 |
| Trompetenblume | 127, 150 |
| Tsuga | 149, 170 |
| Tüpfelfarn | 132 |
| Türkenfichte | 143 |
| Tulpenbaum | 88, 159 |
| Tupelobaum | 159 |
| **Ü**bersicht der Rosensorten | 37—38 |
| Uferheide | 120 |
| Ulex | 123 |
| Ulme | 123, 165 |
| Ulmus | 123, 165 |
| Ungarische Silberlinde | 122 |
| Unterlagen | 171—173 |
| **V**enushaar | 132 |
| Veredlungsunterlagen | 171—173 |
| Viburnum | 123, 165 |
| Vinca | 133 |
| Virginische Traubenkirsche | 104, 161 |
| Vitis | 131 |
| Vogelbeere | 164 |
| Vogelkirsche | 102 |
| Vogelschutzgehölze | 180 |
| Vorfrühlingsalpenrose | 108 |
| Vorratsliste | |
| Äpfel | 17 |
| Birnen | 22 |
| Kirschen | 28 |
| Pflaumen, Zwetschen Mirabellen und Renekloden | 25 |
| **W**acholder | 138, 167 |
| Waldhasel | 68 |
| Waldkiefer | 169 |
| Waldrebe | 127, 151 |
| Walnuß | 7, 85, 158 |
| Wegdorn | 106 |
| Weichselkirsche | 27 |
| Weide | 112, 163 |
| Weigela | 125, 166 |

| | Seite |
|---|---|
| Weinbeere | 111 |
| Weinrebe | 7, 33 |
| Weißbuche | 64, 154 |
| Weißdorn | 72, 156 |
| Weißerle | 54, 152 |
| Weißesche | 79 |
| Weißfichte | 142 |
| Weißtanne | 166 |
| Weißweide | 112, 163 |
| Wellingtonia | 145 |
| Weymouthskiefer | 145, 169 |
| Wildapfel | 91 |
| Wildbirne | 96 |
| Wilder Wein | 130, 151 |
| Wildlinge | 171—173 |
| Windschutzgehölze | 180 |
| Winterjasmin | 85 |
| Winterlinde | 122, 165 |
| Wistaria | 131 |
| Wohlriechender Himbeerstrauch | 112 |
| Wolliger Schneeball | 123 |
| Wurmfarn | 132 |
| Zaubernuß | 81 |
| Zeder | 135, 166 |
| Zellernuß | 69 |
| Zenobia | 125 |
| Zerreiche | 162 |
| Zierapfel | 91, 159 |
| Zierkirschen | 99—104, 161 |
| Zierpfirsich | 104 |
| Ziersträucher | 48—125 |
| Zierweiden | 112 |
| Zierwein | 131 |
| Zirbelkiefer | 143 |
| Zitterpappel | 98 |
| Zuckerhutfichte | 142 |
| Zweigriffliger Dorn | 72 |
| Zwergbengalrosen | 43 |
| Zwergbirke, nördliche | 59 |
| Zwergelfenbeinginster | 73 |
| Zwergfichten | 142 |
| Zwergmispel | 69 |
| Zwetsche | 5, 22—24 |
| Zwischenlinde | 121 |
| Zypressenfichte | 142 |

# Eine herzliche, dringende Bitte!

## Beachten Sie

**am Fernsprecher:**

1. **Bereithalten**
   Auftragsnummer, Angebot oder letztes Schreiben.
2. **Zuständige Abteilung fordern**
   und zwar:
   bei Auftragserteilung, Preisanfrage und dergl.: **Abt. Verkauf**
   bei Abruf, Erteilung von Versandvorschriften und dergl.: **Abt. Expedition**
   in Zahlungsangelegenheiten: **Abt. Buchhaltung**
3. **Schriftlich bestätigen**
   Hörfehler werden dadurch vermieden!

**im Schriftverkehr:**

1. **Deutlich schreiben,**
   insbesondere Namen, Wohnort, Straße, Bahnstation (ggf. Übergangs- oder Kleinbahnstation oder Autokraftverkehr).
2. **Angeben**
   Auftragsnummer, Angebot, letztes Schreiben oder Hinweis auf vorliegenden Hauptkatalog 1953/54 bzw. Sonderpreislisten.

**im Telegrammverkehr:**

1. **Telegrammadresse benutzen:**
   „Timm Baumschulen Elmshorn"
2. **Schriftlich bestätigen,**
   Irrtümer werden dadurch beseitigt!

**vor einem Besuch:**

1. **Anmelden**
   möglichst rechtzeitig empfehlenswert, insbesondere außerhalb der Geschäftszeit.
2. **Geschäftszeit**
   werktags 7-12 und 13½-17 Uhr, außer Sonnabend nachmittags.

Warenzeichen rechtlich
geschützt

Druck: Gebr. Bramstedt, Elmshorn

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)